
PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Special Book Fund
1910
Sept. on 6 1897
R. W. Gibson. Invt

Bt. Cryp.
17.
Friedländer
Sohn, Berlin

SYNOPSIS
MYCOLOGIÆ VENETÆ

SECUNDUM MATRICES

DIGESSERUNT

J. CUBONI ET V. MANCINI

PATAVII
TYPIS SEMINARII
MDCCCLXXXVI

SYNOPSIS
MYCOLOGIÆ VENETÆ

SECUNDUM MATRICES

DIGESSERUNT

J. CUBONI ET V. MANCINI

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

PATAVII
TYPIS SEMINARII
MDCCCLXXXVI

.I8
C81

P. A. SACCARDO

VENETAE · MYCOLOGIAE

ACRI · ET · DILIGENTI · INVESTIGATORI

CUIUS · EXIMIA · SCRIPTA

UNIVERSAM · MYCOLOGIAM

APTISSIMO · ORDINE · ILLUSTRARUNT

HANC · QUALEMCUMQUE · OPELLAM

EIUS · CONSILIO · DIGESTAM

EIUSQUE · E · FONTIBUS · HAUSTAM

LIBENTER · MERITO · DEDICANT · AUCTORES

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

PREFAZIONE

Chiunque abbia qualche pratica nello studio della Micologia sa di quale vantaggio sia l'aver sott'occhio un elenco delle specie distribuite secondo le matrici che loro forniscono i materiali di sviluppo. Finora però pochi autori si sono occupati di elaborare elenchi cosiffatti e lo studioso è ancora obbligato a consultare in proposito il lavoro oramai antico del WESTENDORP (*Les Cryptogames classées d'après leurs stations naturelles.* — Gand, 1854), ovvero l'altro per parecchi riguardi imperfetto ed incompleto del ROUMEGUÈRE: *Essai d'une distribution des champignons d'Europe d'après leurs stations naturelles*, contenuto nella *Cryptogamie illustrée ou histoire des familles naturelles des plantes Acotyledones.* — Paris 1870.

In questi ultimi anni lo studio dei funghi si è assai divulgato e non solamente i micologi propriamente detti, dei quali il numero va sempre crescendo per l'interesse grandissimo che sotto ogni punto di vista presenta quella classe d'organismi, ma altresì i medici e gli agronomi sono obbligati ad occuparsene onde acquistare un' esatta nozione della patologia animale e vegetale di cui i funghi sono un fattore precipuo. Quindi è più che mai oppor-

OCT 15 1910

tuna la pubblicazione di libri come questo nostro, destinato a facilitare lo studio traverso l'immenso campo della Micologia.

Forse anche lo scienziato provetto non disdegnerà questo nostro modesto lavoro, come quello di cui potrà valersi nelle più svariate ricerche, sia investigando i rapporti fra l'ospite e i suoi parassiti, sia comparando il differente modo di comportarsi delle diverse specie di piante di fronte ai funghi parassiti o saprofiti.

Fu dapprima nostro intendimento l'abbracciare in questa *Synopsis* la Micologia universale, ma ben presto dovemmo deporne il pensiero al presentarsi di difficoltà quasi insormontabili derivanti dalla immensa quantità di pubblicazioni micologiche rare o sparse nei giornali o negli atti delle accademie che pure tutte avremmo dovuto consultare per avere un elenco completo delle matrici finora conosciute. Ritenemmo nondimeno essere di quasi pari vantaggio l'edificare per ora il nostro lavoro sui materiali della flora veneta, come quella che per opera dell'illustre Saccardo è stata così diligentemente e completamante esplorata come non lo è stata finora nessun'altra regione in Europa. Si aggiunga inoltre che la micologia veneta è stata recentemente esposta nella parte descrittiva e sistematica in modo accurato e piano dal compianto amico nostro Giacomo Bizzozero nella sua *Flora Veneta Crittogamica. Parte I. I Funghi.* La nostra *Synopsis* serve quasi di complemento al libro del Bizzozero, al quale rimandiamo sempre, per le descrizioni, col numero arabico posto entro parentesi in seguito a ciascuna specie da noi ricordata.

Abbiamo diviso le matrici in quattro gruppi: I Piante fanerogame, II Piante crittogame, III Animali, IV Sostanze industriali. Le piante sono ordinate secondo il sistema naturale e le specie sono indicate col nome loro ascritto nella Flora Italiana del Prof. Arcangeli. Quando

fu reputato necessario si fece seguire entro parentesi il sinonimo più volgato. Allorchè della matrice il solo genere è bene accertato, l'enumerazione dei suoi funghi è posta in coda alle specie di esso e similmente questa enumerazione fa seguito ai generi d'una famiglia, quando della matrice è noto soltanto la pertinenza a questa famiglia. I Funghi propri di ogni matrice sono distribuiti anche essi sistematicamente per ordini, e in ciascun ordine per comodo è seguita la disposizione alfabetica, non omettendo, dove ci sembrò fosse d'uopo l'indicazione in parentesi dei sinonimi più comuni. In fine della parte che si riferisce al regno vegetale sono collocati i funghi la cui matrice è vagamente definita, essendo soltanto indicata come parte di pianta. Anche per gli animali si adottò una disposizione analoga ponendo in fine alcuni funghi coprofili di specie animali indeterminate, mentre furono inscritti sotto le singole specie quelli per i quali queste erano chiaramente designate. Furono omessi tutti quei funghi, la maggior parte geofili, dei quali era troppo vagamente accennata la matrice e le specie pantogene vennero riferite quasi sempre unicamente a quella sostanza sulla quale accade di riscontrarle più di frequente.

Siamo i primi a riconoscere che questo lavoro dovrà risultare molto imperfetto e forse inquinato di non lievi errori, nè ci dissimuliamo le critiche che nemmeno i più indulgenti potrebbero risparmiarci. Non si dimentichi però quante siano in un lavoro di questo genere le difficoltà che fecero abbandonarne il proposito anche a scienziati di grande valore e come torni quasi impossibile che non isfuggano errori ed omissioni nella molteplice e complicata manipolazione di un cumulo sì grande di dati.

Al prof. Saccardo, che mai ci fe' mancare il sostegno dei suoi consigli e dei suoi incoraggiamenti, dedichiamo

questa fatica, in pubblica attestazione della nostra riconoscenza. Ed una parola di affettuoso ringraziamento inviamo anche al nostro amico L. Celotti già assistente del Laboratorio botanico della R. Scuola Enologica di Conegliano, per l'aiuto dell'opera assidua e diligente apportato alla compilazione di questo lavoro.

Gli Autori.

Le opere delle quali ci siamo serviti per trarne le indicazioni delle matrici sono tutte quelle che riguardano la flora micologica del Veneto e sono citate ogni volta con queste convenzioni:

M. S. indica l'opera del Saccardo «*Mycologiae Venetae Specimen*».

Mich. indica l'opera del medesimo autore «*Michelia, Commentarium mycologicum*»; i numeri si riferiscono al volume.

F. V. indica «*Fungi Veneti novi vel critici*»; i numeri romani che seguono si riferiscono alla serie.

Il numero arabico entro parentesi che fa seguito al nome delle specie dei funghi denota la pagina in cui la specie stessa è descritta nella «*Flora Crittogamica Veneta* Parte I. *I Funghi*» del Bizzozero.

PHANEROGAMEÆ

Ranunculaceæ.

Clematis recta *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Clematidis rectæ *Sacc.* (429). *In foliis languidis* (F. V. V p. 205).

Clematis Vitalba *L.*

Hymenomyceteæ.

Pleurotus Sylvanus *Sacc.* (51). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 1).

Hypodermeæ.

Æcidium Clematidis *DC.* (148). *In foliis et petiolis* (M. S. p. 84).

Pyrenomyceteæ.

Ceriospora xantha *Sacc.* (263). *In sarmentis* (Mich. I. p. 36).
Diaporthe demissa *Sacc.* (228). *In ramis* (F. V. IV p. 9).
Eutypa (*Valsa*) heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis* (Mich. I p. 19).
Enchnosphæria passicrinis *Sacc.* (265). *In sarmentis decorticatis putrescentibus* (F. V. II p. 327).
Giberella Saubinetii *D. Ntrs.* (289). *In caulibus putrescentibus* (M. S. p. 117).
Leptosphæria acuta *Karst.* (246). *In sarmentis emortuis.*
Leptosphæria Doliolum *Ces. et D. Ntrs.* (243). *In caulibus herbaceis emortuis.* (M. S. p. 103).
Leptosphæria nectrioides *Speg.* (247). *In sarmentis putridis* (Mich. I p. 458).
Leptosphæria pyrenopezizoides *Sacc. et Speg.* (244). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 394).

Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (245). *In cortice* (F. V II p. 318).
Lophiostoma simillimum *Kars.* (302). *In ligno ramorum.*
Ophiobolus (*Raphidophora*) Vitalbæ *Sacc.* (278). *In caulibus languentibus* (M. S. p. 102).
Plowrightia (*Dothidea*) insculpta *Wallr.* (294). *In sarmentis emortuis putrescentibus.* (Mich. I p. 465).
Teichospora sarmenticia *Sacc.* (272). *Inter fibras corticales sarmentorum.*
Teichospora Vitalbæ *Sacc.* (272). *In sarmentis putrescentibus* (F. V. V p. 177).

Discomycetæ.

Helotium Cacaliæ *Sacc.* (331). *var.* fumigatum. *In sarmentis emortuis.*

Sphæropsideæ.

Phoma demissa *Sacc.* (335). *In ramis* (F. V. V p. 201).
Rhabdospora (*Septoria*) Vitalbæ *Sacc.* (438). *In caulibus adhuc vivis* (Mich. I p. 193).
Septoria Clematidis *Desm.* (431). *In foliis* (M. S p. 196).

Hyphomycetæ.

Fusarium roseum *Linck.* (537). *In ramis* (Mich II p. 294).

Thalictrum aquilegifolium *L.*

Pyrenomyceteæ.

Amphisphæria pulcherrima *Speg.* (238). *In caulibus dejectis putrescentibus* (Mich. II p. 249).

Sphæropsideæ.

Diplodia herbarum *Lev.* (410). *In caulibus.*

Anemone coronaria *L.*

Hypodermeæ.

Æcidium quadrifidum *D. C.* (149). *In foliis radicalibus* (Mich. I. p. 541).

Anemone nemorosa *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora pygmæa *dBy.* (152). *In foliis* (Mich. I. p. 365).

Synchytrium Anemones *Wor.* (159). *In foliis petiolisque* (Mich. II p. 247).

Hypodermeæ.

Puccinia anemones *Pers.* (136) *In foliis* (Mich. I p. 8).
Puccinia fusca *Schröt.* (139). *In foliis.*

Anemone trifolia *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Anemones *Desm.* (433). *In foliis* (Mich. I p. 189).

Anemone ranunculoides *L.*

Hypodermeæ.

Æcidium leucospermum *D. C.* (139). *In foliis* (Mich. I p. 541)
Puccinia Anemones *Fuck.* (136). *In foliis* (M. S. p. 79).

Anemone Hepatica *L.* (Hepatica triloba *D. C.*)

Sphæropsideæ.

Septoria Hepaticæ *Desm.* (428). *In foliis* (M. S. p. 196).

Hypodermeæ.

Urocystis Anemones *Raben.* (130). *In foliis.*

Ranunculus aconitifolius *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria oreophila *Sacc.* (428). *In foliis nondum emortuis* (Mich. II p. 280).

Ranunculus Ficaria *L.*

Hypodermeæ.

Æcidium Ficariæ *Pers.* (149). *In foliis.*
Uromyces Ficariæ *Fuck.* (132). *In foliis* (M. S. p. 85).

Phycomyceteæ.

Peronospora Ficariæ *Tul.* *In foliis* (F. V. V p. 171).

Ranunculus auricomus *L.*

Hyphomyceteæ.

Ramularia æquivoca *Sacc.* (486). *In foliis* (Mich. II p. 547).

Ranunculus acris *L.*

Hypodermeæ.

Entyloma Ranunculi *Schröt.* (129). *In foliis* (Mich. I p. 540).
Uromyces Ficariæ *Fuck.* (132). *In foliis* (M. S. p. 85).

Sphæropsideæ.

Discosia Artrocreas *Fr.* 445. (Mich. I p. 201).
Septoria Ranunculacearum *Lev.* (433). *In foliis* (M. S. p. 197).

Hyphomyceteæ.

Ovularia decipiens *Sacc.* (478). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 546).

Melanconieæ.

Cylindrosporium Ranunculi *Sacc.* (454) *In foliis.*

Ranunculus bulbosus *L.*

Hypodermeæ.

Entyloma Ranunculi *Schröt.* (129). *In foliis* (Mich. I p. 540).
Urocystis Anemones *Rabh.* (130). *In caule* (Mich. I p. 8).

Phycomyceteæ.

Peronospora Ficariæ *Tul. In foliis* (F. V. V p. 171).

Melanconieæ.

Cylindrosporium Ranunculi *Sacc.* (454). *In foliis.*

Discomyceteæ.

Fabrea congener *Sacc.* (358). *In pag inf. foliorum.*

Ranunculus repens *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora Ficariæ *Tul. In foliis* (F. V. V p. 171)

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Ranunculi *Sacc. et Speg.* (372). *In foliis* (Mich. I p. 150).

Hyphomyceteæ.

Didymaria Ungeri *Srd.* (*Ramularia didyma* Ung.) (485). *In pag. inf. foliorum* (F. V. V p. 186).

Illosporium maculicola *Sacc.* (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Caltha palustris *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Zopfii *Wint* (*P. Calthæ* Lk.) (142). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 364).

Eranthis hyemalis *Salisb.*

Sphæropsideæ.

Septoria Cajadensis *Speg.* (429). *Ad folia viva vel languida* (Mich. II p. 479).

Helleborus viridis *L.*

Hypodermeæ.

Urocystis Anemones pompholygodes *Fuck.* (130). *In foliis* (M. S. p. 74).

Pyrenomycetæ.

Leptosphæria Lathonia *Sacc.* (247). *In foliis* (F. V. II p. 310).

Sphærella Hermione *Sacc.* (211). *In foliis languentibus* (F. V. II p. 301).

Sphærella Lachesis *Sacc.* (211). *In foliis exsiccatis et emortuis putrescentibus* (Mich. I p. 456).

Discomycetæ.

Calloria rubicunda *Sacc. et Speg.* (347). *In pag. inf. foliorum putrescentium* (Mich. I p. 429).

Pirottæa Veneta *Sacc. et Speg.* (338). *In caule, rāmis et foliis emortuis* (Mich. I p. 424).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Hellebori *Sacc.* (415). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 166).

Phyllosticta helleborella *Sacc.* (368). *In foliis* (Mich. I p. 143).

Isopyrum thalictroides *L.*

Hypodermeæ.

Triphragamium Isopyri *Mong.* (144). *In pag. inf. foliorum viventium* (Mich. I p. 363).

Aquilegia vulgaris *L.*

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicola *Sacc.* (543). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Hypodermeæ.

Æcidium Aquilegiæ *Pers.* (149). *In foliis.*

Delphinium Ajacis *L.*

Pyrenomyceteæ.

Chætomium Fieberi *Cda.* (188). *In caule putre* (F. V. V p. 173).

Aconitum Lycoctonum *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Trollii *Karst.* (*P. Lycotomi* Fuck.) (139). *In pag. inf. foliorum* (F. V. V p. 168),

Uromyces Aconiti *Fuck.* (133). *In pag. sup. foliorum* (F. V. V p. 170).

Discomyceteæ.

Pirottea gallica *Sacc.* (338) *In caulibus* (Mich. II p. 259).

Sphæropsideæ.

Septoria Lycoctoni *Speg.* (429). *In foliis vivis v. languidis* (Mich. II p. 167).

Aconitum Napellus *L.*

Hypodermeæ.

Æcidium Aconiti-Napelli *Wint.* (149). *in foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria Aconiti *Sacc.* (244). *In caulibus aridis* (F. V. II p. 315).

Leptosphæria scotophila *Sacc.* (246). *In caulibus* (F. V. II p. 317).
Mazzantia Napelli *Sacc.* (292). *Sacc. In caulibus* (F. V. IV p. 25).
Metasphæria rupicola *Sacc.* (260). *In caulibus emortuis.*
Nectria dacrymycella *Karst.* (134) *In caulibus* (Mich. II p. 163).

Sphæropsideæ.

Septoria Napelli *Speg.* (434). *Ad folia viva* (Mich. II p. 166-278).

Hyphomyceteæ.

Ramularia monticola *Speg.* (486). *Ad folia viva* (Mich. II p. 286).

Aconitum.

Pyrenomyceteæ.

Hypoderma commune *Duby* (310). *In caulibus.*
Ophiobolus vulgaris *Sacc.* (277). *In caule* (Mich. II p. 253).

Discomceteæ.

Lachnella (*Trichopeziza*) relicina *Sacc.* (328). *In caulibus putridis* (Mich. II p. 164).

Sphæropsideæ.

Leptothyrium vulgare *Fr.* (442). *In caulibus emortuis.*

Actea spicata *L.*

Sphæropsideæ.

Leptothyrium vulgare *Fr.* (442). *In caulibus emortuis.*

Pæonia corallina *Retz.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Pæoniæ *Sacc. et Speg.* (377). *In foliis* (Mich. I p. 160).

Pæonia peregrina *Mill.* (*P. officinalis*).

Hypodermeæ.

Cronartium flaccidum *Wint.* (146). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 11).

Sphæropsideæ.

Discosia Artocreas *Fr.* (445). *In foliis* (Mich. I p. 201).
Septoria macrospora *Sacc.* *In foliis languidis* (Mich. II p. 538).

Leptostromella hysterioides *Sacc.* (445), *In caulibus languidis vel emortuis.*

Anonaceæ.

Anona tribola *L.*

Sphæropsideæ.

Diplodia Anonæ *Sacc.* (405). *In ramis crassioribus* (Mich. II p. 269).

Magnoliaceæ.

Magnolia grandiflora *L.*

Hymenomycetæ.

Irpex canescens *Fr.* (105). *Ad ramulos emortuos.*

Pyrenomyceteæ.

Botryosphæria Bérengeriana (207). *DNtrs.* (F. V. IV p. 4).
Diaporthe Americana *Speg.* (277). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 458.
Lophodermium hysterioides *Sacc.* (310). *In foliis aridis.*

Sphæropsideæ.

Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Diplodia Magnoliæ *West.* (408). *In foliis ramulisque* (F. V. V p. 210).
Hendersonia Magnoliæ *Sacc.* (419). *In foliis languidis* (Mich. I p. 216).
Phyllostieta Magnoliæ *Sacc.* (368). *In foliis* (Mich. I p. 139).

Hyphomycetæ.

Pestalozzia Guepinii *Dessm.* (466). *In foliis.*
Verticillium Candelabrum *Bon.* (481). *In foliis putrescentibus.*

Magnolia Yulan *Desf.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria Yulan *Sacc.* (248). *In foliis languidis* (F. V. II p. 312).

Liriodendron Tulipifera *L.*

Pyrenomyceteæ.

Kalmusia dealbata *Sacc.* (258). *In trunco decorticato adhuc vivo* (Mich. I p. 379).

Sphærella elatior *Sacc. et Speg.* (210). *In pag. inf. fol. putrescentium* (Mich. I p. 379).

Berberideæ.

Epimedium alpinum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Lophiotrema (*Lophiostoma*) vagabundum *Sacc.* (299). *In caulibus* (Mich. I 447)).

Lophodermium Epimedii *Sacc.* (311). *In caulis emortuis* (Mich. p. 56).

Sphærella Epimedii *Sacc.* (211). *In pag. plerumque superiori foliorum emortuorum* (Mich. II p. 532).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Epimedii *Sacc.* (372). *In foliis* (Mich. I p. 149).

Berberis vulgaris *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Graminis (*Æcidium Berberidis Gm*) *Pers. em de Bary.* (142). *In foliis* (M. S. p. 84).

Pyrenomyceteæ.

Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183). (Mich. I p. 91).

Cucurbitaria Berberidis *Gray.* (274). *In ramulis* (M. S. p. 121).

Diaporthe detrusa *Fuck.* (223). *In ramis* (F. V. IV p. 12).

Didymosphæria epidermidis *Fuck.* (236). *In ramis corticatis.*

Didymella (*Didymosphæria*) Cadubriæ *Sacc.* (216) *In ramulis* (F. V. II p. 324).

Eutypa heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis* (F. V. IV p. 15).

Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).

Fenestella (*Thyridium*) vestita *Sacc.* (276). *In ramis putrescentibus* (F. V. IV p. 14).

Lophodermium hysterioides *Pers. Sacc.* (310). *In foliis.*

Massaria marginata *Fuck.* (243). *In ramis emortuis.*

Microsphæra Berberidis *Lév.* (164). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I. p. 439).

Pleonectria Lamyi *Sacc.* (289). *In ramis emortuis* (F. V. V p. 578).

Plowrightia (*Dothidea*) Berberidis *Sacc.* (294). *In ramis igne fere ustis* (F V. V p. 182).

Sphærella Berberidis *Fuck.* (210). *In foliis* (M. S p. 209).

Valsaria insitiva *Ces. et DeNtrs* (239). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).

Discomyceteæ.

Lachnella Berberidis *Fuck.* (327). *In ramis* (F. V. V. p. 185).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium Fuckelii *Sacc.* (399). *In ramis* (Mich. I p. 207).
Hendersonia sarmentorum *West.* (418). *In ramis* (Mich. I p. 214).
Phoma Berberidis *Sacc.* (378). *In ramis emortuis* (Mich. I 259).
Phyllosticta Berberidis *Rabh.* (365). *In foliis* (Mich. I 133).
Septoria Berberidis *Niessl.* (426). *In foliis* (Mich. I 178).

Hyphomyceteæ.

Tubercularia Berberidis *Thüm.* (532). *In ramulis* (Mich. II p. 298).

Mahonia Aquifolium *Nutt.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Mahoniæ *Speg.* (233). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 457).
Diaporthe crassiuscula *Sacc. et Bizzoz.* (223). *In ramis emortuis.*

Discomyceteæ.

Stictis æcidiiformis *Speg.* (354). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 471).

Sphæropsideæ.

Diplodia Mahonia *Sacc.* (408). *In foliis languidis* (*Mich.* II p. 268).
Phyllosticta Mahoniæ *Sacc. et Speg.* (373). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 153).

Nymphæaceæ.

Nelumbium.

Hyphomyceteæ.

Fusarium obtusiusculum *Sacc.* (538). *In hibernaculis putrescentibus* (Mich. II p 297).

Nymphæa alba *L.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta hydrophila *Speg.* (373). *In foliis languidis* (Mich. II. p. 277).

Menispermaceæ

Menispermum canadense. *L.*

Pyrenomyceteæ.

Botryosphæria Bérengeriana *DNtrs* (207). (F. X. IV p. 4).
Leptosphæria Coniothyrium *Sacc.* (244). (F. V. II p. 317).

Discomyceteæ.

Calloria vinosa *Fr.* (346). *In sarmentis* (Mich. I p. 63).

Sphæropsideæ.

Diplodia sarmentorum *Desm.* (410). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 255).

Cocculus laurifolius *D. C.*

Hyphomyceteæ.

Oospora propinqua *Sacc.* (468). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II 545).

Papaveraceæ

Papaver somniferum *L.*

Phycomycetaæ.

Peronospora arborescens de *Bary.* (155). *In pag. inf. foliorum* (M. S. p. 88).

Pyrenomyceteæ.

Sphærella morphæa *Sacc.* (213). *In stigmate capsularum* (Mich. I p. 35).
Pyrenophora pellita *Sacc.* (271). *In caulibus emortuis.*

Sphæropsideæ.

Phoma morphæa *Sacc.* (382). *In stigmate fructus* (Mich. II p. 273).

Chelidonium majus *L.*

Sphæropsideæ

Septoria Chelidonii *Desm.* (428). *In foliis languidis* (F. V. V p. 206).

Fumaria officinalis *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora affinis *Rossm.* (154). *In foliis* (F. V. V p. 171)

Corydalis solida *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora Corydalis *De Bary.* (153). *In foliis.*

Cruciferæ.

Cheiranthus Cheiri *L.*

Pyrenomyceteæ.

Gibberella (*Botryosphæria*) pulicaris *Ces. et DNtrs.* (288). *Subsp. Saubinetii* (F. V. IV 5). *In ramis.*

Sphæropsideæ.

Phoma Siliquæ *Sacc.* (382). *In siliquis* (Mich. II p. 272).
Septoria Cheiranthi *Desm.* (433). *In foliis* (M. S. p. 195).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Cheiranthi *Sacc* (517). *In foliis languidis* (F. V. V p. 187).

Barbarea vulgaris *R. Br.*

Phycomyceteæ.

Cystopus candidus *De Bary.* (156). *In foliis, caulibus, calicibusque* (M. S. 88).

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria Dolioum *Ces. et DNtrs.* (243). *In caulibus* (F. V. II. 314).
Leptosphæria maculans *Ces. et DNtrs.* (245). *In caulibus emortuis.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora Nasturtii *Pass.* f. Barbaraceæ *Sacc.* (517). *In foliis* (Mich. II p. 557).
Cercospora Barbareæ *Sacc.* (517). *In foliis.*

Arabis hirsuta *Scop.*

Phycomyceteæ.

Cystopus candidus *De Bary* (156). *In foliis* (Mich. I p. 454).

Arabis ciliata *R. Br.*

Pyrenomyceteæ.

Pyrenophora (*Pleospora*) comata *Niessl.* (271). *In foliis aridis* (F. V. II p. 309).

Sphæropsideæ.

Rhabdospora (*Septoria*) longissima *Sacc.* (438). *In caule* (Mich. II p. 280).
Septoria Arabidis *Sacc.* (434). *In foliis* (Mich. I p. 192).
Phoma Berkeley *Sacc.* (381). *In caulibus putrescentibus.*

Dentaria enneaphyllos *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora parasitica *De Bar. Rabh.* (153). *In foliis* (Mich. II. p. 158).

Hesperis matronalis *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Tulasnei *NKe.* (229). *In caulibus* (Mich. I. p. 390).
Leptosphæria Doliolum *Ces et DNtrs.* (243). *In caulibus* (F. Ven. XII p. 314).
Leptosphæria Galiicola *Sacc.* (244). *In caulibus* (F. V. II p. 315).
Lophiostoma insidiosum *Ces. et DNtrs* (302). (Mich I p. 447).
Ophiobolus (*Rhapidophora*) Hesperidis *Sacc.* (277). *In caule ramisque exsiccatis* (M. S. p. 101).
Phomatospora Berkeley *Sacc.* (205). *In caulibus putrescentibus.*

Hyphomyceteæ.

Dendryphium ramosum *Cooke.* (517) *In caule putre* (F. V. V p. 191).

Sisymbrium officinale *Scop.*

Phycomyceteæ.

Cystopus candidus *De Bary* (156). *In foliis* (Mich. I p. 454).

Sisymbrium Alliaria *Scop.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria maculans *Ces. et DNtrs.* (245). *In caulibus emortuis.*

Erysimum officinale *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora parasitica *De Bary.* (153). *In foliis.*

Brassica oleracea *L*

Phycomyceteæ.

Cystopus candidus *de Bary.* (156). *In foliis, caulibus, calicibusque* (M. S. p. 88).

Pyrenomyceteæ.

Anixia perichænoides *Sacc.* (167). *Ad caules.*
Leptosphæria maculans *Ces. et DNtrs* (245). *In caulibus emortuis.*
Sordaria lanuginosa *Sacc.* (189). *In caulibus ramisque putridis.*

Spæropsideæ.

Phoma Lingam *Desm.* (381). *In caulibus.*
Phyllosticta (*Depazea*) Brassicæ *Curr. In foliis* (M. S. p. 193).

Hyphomyceteæ.

Alternaria Brassicæ *Sacc.* (522). *In maculis aridis foliorum* (Mich. II p. 172).

Schizomyceteæ.

Ascococcus Billrothi *Cohn.* (24). *Ad radices coctas.*

Lunaria annua *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria Lunariæ *Sacc.* (249). *In siliquis.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora crassa *Sacc.* (521). *In foliis languidis.*

Alyssum calycinum *L.*

Phycomyceteæ.

Cystopus candidus *De Bary.* (156). *In foliis, caulibus, calicibusque* (M. S. 88).

Cochlearia Armoracia *L.* (*Armoracia rusticana* Baumg.)

Phycomyceteæ.

Cystopus candidus *Pers.* (156). *In foliis vivis.*

Sphæropsideæ.

Septoria Armoraciæ *Sacc.* (432). *In foliis* (Mich. I p. 187).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Armoraciæ *Sacc.* (517). *In foliis* (F. V. V p. 188).
Ramularia Armoraceæ *Fuck.* (Mich. II p. 550).

Thlaspi Bursa-pastoris *L.* (*Capsella B. p. Vent.*).

Phycomyceteæ.

Cystopus candidus *de Bary.* (156). *In foliis, caulibus, calicibusque* (M. S. p. 88).
Peronospora parasitica *De Bary.* (153). *In caulium ramorumque apice fructifero* (Mich. II p. 216).

Lepidium graminifolium *L.*

Sphæropsideæ.

Leptostromella (*Leptostroma*) tenue *Sacc.* (445). *In caule* (Mich. II. p. 282).

Iberis umbellata *L.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora crassa *Sacc.* (521). *In foliis languidis.*

Bunias Erucago *L.*

Hypodermeæ.

Æcidium Bunii *D. C. In foliis* (Mich. I p 541).

Capparideæ.

Capparis spinosa *L.* (*C. rupestris Sibth*).

Phycomyceteæ.

Cystopus Capparidis *d. By.* (156). *In foliis* (Mich. I p. 12).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Castrensis *Sacc. et Speg.* (226). *In ramulis* (Mich. I p. 388).

Pleospera Collaltina *Sacc. et Sp.* (270). *In caulibus ramisque.*

Sphæropsideæ.

Camarosporium (*Hendersonia*). Suseganensis *Sacc. et Speg.* (423). *In foliis* (Mich. I p. 209).

Hendersonia rupestris *Sacc. et Speg.* (419). *In foliis* (Mich. I p 215).

Hendersonia biseptata *Sacc.* (419). *In ramulis.*

Phyllosticta Capparidis *Sacc. et Speg.* (367). *In foliis* (Mich. I p. 139).

Phyllosticta disciformis *Penz.* (366). *Ad folia viva.*

Septoria Capparidis *Sacc.* (430). *In foliis* (Mich. I p. 185).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Capparidis *Sacc* (517). *In foliis vivis v. languidis* (F. V. I p. 189).

Resedaceæ.

Reseda odorata *L.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora Resedæ *Fuckl.* (518). *In foliis* (F. V. V p. 190).

Cistineæ.

Helianthemum guttatum *Mill.*

Phycomyceteæ.

Peronospora leptoclada *Sacc.* (153). *In pag. inf. foliorum languidorum* (Mich II p. 530).

Helianthemum pulverulentum *D. C.*

Sphæropsideæ.

Leptothyrium protuberans *Sacc.* (442). *In caulibus emortuis.*

Helianthemum vulgare *Gært.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora Cistinearum *Sacc.* (517). *In foliis languidis* (Mich. I p. 268).

Melanconiæ.

Glœosporium phacidioides *Speg.* *In foliis* (Mich. II p. 284).

Bixaceæ

Kiggelaria africana *L.*

Hyphomyceteæ.

Ramularia Kiggelariæ *Sacc.* (436). *In foliis languidis* (Mich. II p. 286).

Violaceæ.

Viola biflora *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia alpina *Fuck.* (136). *In foliis vivis* (Mich. II p. 156).

Viola odorata *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Violarum *Lk.* (142). *In foliis* (M. S. p. 79).
Urocystis Violæ *Fisch.* (130). *In foliis* (Mich. I p. 438).

Sphæropsideæ.

Septoria Violæ *Rabh.* (430). *In foliis* (M. S. p. 196).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Violæ *Sacc.* (518). *In foliis languidis* (F. V. V p. 187).
Illosporium maculicola *Sacc.* (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I. p. 263).
Ramularia lactea *Sacc.* (487). *In pagina sup. foliorum* (Mich. II p. 549).

Viola canina *L.* (*V. sylvestris Lam.*).

Hypodermeæ.

Puccinia Violarum *Lk. em Fuck.* (142). *In foliis* (M. S. p. 79).

Viola tricolor *L.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Violæ *Desm.* (368). *In foliis* (Mich. I p. 143).

Hyphomyceteæ.

Ramularia agrestis *Sacc.* (487). *In foliis languidis* (Mich. II p. 550).

Viola.

Hypodermeæ.

Puccinia Violarum *Lk.* (142). *In foliis.*

Spæropsideæ.

Ascochyta Violæ *Sacc. et Speg.* (412). *In foliis* (Mich. I p. 163).

Droseraceæ.

Drosera rotundifolia *L.*

Sphæropsideæ.

Phoma inconspicua *Speg.* (382). *In scapis floralibus emortuis* (Mich. II p. 273).

Frankeniaceæ.

Frankenia pulverulenta *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia pulvinata Rud. (*P. alsofila Sacc.*) (137). *In foliis* (Mich. I p. 241).

Caryophylleæ.

Gypsophila saxifraga *L.* (*Tunica saxifraga Scop.*)

Pyrenomyceteæ.

Lophiosphæra (*Lophiostoma*) Anaxea *Sacc.* (297). *In radicibus* (Mich. I p. 468).

Sphæropsideæ.

Rhabdospora (*Septoria*) Tunicæ *Sacc.* (438). *In caulibus languidis* (Mich. I pag. 193).

Saponaria officinalis *L.*

Pyrenomyceteæ.

tibus (Mich. I p. 26-225).
Diaporthe intermedia *Sacc.* (229). *In caulibus* (F. V. IV p. 9).
Lophiostoma insidiosum *Ces. et DNtrs.* (302). Mich. I p. 447).
Ophiobolus vulgaris *Sacc.* (277). *In caulibus.*
Sordaria lanuginosa *Sacc.* (189). *In caulibus ramisque putrescen-*

Sphæropsideæ.

Coniothyrium Saponariæ *Sacc. et Speg.* (398). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 204).
Hendersonia pulchella *Sacc.* (417). *In ramis* (Mich. I p. 213).
Phoma intermedia *Sacc.* (386). *In caulibus* (F. V. V p. 201).
Phyllosticta Saponariæ *Sacc.* (373). *In foliis* (Mich. I p. 154).
Septoria Saponariæ *Sacc.* (432). *In foliis languidis* (F. V. V p. 205).

Dianthus Armeria *L.*

Hyphomyceteæ.

Sporocybe tessulata *Sacc.* (528). *In caulibus* (Mich. II p. 299).

Dianthus barbatus *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria dianthicola *Sacc.* (434). *In foliis* (Mich. I p. 192).
Septoria Dianthi *Desm.* (432). *In foliis* (Mich. I. p. 187).

Hyphomyceteæ.

Heterosporium Dianthi *Sacc. In foliis* (Mich. II p. 559).

Dianthus Saxifragus *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Dianthi *Desm.* (432). *In foliis* (M. S. p 197).

Dianthus caryophyllus *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces caryophyllinus *Wint.* (*Dianthi Niessl.*) (133). *In foliis* (F. V. V p. 170).

Pyrenomyceteæ.

Pleospora Dianthi *Fuck.* (269). *In caulibus emortuis* (M. S. p. 103).

Sphærospideæ.

Diplodia Dianthi *Ces.* (410). *In caulibus* (M. S. p. 202).

Dianthus monspessulanus *L.*

Sphæropsideæ.

Placosphæria Stellariæ *Fuck.* (393). *In foliis caulibusque* (Mich. II p. 283).

Dianthus Sinensis *L*

Hypodermeæ.

Uromyces Sinensis *Speg.* (132). *Ad folia viva vel languida* (Mich. II p. 156).

Sphæropsideæ.

Septoria Sinarum *Speg.* (429). *Ad folia viva vel languida* (Mich. II p. 279).

Dianthus

Phycomyceteæ.

Peronospora Dianthi (*De Bary*). (154). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Pleospora vulgaris *Nits.* (269). *In caulibus emortuis.*
Pleospora media *Niessl.* (269). *In caulibus emortuis.*

Sphæropsideæ.

Leptostromella hysterioides *Sacc.* (445). *In caulibus languidis vel emortuis.*
Vermicularia Dematium *Fr.* (391). *In caulibus* (M. S. p. 191).

Silene pendula *L.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta nebulosa *Sacc.* (373). *In foliis languidis vel emortuis* (Mich. II p, 276).

Silene Armeria *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora Dianthi *de Bary.* (154). *In pag. inf. foliorum juvenilium* (M. S. p. 88).

Silene alpestris *Jacq.*

Pyrenomyceteæ.

Pyrenophora (*Pleospora*) comata *Sacc.* (272). *var.* macrochæta *Sacc. In foliis emortuis* (F. V. II p. 309).

Silene nutans *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces inæquialtus *Lasch.* (U. Silenes *Fuck.*) (135). *Ad folia inferiora* (M. S. p. 85).

Silene inflata *Sm.*

Hypodermeæ.

Æcidium Behenis *D. C.* (133). *In foliis ramulisque* (Mich. I. p. 11).

Puccinia Silenes *Schröter* (P. Lychnidearum *Lk. em Fuck.*) (141). *In foliis* (M. S. p. 80.).

Sorosporium Saponariæ (Ustilago Rudolphi *Tul.*) (130). *In ovariis immaturis* (M. S. p. 74).

Uromyces Behenis *Lév.* (133). *In foliis caulibusque* (F. V. V p. 170).

Ustilago violacea *Tul.* (129). *In antheris* (F. V. V. p. 167).

Pyrenomyceteæ.

Schizothyrium commutatum *Sacc.* (305). *In caule.*

Silene.

Pyrenomyceteæ.

Pleospora oligomera *Sacc. et Speg.* (268). *In caule putri* (Mich. I p. 408).

Sphæropsideæ.

Phoma melæna *Mont et Dur.* (381). *In caulibus exsiccatis.*

Lychnis alba *Mill.* (*L.* dioica *L.*).

Hypodermeæ.

Puccinia Arenariæ *Wint.* (P. Agrostemmatis *Fuck.*) (136). *In foliis* (M. S. p. 207).

Pyrenomyceteæ.

Lophiostoma insidiosum *Cest. et DNtrs.* (302). (Mich. I. p. 447).

Sphæropsideæ.

Hendersonia pulchella *Sacc.* (417). Mich. I. p. 213).

Rhabdospora (*Septoria*) nigrella *Sacc.* (438) *In caulibus* (Mich. I p. 194).

Septoria Lichnidis *Klotsch.* (432) *In foliis* (M. S. p. 196).

Cucubalus bacciferus *L.*

Hyphomyceteæ.

Fusarium roseum *Link.* (537). *In caule* (Mich. II p. 295),

Cerastium vulgatum *L.* (*C.* triviale *Link.*).

Hypodermeæ.

Puccinia Arenariæ *Wint.* (136). (P. Stellariæ *Dub.*) (136). (M. S. p. 207).

Pycomyceteæ.

Perenospora Alsinearum *Caspary.* (154). *In foliis* (Mich. I p. 12).

Sphæropsideæ.

Septoria Cerastii *Rob. et Desm.* (429). *In foliis caulibusque languentibus* (Mich. I p. 260).

Hyphomyceteæ.

Isariopsis albo-rosella *Sacc.* (530). *In foliis.*

Cerastium arvense *L.*

Hypodermeæ.

Melampsorella Caryophyllacearum *Schröt.* *In foliis* (Mich. II p. 245).

Stellaria media *Vill.*

Phycomyceteæ.

Peronospora Alsinearum *Caspary.* (154). *In foliis* (Mich. I p. 12).

Hypodermeæ.

Puccinia Arenariæ *DC.* (136). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Sphærella isariophora *DNtrs.* (212). *In foliis exsiccatis.*

Discomyceteæ.

Pseudopeziza Cerastiorum *Schröt.* (357). *In foliis languidis* (Mich. I p. 253).

Sphæropsideæ.

Septoria Stellariæ *Rob. et Desm.* (429). *In foliis languidis* (Mich. I p. 182).

Hyphomyceteæ.

Isariopsis alborosella (Isariopsis pusilla) *Fres.* (530). *In foliis languidis* (Mich. I p. 273).

Stellaria holostea *L.*

Pyrenomyceteæ.

Euryachora Stellariæ *Fuck.* (293). *In foliis inferioribus* (M. S. p. 146).

Sphærella Isariphora *De Not.* (212). *In foliis emortuis* (M. S. p. 94).

Sphæropsideæ.

Pestalozzia herbicola *Sacc.* (460). *In foliis exsiccatis* (M. S. p. 199).

Arenaria.

Phycomyceteæ.

Peronospora Alsinearum *Caspary.* (154). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Pyrenophora (*Pleospora*) comata *Sacc.* (272). *In foliis aridis* (F. V. II p. 309).

Alsine lanceolata *M. et K.* (Facchinia lanceolata *Rchb.*).

Pyrenomyceteæ.

Pyrenophora (*Pleospora*) Venziana *Sacc.* (271). *In foliis sepalisque exsiccatis* (F. V. II p. 308).

Sphærella Venziana *Sacc.* (212). *In foliis et in sepalis aridis* (F. V. II p. 303).

Alsine

Phycomyceteæ.

Peronospora Alsinearum *Caspary.* (151). *In foliis.* (Mich. I p. 12).

Cherleria sedoides *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sphærella Venziana *Sacc.* (212). *In foliis sepalisque exaridis.*

Sphæropsideæ.

Phoma Massalongi *Sp.* (382). *In foliis languentibus.*

Portulaceæ.

Portulaca oleracea *L.*

Phycomyceteæ.

Cystopus Portulacæ *de Bary.* (156). *In foliis* (Mich. I p. 242).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Portulacæ. *Sacc. et Speg.* (369). *In foliis* (Mich. I p. 145).

Tamariscineæ.

Tamarix gallica *L.*

Pyrenomyceteæ.

Cryptovalsa Rabenhoristii *Sacc.* (183). (Mich. I p. 21).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium cæspitulosum *Sacc.* (399). *In ramulis* (Mich. I p. 206).

Myricaria germanica *Desv.*

Pyrenomyceteæ.

Didymella cadubrina *Speg.* (216). *In ramulis emortuis* (Mich. II p. 248).

Discomyceteæ.

Pyrenopeziza Tamaricis *Sacc.* *In ramis decorticatis* (Mich. II p. 536).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Germanica *Speg.* (376). *Ad folia languida* (Mich. II p. 277).

Hypericineæ.

Hypericum Androsæmum *L.* (Androsæmum officinale *All.*).

Hypodermeæ.

Melampsora (*Cæoma*) Hypericorum *Schlechtd.* (147). *In hypophyllo* (M. S. p. 75).

Pyrenomyceteæ.

Didymella (*Didymosphæria*) exigua *Sacc.* (216). *In foliis languidis* (Mich. I p. 376).
Didymella nemoralis *Sacc* (216). *In foliis languidis.*

Sphæropsideæ.

Diplodia Androsæmi *Sacc.* (410). *In caule* (Mich. II p. 266).

Hypericum calycinum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe obsoleta *Sacc.* (229). *In caule ramisque* (F. V. IV p. 10).
Didymosphæria Epidermidis *Fuck.* (236). (F. V. II p. 323).
Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (245). (F. V. II. 318).

Sphæropsideæ.

Diplodia hypericina *Sacc.* (410). *In caulibus* (Mich. II p. 267).
Pestalozzia truncatula *Fuckl.* (460). *In caule* (F. V. V p. 198).

Hypericum perforatum *L.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta Hyperici *Lasch. In foliis* (M. S. p. 195).

Hypericum

Pyrenomyceteæ.

Didymosphæria brunneola *Niessl.* (236). *In caulibus exsiccatis.*

Terustromiaceæ.

Camellia.

Pyrenomyceteæ.

Meliola Camelliæ *Sacc.* (168). *In foliis et ramis*

Melanconieæ.

Pestallozzia Guepini *Desm.* (466). *In foliis.*

Tiliaceæ.

Tilia platyphylla *Scop.* (T. grandifolia *Ehrh.*).

Melanconieæ.

Glœosporium Tiliæ *Oud.* (451). *In foliis* (Mich. I p. 218).

Tilia parvifolia *Ehrh.*

Pyrenomyceteæ.

Sphærella sparsa *Auersw.* (209). *In foliis.*

Dyscomyceteæ.

Pezicula saccharina *Sacc. In ramis corticatis* (Mich. II p. 536).
Peziza carpophila *Bizz.* (323). *In fructibus immaturis.*

Tilia europæa *L.*

Pyrenomyceteæ.

Capnodium Tiliæ *Sacc.* (169). *In ramulis corticatis.*
Botryosphæria Bérengeriana *DNtrs.* (207). (F. V. IV p. 4).
Eutypa (*Valsa*) heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis* (Mich. I p. 19).
Hercospora Tiliæ *Tul.* (221). *In ramulis* (F. V. V p. 179).

Sphæropsideæ.

Asteroma vagans *Desm.* (389). *In foliis languidis.* (F. V. V p. 199).
Phyllosticta Tiliæ *Sacc. et Speg.* (375). *In foliis* (Mich. I. p. 158).
Rabenhorstia Tiliæ *Fr.* (392). *In ramis.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora microsora *Sacc.* (521). *In foliis.*
Exosporium Tiliæ *Link.* (541). *In ramis corticatis.*
Helminthosporium Tiliæ *Fr.* (514). *In ramis.*

Tilia Americana *L.*

Pyrenomyceteæ.

Coronophora gregaria *Fuck.* (174). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 254).

Tilia

Pyrenomyceteæ.

Hypoxylon rubiginosum *Fr.* (200). *In ramis emortuis.*
Lophiostoma macrostomum *DNtrs.* (301). *In cortice duriore.*
Sphærella maculæformis *Auersw.* (208). *In pag. inf. foliorum.*

Sphæropsideæ.

Cytospora carphosperma *Fr.* (395). *In ramis.*
Discosia Artocreas *Fr.* (445). *In foliis* (Mich. I p. 201).
Phoma velata *Sac.* (384). *In ramis corticatis.*

Hyphomyceteæ.

Steganosporium piriforme *Corda* (461). *In cortice.*
Tubercularia vulgaris *Pers.* (532). *Ad ramos.*

Sterculiaceæ.

Sterculia platanifolia *L.*

Pyrenomyceteæ.

Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). Mich. I p. 15).

Malvaceæ.

Malva sylvestris *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Malvacearum *Mont.* (136). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Ophiobolus porphyrogonus *Sacc.* (277). *In caulibus exsiccatis.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta malvicola *Sacc.* (411). *In foliis* (Mich. I p. 161 et M. S. p. 193).

Althæa rosea *Cav.*

Hypodermeæ.

Puccinia Malvacearum *Mtgn.* (136). *In foliis* (F. V. V p. 168).

Sphæropsideæ.

Diplodia Althææ *Speg.* (410). *In caulibus emortuis putrescentibus* (Mich. I p. 485).
Phoma Malvacearum *West.* (381). *In caulibus* (Mich. I. p. 258).
Phoma labilis *Sacc.* (381). *In caulibus.*
Phyllosticta althæina *Sacc.* (368). *In foliis* (Mich. I p. 143).

Hyphomyceteæ.

Cercospora althæina *Sacc.*. (518). *In foliis* (Mich. I p. 269).
Cercospora nebulosa *Sacc.* (518). *In caulibus languidis* (F. V. V p. 189).
Helminthosporium striiforme *Corda.* (516). *In caule* (Mich. II p. 174).
Periconia chlorocephala *Fres.* (503). *In caule putrescente* (F. V. V p. 192).

Hibiscus syriacus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe fasciculata *Nke.* (226). *In ramis dejectis putridis* (M. S. p. 140).
Diaporthe Ophites *Sacc.* (233). *In ramis emortuis* (F. V. IV p. 13).

Giberella pulicaris *Sacc.* (288). *In ramis corticalis.*
Eutypa (*Valsa*) heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis corticalis* (M. S. p. 129).
Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239) *In ramis.* (Mich. I. p. 32).

Sphæropsideæ.

Diplodia syriaca *Sacc.* (405). *In ramis corticalis* (Mich. I p. 255).
Phyllosticta syriaca *Sacc.* (366). *In foliis* (Mich. I p. 136).
Septoria Hibisci *Sacc.* (425). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 173).

Geraniaceæ.

Geranium sylvaticum *L.*

Hyphomyceteæ.

Ramularia Geranii *Fuck.* (487). *Ad foglia viva v. languida* (Mich. II. p. 170).

Geranium macrorrhizum *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Morthieri *Körn.* (136). *In foliis* (Mich. II p. 156).

Geranium nodosum *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Geranii *Wint.* (Uromyces puccinioides *Rabh.*) (135). *In foliis* (F. V. V p. 170).

Geranium Robertianum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Stigmatea Robertiani *Fr.* (215). *In foliis adhuc vivis* (Mich. I. p. 34).

Sphæropsideæ.

Septoria Geranii *Rob. et Desm.* (433). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 188).

Geranium.

Pyrenomyceteæ.

Venturia circinans *Sacc.* (220). *In pag. sup. fol.*

Erodium ciconium *W.*

Phycomyceteæ.

Peronospora Erodii *Fuk. In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 246).

Impatiens Noli-tangere *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia argentata *Schulh.* (P. Noli-tangere *Cda.*) (139). *In foliis languidis* (Mich. I p. 364).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Campi-Silii *Speg.* (520). *In foliis vivi v. languidis* (Mich. II p. 171).

Tropæolum majus *L.*

Spæropsideæ.

Phyllosticta Tropæoli *Sacc. et Speg.* (373). *In foliis* (Mich. I p. 152).

Oxalis Acetosella *L.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Oxalidis *Sacc.* (368). *In foliis* (Mich. I p. 310).

Oxalis stricta *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria Aglaia *Sacc.* (217). *In foliis* (Mich. I p. 142).
Sphærella Silenes *Sacc.* (212). *In foliis languidis* (F. V. II p. 301).

Linum catharticum *L.*

Hypodermeæ.

Melampsora Lini *Tul.* (147). (M. S. p. 76).

Rutaceæ.

Dictamnus albus *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Dictamni *Fuck.* (434). *In foliis* (Mich. I p. 192).

Aurantieæ.

Citrus limonum *Risso.*

Pyrenomyceteæ.

Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).
Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (245). *In ramulis corticatis* (Penzig. Fung, Agr. p. 415).
Melanomma longicolle *Sacc.* (255) *In ramis decorticatis* (Mich. I p. 449).
Microthyrium Citri *Penz* (296). *In pag. sup. foliorum vivorum.*
Physalospora citricola *Penz.* (206). *In foliis.*
Sphærella Gibelliana *Pass.* (209). *In foliis languidis.* (Mich. I p. 379).

Discomyceteæ.

Helotiella Citri *Sacc.* (339). *In cortice ramorum.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta Citri *Penz.*, (415). *In foliis.*
Ascochyta Hesperidearum *Penz.* (414). *In foliis.*
Dendrophoma valsispora *Penz.* (388). *In foliis vivis.*
Diplodia Auranthi *Penz.* (405). *In ramis corticatis putrescentibus.*
Phoma Citri *Sacc.* (354). *In ramis.*
Phoma dolichopus *Penz.* (378). *In ramulis vivis corticatis.*
Phoma eustegia *Penz. et Sacc.* (378). *In foliis languidis.*
Phoma limonis *Thümen.* (377). *In ramulis emortuis.*
Phyllosticta (*Phoma*) Hesperidearum *Catt.* (371). *In foliis subputrescentibus.*
Phyllosticta disciformis *Penz.* (366). *In foliis vivis.*
Phyllosticta marginalis *Penz.* (366). *In foliis vivis.*

Hyphomyceteæ.

Acrostalagmus albus *Preuss.* (483). *In foliis a Lecanio Hesperidum invasis.*

Cercospora fumosa *Speg.* (510). *In pag. inf. foliorum.*
Cladosporium compactum *Sacc.* (511). *In foliis.*
Fusarium sarcochroum *Sacc.* (536). *In ramis corticatis.*
Haplotrichum albidum *Sacc.* (470). *In radicibus emortuis putrescentibus* (Meneg. II p. 288).
Penicillium candidum *Linck.* (473). *Ad folia emortua.*
Penicillium (*Monilia*) digitatum *Pers.* (474). *Ad fructus putridos* (M. S. p. 183).
Verticillum heterocladum *Penz.* (481). *In foliis a Lecanio Hesperidum invasis.*

Melanconieæ.

Gloeosporium intermedium *Sacc.* (450). *In foliis.*

Citrus Aurantium *Risso*

Hymenomycetæ.

Corticium cinereum *Fr.* (*Penzig* Fungi Agrumicoli p. 393). *In truncis.*
Merulius Corium *Fr.* (102). *In truncis et ramis emortuis.*

Pyrenomycetæ.

Amphisphæria Hesperidum *Penz.* (238). *In ligno decorticato.*
Sphærella inflata *Penz.* (210). *In ramulis vivis.*

Sphæropsideæ.

Aposphæria sepulta *Sacc.* (387). *In ligno denudato emortuo.*
Coniothyrium fusco-atrum *Penz.* (399). *In ramulis siccis.*
Phoma iners *Penz.* (378). *In ramulis languidis.*

Hyphomycetæ.

Alternaria Brassicæ *Sacc.* var. Citri. (523). *In petalis staminibusque.*
Cephalosporium acremonium *Corda.* (471). *In foliis.*
Dendrodochium rubellum *Sacc.* (524). *In cortice truncorum foliisque exsiccatis.*
Epicoccum nigrum *Link.* (540). *In foliis aridis.*
Fusarium sarcochroum *Sacc.* (536). *In ramis corticatis.*
Helminthosporium densum *Sacc.* (514). *In cortice* (Mich. II p. 558).
Ramularia Citri *Penzig.* (486). *In foliis deiectis exsiccatis.*
Rhizoctonia violacea *Tul.* (544). *In radicibus.*
Torula fasciculata *Penz.* (496). *In foliis ramulisque.*

Melanconieæ.

Gloeosporium intermedium *Sacc.* (450). *In foliis languidis.*
Gloeosporium macropus *Sacc.* (450). *In foliis languidis.*
Gloeosporium sphæralloides *Sacc.* (450) *In foliis deciduis.*
Trullula nitidula *Sacc.* (454). *In ligno.*

Citrus.

Pyrenomyceteæ.

Capnodium Citri *Berck.* (170). *In foliis ramulisque.* (F. V. V. p. 176).
Leptosphæria citricola *Penz.* (248). *In foliis vivis.*
Meliola Penzigi *Sacc.* (168). *In foliis.*
Pleospora herbarum *Rabh.* (269). *In foliis languidis.*

Sphæropsideæ.

Aposphæria stenostoma *Sacc.* (387). *In ligno emortuo.*
Chætophoma Penzigi *Sacc.* (389). *In foliis vivis; est causa morbi morfea dicti.*
Coniothyrium Fuckelii *Sacc.* (399). *In foliis vivis.*
Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398). *In ramulis.*
Phoma Citri *Sacc.* (384). *In ramis et in ligno decorticato.*
Phoma scabella *Penz.* (377). *In ramulis emortuis.*
Phyllosticta micrococcoides *Penz.* (371). *In foliis juvenilibus.*
Phyllosticta platanoides *Sacc.* (373). *In foliis deciduis.*
Phlyctæna Pseudophoma *Sacc.* (439). *In cortice ramisque decorticatis.*
Rhabdospora Falx *Penz.* (437). *In truncis ramisque vivis.*
Rhabdospora flexuosa *Penz.* (438). *In cortice ramorum vivorum.*
Septoria Arethusa *Penz.* (425). *In maculis aridis foliorum vivorum.*
Septoria Citri *Pass.* (425). *In foliis languidis* (M. I p. 173).
Septoria Limonii *Pass.* *In foliis fructibus immaturis* (Penzig. Fug. Ag. 437).
Septoria Tibia *Penz.* (425). *In foliis vivis.*

Hyphomyceteæ.

Aspergillus glaucus *Link.* (472). *In fructibus putrescentibus.*
Botrytis griseola *Sacc.* (477). *In cortice ramorum.*
Botrytis vulgaris *Fr.* (477). *In ramis languidis vel emortuis.*
Cladosporium elegans *Penz.* (512). *In foliis.*
Cladosporium sphærospermum *Penz.* (511). *In ramulis foliisque languidis.*
Coremium vulgare *Corda.* (525). *In fructibus putrescentibus.*

Epicoccum granulatum *Penz.* (540). *In ligno emarcido, raro in foliis.*
Epicoccum neglectum *Desm.* (540). *In foliis languidis.*
Fusarium constrictum *Penz.* (538). *In foliis emortuis.*
Penicillium glaucum *Link.* (473). *In fructibus putrescentibus.*
Stysanus monilioides *Corda.* (523). *In foliis, floribus fructibusque.*
Torula dimidiata *Kunze.* (496). *In cortice ramorum.*

Melanconieæ.

Colletotrichum gloeosporioides *Corda.* (454) *In foliis ramulisque languentibus.*
Coniosporium phaeospermum *Corda.* (497). *In ligno ramulorum.*
Coryneum concolor *Penz.* (459). *In foliis languidis.*
Periconia clorocephala *Fr.* (502). *In ramis truncatis.*
Periconia pycnospora *Fr.* (503). *In foliis.*
Pestalozzia funerea *Desm.* (459). *In foliis vivis vel mortuis.*
Pestalozzia Guepinii *Desm.* (466). *In foliis.*
Trullula olivascens *Sacc.* (453). *In ramis putridis.*

Limonia australis.

Sphæropsideæ.

Ascochyta Hesperidearum *Penz.* (414). *In foliis.*
Phoma Limoniæ *Penz.* (378). *In ramulis exsiccatis.*
Phyllosticta disciformis. *Penz.* (366). *Ad folia viva.*

Meliaceæ.

Melia Asederach *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe abdita *Sacc. et Speg.* (225). *In ramis emortuis.*
Fenestella vestita *Sacc.* (276). *In ramis corticatis emortuis.*

Simarubeæ.

Ailanthus glandulosa *Desf.*

Hymenomyceteæ.

Auricularia Sambucina *Mart.* (111). *Ad truncos* (M. S. p. 65).
Exidia glandulosa *Fr.* (120). *Ad truncos* (M. S. 69).

Pyrenomyceteæ.

Botryosphæria Bérengeriana *DNtrs.* (207). *In cortice, sub epidermide, et raro supra epidermidem ramorum, truncorumque tabescentium* (M. S. p. 116 — F. V. IV p 4).

Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* *In cortice* (Mich. I p. 21).

Diaporthe Ailanthi *Sacc.* (223). *In ramis iunioribus exsiccatis* (M. S. p. 137).

Diaporthe compressa *Sacc.* (230). *In petiolibus putrescentibus* (F. V. IV. p. 8).

Eutypa (*Valsa*) heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis corticatis* (M. S. p. 129).

Eutypa (*Valsa*) lata *Nke.* (181). *In truncis ramisque decorticatis, ramis in ipso cortice* (M. S. p. 128).

Eutypella (*Valsa*) Ailanthi *Sacc.* (179). *In cortice ramorum* (M. S. p. 130).

Fenestella vestita *Sacc.* (276) *In ramis emortuis putrescentibus* (M. S. p. 122).

Hypoxylon serpens *Fr.* (201). *In ligno denudato, rarius supra corticem* (M. S. p. 152).

Lophiotrema massarioides *Sacc.* (299). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 412).

Lophiostoma insidiosum *Ces. et DNtrs.* (302). *In ramis* (Mich. I p. 447).

Discomyceteæ.

Calloria vinosa *Fr.* (346). *In ramis decorticatis dejectis* (M. S. p. 161).

Sphæropsideæ.

Coniotyrium insitivum *Sacc.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 206).

Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).

Cytisporina Ailanthi *Sacc.* (439). *In ramis* (Mich. II p. 265).

Diplodia Ailanthina *Speg.* (406). *In ramulis emortuis.* (Mich. I p. 484).

Hendersonia sarmentorum *West.* (418). (Mich. I p. 214).

Phyllosticta Ailanthi *Sacc.* (371). *In foliis* (Mich. I p. 148).

Phoma Ailanthi *Sacc.* (385). *In ramis exsiccatis.*

Hyphomyceteæ.

Sporodesmium trigonellum *Sacc.* (501). *In cortice.*

Tubercolaria confluens *Pers.* (532). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 262).

Anacardiaceæ.

Pistacia Terebinthus *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces (*Pileolaria*) Terebinthi *Cast.* (133). *In foliis.* (M. S. p. 87).

Rhus Cotinus *L.*

Hyphomyceteæ.

Spicaria griseola (*Sacc*). (483). *In pag. inf. foliorum putrescentium* (Mich. II p. 552).

Rhus Typhinum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Thyridaria incrustans *Sacc.* (258). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 14).

Spæropsideæ.

Diplodia incrustans *Sacc.* (406). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 209).

Camorosporium (*Hendersonia*) incrustans *Sacc.* (422). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 208).

Coniothyrium incrustans *Sacc.* (398). *In ramis corticatis.*

Rhus glabrum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183). (Mich. I p. 21).

Valsa ceratophora *Tul.* (175). *In ramis.* (Mich. I. 19).

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In ramis* (Mich. I p. 32).

Sphæropsideæ.

Diplodia Rhois *Sacc.* (404). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 254).

Melanconieæ.

Haineria (*Gleosporium*) rhoina *Sacc. et Ellis.* (449). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 540).

Rhus radicans *L.*

Hymenomyceteæ.

Clavaria flaccida *Fr.* (117). *In radicibus* (Mich. I p. 6).

Pyrenomyceteæ.

Botryosphæria Bérengeriana *DNtrs.* (207). *In ramis* (F. V. IV p. 4).
Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183). *In ramis* (Mich. I p. 21).

Spæropsideæ.

Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).

Pittosporaceæ.

Pittosporum Tobira *L.*

Sphæropsideæ.

Diplodia hirtella *Sacc.* (408). *In foliis* (Mich. II p. 268).

Rhamnaceæ.

Evonymus europæus *L.*

Hymenomyceteæ.

Fomes (*Polyporus*) Evonymi *Kalchbr* (9). *In caudice* (F. V. V p. 164).

Hypodermeæ.

Cæoma Evonymi *Sacc.* (150). *In foliis* (M. S. 75).

Pyrenomyceteæ.

Capnodium Footii *Berk. et Desm.* (170).
Diaporthe Laschii *Nke.* (234). *In ramis* (M. S. 211).
Dothidea Sambuci *Fr.* (294). *In ramis* (Mich. I p. 411).
Entypa (*Valsa*) heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis* (Mich. I p. 19).
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). *In ramis* (Mich. I p. 15).
Leptosphæria Castagnei *Sacc.* (246). *In ramulis hornotinis* (F. V. II p. 317).
Lophiostoma simillimum *Karst.* (302). *In ligno ramorum.*
Microsphæra Evonymi *Lév.* (164). *In foliis* (Mich. I p. 14).

Valsa Spegazziniana *Sacc.* (176). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 20).

Sphæropsideæ.

Asteroma frigidum *Sacc.* (389). *In foliis.*
Diplodia Evonymi *Fuck.* (408). *In ramis* (Mich. I p. 221).
Diplodia ramulicola *Desm.* (404). *In ramulis decorticatis et corticatis* F. V. V p. 209).
Phoma ramealis *Desm.* (378). *In ramis siccis.*
Phoma foveolaris *Sacc.* (378). *In ramis siccis.*
Phyllosticta evonymella *Sacc.* (367). *In foliis* (Mich. I p. 138).
Phyllosticta Evonymi *Sacc.* (374). *In foliis* (Mich. I p. 155).
Septoria Evonymi *Rabh.* (424). *In foliis* (M. S. p. 196).

Melanconieæ.

Septogloeum carthusianum *Sacc.* (461). *In foliis languidis.*

Hyphomyceteæ.

Helminthosporium trichellum *Sacc.* f. pluriseptatum *Sacc.* (514). *In cortice* (Mich. II p. 558).
Heterobotrys paradoxa *Sacc.* (497). *In foliis.*

Evonymus japonicus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Hypoderma Hederæ *DNtrs.* var. Evonymi japonici (310). *In foliis deciduis.*

Sphæropsideæ.

Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Cytospora foliicola *L.* (395). *In foliis* (Mich. II p. 264).
Diplodia Evonymi *West.* (408). *In foliis putridis* (F. V. V p. 209)
Phoma cylindrospora *Sacc.* (379). *In foliis.*

Hyphomyceteæ.

Macrosporium trichellum *Arc. et. Sacc.* *In pag. sup. foliorum* (Mich. II p. 558).

Melanconieæ.

Gloeosporium frigidum *Sacc.* (451). *In foliis* (Mich. II p. 168).

Evonymus chinensis *L.*

Pyrenomyceteæ.

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (339). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. 148).

Sphæropsideæ.

Diplodia Evonymi *Fuck.* (408). *In ramis* (M. S. 201).
Phoma (*Sphæropsis*) leucostigma. *Lév.* (382). *In foliis* (M. S. p. 203).

Melanconieæ.

Pestalozzia funerea *Desm.* (459). *In foliis vivis vel emortuis* (Mich. I p. 478).

Evonymus

Pyrenomyceteæ.

Dothidea Sambuci *Fr.* (294). *In ramis* (Mich. I p. 441).

Cassine Maurocenia *L.*

Pyrenomyceteæ.

Capnodium Footii *Berk. et Desm.* (170). *In foliis coriaceis* (Mich. I p. 50).

Ilex aquifolium *L.*

Pyrenomyceteæ.

Aponectria inaurata *Sacc.* (285). *In ramulis.*
Aulographum vagum. (305) *In foliis dejectis.*
Capnodium Footii *Berk. et Desm.* (170). *In foliis* (Mich. I p. 468).

Discomyceteæ.

Stegia Ilicis *Fr.* (357). *In foliis putrescentibus* (F. V. V p. 184).

Sphæropsideæ.

Ceuthospora phacidioides *Grev.* (397). *In foliis.*
Diplodia Ilicis *Fr.* (409). *In foliis dejectis* (F. V. V p. 209).
Diplodia ilicicola *Derm.* (404). *In ramis.*
Phoma Ilicis *Desm.* (378). *In foliis putridis* (F. V. V 202).

Ilex balearica *L.*

Pyrenomyceteæ.

Venturia ilicifolia *Ck. In foliis dejectis* (Mich. I p. 382).

Rhamnus Alaternus *L.*

Sphæropsideæ.

Diplodia clandestina *Mont.* f. foliicola (409). *In foliis languidis* (Mich. II p. 537).

Phoma epiphylla *Sacc.* (379) *In foliis.*

Rhamnus catharticus *L*

Hypodermeæ.

Puccinia coronata *de Bary.* (142) *In foliis vaginisque* (M. S. p. 84).

Pyrenomyceteæ.

Anthostoma gastrinum *Sacc.* 142. *In cortice ramorum* (M. S. p. 143).

Anthostoma melanotes *Sacc.* (196). *In ramis decorticatis.*

Cucurbitaria Rhamni *Fr.* (274). *In ramis* (M. S. p. 121).

Diaporte fibrosa *Nke.* (223). *In truncis ramisque exsiccatis* (M. S. p. 136).

Eutypella extensa *Sacc.* (180). *In ramis.*

Lophiostoma Desmazierii *Sacc. et Speg. In ramulis* (Mich. I p. 411).

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). F. V. IV p. 20).

Discomyceteæ.

Stictis Pupula *Fr.* (353). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 61).

Myxomyceteæ.

Enteridium olivaceum *Eher.* (13). *In ramulis putridis* (Mich. I p. 434).

Sphæropsideæ.

Cicinnobolus Cesatii *DBary.* (390). *In foliis* (F. V. V p. 202).

Coniothyrium insitivum *Sacc.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 206).

Cytospora epileuca *Sacc.* (395). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 265).

Fusicoccum fibrosum *Sacc.* (293). *In truncis et ramis siccis.*

Phyllosticta (*Depazea*) rhamnicola *Lasch.* (375). *In foliis* (M. S. p. 192).

Phyllosticta cathartici *Sacc.* (370). *In pag. sup. foliorum* (Mich. p. 146).

Phyllosticta rhamnigena *Sacc.* (375). *In foliis* (Mich. I p. 156).

Septoria Rhamni cathartici *Ces.* (424). *In foliis* (M. S. p. 196).

Septoria rhamnigena *Sacc.* (427). *In foliis* (Mich. I p. 180).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Rhamni *Fuck.* (520). *In pag. inf. foliorum* (F. V. V p. 188).

Stemphylium inflatum *Sacc.* (523). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. II p. 290).

Stemphylium botriosum *Wallr.* (523). *In ramulis corticatis emortuis* (M. S. p. 180).

Rhamnus saxatilis *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia coronata *de Bary.* (142). *In foliis vaginisque* (M. S. p. 84).

Pyrenomyceteæ.

Lophodermium maculare *DNtrs.* (310). *Ad folia dejecta* (Mich. I p. 468).

Melanomma alpinum *Speg.* (254). *Ad ramulos emortuos* (Mich. I p. 460).

Rhamnus Frangula *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia coronata *Corda em. de Bary.* (142). *In foliis vaginisque* M. S. p. 84).

Pyrenomyceteæ.

Aponectria inaurata *Sacc.* (285). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 464).

Botryosphæria Berengeriana *DNtrs.* (207). *In cortice, sub epidermide et raro supra epidermidem ramorum truncorunque tabescentium.* (M. S. p. 116).

Chilonectria Cucurbitaria *Sacc.* (281). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. I p. 442).

Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183). (Mich. I p. 21).

Cucurbitaria Rhamni *Fr.* (274). *In ramis* (M. S. p. 121).

Diaporthe nigricolor *Nke.* (225). *In ramis emortuis* (M. S. p. 141).

Diaporthe syngenesia *Nke.* *In ramis dejectis* (Mich. II p. 161).

Diatrypella verruciformis *Nke.* *In ramis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 151).

Fracchiæa heterogenea *Sacc.* (173). *In ramis corticatis decorticatisque exsiccatis* (M. S. p. 115).

Karstenula rhodostoma *Speg.* (268). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 162).

Melanomma alpinum *Speg.* (254). *Ad ramulos emortuos* (Mich. I p. 460).

Valsa Auerswaldii *Nke.* (178). *In ramulis* (F. V. V p. 180).

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). (F. V. IV p. 20).

Discomyceteæ.

Dermatella (*Tympanis*) Frangulæ *Fr.* (340). *In ramulis corticatis* (F. V. V p. 185).

Mollisia (*Pyrenopeziza*) aborigena *Speg.* (337). *In ramis decorticatis putrescentibus* (Mich. II p. 259).

Sphæropsideæ.

Asteroma vagans *Desm.* (389). *In foliis languidis.*

Cytospora personata *Fr.* (395). *In ramis.*

Diplodia Frangulæ *Fuck.* (404). *In ramis.*

Dothiorella Bérengeriana *Sacc.* (392). *In ramis* (Mich. II p. 271).

Phyllosticta Rhamni *West.* (376). *In foliis* (Mich. I p. 158).

Rhamnus.

Pyrenomyceteæ.

Diatrype disciformis *Fr.* (184). *In ramis corticatis.*

Hysterographium elongatum *Corda* (309). *In ligno nudo.*

Lophiotrema duplex *Sacc.* (298). *In lignis ramisque exsiccatis.*

Lophiostoma pseudomacrostomum *Sacc.* (300). *In ramis.*

Sphæropsideæ.

Cytospora flavo-virens *Sacc.* (396). *In cortice et ligno.*

Melanconieæ.

Dinemasporium strigosum *Sacc.* (447). *In lignis*

Melanconium sphæroideum *Link.* *In ramulis* (Mich. II p. 118).

Zizyphus sativa *Gært.* (Z. vulgaris *Lmk.*).

Sphæropsideæ.

Septoria Zizyphi *Sacc.* (424). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 173).

Paliurus australis *Gœrt.* (P. aculeatus *Lmk.*).

Pyrenomyceteæ.

Cryptovalsa Nitschkei *Fuck.* (183). *In ramis* (Mich. I p. 22).
Diaporthe meridionalis *Sacc.* (225). *In ramis* (Mich. I p. 387).
Valsaria insitiva *Ces et DNtrs.* (239). *In ramis* (F. V. IV p. 20).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Paliuri *Sacc.* (413). *In foliis* (Mich. I p. 166).
Coniothyrium australe *Sacc.* (399). *In ramulis* (Mich. I p. 206).
Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Diplodia Paliuri *Becc.* (404). *In ramulis* (Mich. I. p. 255).
Phoma samararum *Desm.* (379). *In samaris* (M. S. p. 191).
Septoria ascochytella *Sacc.* (426). *In foliis languidis* (Mich. II p. 280).

Melanconieæ.

Trullula olivascens *Sacc.* (453). *In ramis putridis.*

Vitis vinifera *L.*

Hyphomyceteæ.

Cyphella albo-violascens *F.* (109). *Ad ramulos* (M. S. p. 161).
Lenzites atropurpurea *Sacc.* (62). *Ad truncos, ramosque* (M. S. p. 45).
Pistillaria Bellunensis *Speg.* (120). *In sarmentis emortuis* (Mich. II p. 244).

Phyconyceteæ.

Peronospora viticola *Berck.* (151). *In foliis vivis floribusque* (Mich. II p. 246).

Pyrenomyceteæ.

Aglaospora profusa *DNtrs.* (257). *In foliis* (Mich. I. p. 460).
Calonectria macrospora *Sacc. et Speg.* (287). *In cortice emortuo* (Mich. I p. 251).
Cryptovalsa ampelina *Fuck.* (183). *In sarmentis* (M. S. p. 211).
Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183). (Mich. I p. 21).
Diaporthe viticola *Nke.* (225). *In sarmentis.* (F. V. IV p. 12).
Eriosphæria œnotria *Sacc. et Speg.* (220). *In cortice emortuo.*
Erysiphe Fuckeli *Berck.* (165). *In foliis et racemis.*
Eutypa heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis corticatis.*
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).

Hypoderma virgultorum *DC.* (310). *In caulibus ramisque* (Mich. I p. 57).

Leptosphæria vincalis *Pass.* (248). *In foliis sarmentisque* (Mich. I p. 398).

Lophidium compressum *Sacc.* (302). *In ligno.*

Lophiotrema Thiimenianum *Sacc.* (299). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 411).

Lophiosphæra viticola *Sacc.* (297). *Il ligno nudo.*

Metaphæria Cerletti *Speg.* (261). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 398).

Metasphæria chætostoma *Sacc.* (260). *In sarmentis subvivis sed fere exalbatis* (Mich. II p. 533).

Metasphæria socia *Sacc.* (261). *In sarmentis subvivis sed dealbatis* (Mich. II p. 533).

Pleopora hyalospora *Speg.* (271). *In sarmentis emortuis* (Mich. I

Sphærotheca Castagnei *Fuck.* (*In foliis* (M. S. p. 209). p. 462).

Sphærella Vitis *Fuck.* (215). *In foliis* (M. S. p. 209).

Teichospora Mesascium *Sacc.* (273). *In truncis annosis* (Mich. I p. 451).

Teichospora oxystoma *Sacc. et Speg.* (273). *In ligno nudo duriore.*

Teichospora Sylvana *Sacc. et Speg.* (273). *In truncis emortuis.*

Tryblitium rhopalascum *Sacc.* (306). *In ligno duriore.*

Valsa Vitis *Fuck.* (176). *In ramis emortuis.* (M. S. p. 133).

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).

Venturia Spegazziniana *Cooke.* (219). *In sarmentis corticatis emortuis.* (Mich. I p. 440).

Discomyceteæ.

Criptodiscus rhopaloides *Sacc.* (353). *In sarmentis corticatis.*

Helotium sarmentorum *DNtrs.* (330). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 67).

Helotium vitigenum *DNtrs.* (332). *In sarmentis.* (F. V. IV p. 37).

Lachnella (*Velutoria*). æruginosa *Sacc. et Speg.* (327). *In sarmentis* (Mich. I. p. 414).

Lachnella macrochæta *Speg.* (327). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 428).

Schyzoxylon Berkeleyanum *Fuck.* (354). *In sarmentis corticatis* (Mich. I p. 471).

Sphæropsideæ.

Ascochyta ampelina *Sacc.* (415). *In foliis* (Mich. I p. 168).

Camarosporium Cookeanum *Sacc.* (422). *In foliis.*

Coniothyrium Diplodiella *Speg.* (400). *In baccis maturis.*

Cytospora Vitis *Sacc.* (394). *In sarmentis.*
Cytospora ampelina *Sacc.* (394). *In sarmentis.*
Dendrophoma pleurospora *Sacc.* (388). *In ramis.*
Diplodia viticola *Desm.* (405). *In ramis dejectis putrescentibus* (M. S. p. 200).
Discosia Artocreas *Fr.* (445). (Mich. I p. 201).
Phyllosticta viticola *Sacc. et Speg.* (374). *In foliis* (Mich. I p. 155).
Phyllosticta Vitis (*Fuck.?*) (366). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 135).
Phoma Baccæ *Catt.* (380). *In baccis maturis vel immaturis.*
Phoma rimiseda *Sacc.* (377). *In ramis corticatis.*

Hyphomyceteæ.

Botrytis acinorum *Fres.* (447). *In acinis marcescentibus* (M. S. p. 185).
Botrytis candidula *Sacc.* (476). *In cortice putri* (Mich. II p. 544).
Cercospora Vitis *Sacc.* (250). *In foliis* (F. V. V p. 188).
Circinotrichum maculiforme *Ness.* (506). *In ramis putrescentibus* (Mich. I p. 272).
Fumago vagans *Pers.* (523). *In foliis.*
Fusarium Biasolettianum *Corda.* (539). *In truncis.*
Fusarium Zavianum *Sacc.* (539). *In ramulis petiolisque.*
Graphium cinerellum *Speg.* (529). *Ad ramulos emortuos.*
Helminthosporium coryneoideum *DNtrs.* (515). *In sarmentis* (Mich. II p. 557).
Oospora virescens *Wallr.* (408). *In sarmentis emortuis.*
Rœsleria pallida *Sacc. In radicibus nondum emortuis* (Mich. II p. 299).
Septocylindrium dissiliens *Sacc.* (470). *In foliis languidis* (F. V. V p. 186).
Septocylindrium virens *Sacc.* (470). *In foliis ramisque putridis* (F. V. V p. 186).
Sporodesmium antiquum *Corda.* (500). *In truncis putridis* (Mich. II p. 289).
Sporodesmium viticolum *Sacc.* (501). *In sarmentis putridis* (Mich. II p. 289).
Tuberculina (*Tubercularia*) ampelophila *Sacc.* (533). *In pustulis Glœosporii ampelophagi* (Mich. I p. 262).
Tubercularia vulgaris *Pers.* (232). *In sarmentis.*

Melanconiæ.

Glœosporium ampelophagum *Sacc.* (452). *In baccis plurium varietatum, præcipue fructu albo* (Mich. I p. 217).
Glœosporium crassipes *Speg.* (452). *In baccis.*
Pestalozzia pezizoides *DNtrs.* (459). *In sarmentis.*

Pestalozzia Thümeni *Speg.* 461). *In baccis.*
Pestalozzia uvicola *Speg.* (460). *In baccis.*
Trullula olivascens *Sacc.* (453). *In ramis putridis.*

Ampelopsis hederacea *Mehx.*

Pyrenomyceteæ.

Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183). (Mich. 1 p. 22)
Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (245). (F. V II p. 318).
Lophiotrema (*Lophiostoma*) pygmæum *Sacc.* (299). *In ramulis corticatis* (Mich. 1 p. 447).
Lophiotrema (?) affine *Speg.* 269 (*In ramulis emortuis* (Mich. 1 p. 465).
Ophioceras (*Rhaphidophora*) macrocarpa *Sacc.* (279). *In ramulis* (F. V. II p. 306).

Myxomyceteæ.

Perichæna depressa *Rost.* (14). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 40).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium Fuckelii *Sacc.* (399). (Mich. 1 p. 207).
Hendersonia sarmentorum *West.* (418). (Mich. 1 p. 214).

Sapindaceæ.

Acer platanoides *L.*

Pyrenomyceteæ.

Gnomonia inclinanta *Auersw.* (217). *In foliis dejectis* (M. S. p. 100).
Massaria inquinas *Fr.* (242). *In ramis.*

Sphæropsideæ.

Leptothyrium acerinum *Cda.* (442). *In foliis* (Mich. 1 p. 202).
Phyllosticta platanoidis *Sacc.* (373). *In foliis deciduis.*

Acer Pseudo-platanus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Calosphæria ciliata *Karst.* (173). *In cortice.*
Diaporthe Hystrix *Sacc.* (233). *in ramis* (F. V. IV p. 6).
Diaporthe Nieslii *Sacc.* (222). *In cortice ramorum maiorum* (Mich. 1 p. 391).

Eutypella Acharii *Tul.* (180). *In ramis decorticatis maioribus.*
Gnomonia inclinata *Auersw* (217). *In foliis emortuis.*
Uncinula Aceris *Sacc.* (163). *In foliis.*

Discomyceteæ.

Rhytisma acerinum *Fr.* (359). *In foliis* (M. S. p. 159).

Sphæropsideæ.

Diplodia petiolorum *Sacc.* (408). *In petiolis foliorum* (Mich. II p. 267).
Discosia Artocreas *Fr.* (445). (Mich. p. 201).
Melasmia acerina *Lév.* (443). *In foliis* (Mich. I p. 203).
Phyllosticta Pseudoplatani *Sacc.* (366). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 136).
Steganosporam piriforme *Corda.* (401).

Acer Negundo *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe dubia *Nke.* (232). *In cortice ramulorum* (Mich. I p. 383).
Didymosphæria pulchella *Sacc. et Speg. In ramis sub cortice denigratis* (Mich. I p. 375).
Eutypa (*Valsa*) lata *Nke.* (180). *In truncis ramisque decorticatis, ramis in ipso cortice* (M. S p. 128).
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).
Leptosphæria Diana *Sacc. et Speg.* (247). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 398).
Melanomma medium *Sacc. et Speg.* (254). *In ramis putrescentibus* (Mich. I p. 402).

Sphæropsideæ.

Diplodia atrata *Sacc.* (405). *In ramis* (Mich. I p. 256).
Phoma Lebiseyi *Sacc.* (384). *In ramis* (Mich. I p. 257).

Hyphomyceteæ.

Fusarium pyrochroum *Sacc.* (536). *In ramulis* (Mich. II p. 295).

Melanconieæ.

Marsonia (*Glœosporium*), truncatula *Sacc.* (456). *In foliis languidis* (Mich. I p. 221).

Acer campestre *L.*

Hymenomyceteæ.

Naucoria (*Agaricus*) rimulincola *Pasch.* (76). *In rimis corticis durioris* (F. V. V p. 161).

Stereum acerinum *Fr.* (112). *In cortice* (M S. p. 63).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphæria pseudo umbrina *Sacc.* (238). *In cortice duriore* (M. S. p. 112).

Calonectria Massariæ *Sacc.* (288). *In rimis suberis ad ramulos* (Mich. I p. 251).

Cryptovalsa protracta *DNtrs.* (183). *In ramis emortuis* (M. S. p. 134).

Cucurbitaria protracta *Fuck.* (275). *In ramis emortuis* (M. S. p. 119).

Diaporthe Hystricula *Sacc. et Speg.* (223). *In cortice ramorum* (Mich. I p. 392).

Diaporthe protracta *Nke.* (225). (*In ramis emortuis provectioribus* (M. S. p. 141).

Diatrypella verruciformis *Nke.* (184). *In ramis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 151).

Eutypa heteracanta *Sacc.* (182). *In ramis* (F. V. IV p. 15).

Eutypa (*Valsa*) lata *Nke.* (180). *In truncis ramisque decorticatis ramis in ipso cortice* (M. S. p. 128).

Eutypa lejoplaca *Cooke* (181). (Mich. II p. 173).

Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).

Fracchiæa heterogenea *Sacc.* (173). *In ramis corticatis decorticatisque exsiccatis* (M. S. p. 115).

Gnomonia inclinata *Auersw.* (217). *In foliis emortuis.*

Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (245). (F. V. II p. 318).

Lophiostoma Desmazieri *Sacc. et Speg. In ramulis* (Mich. I p. 411).

Lophotrema Nucula *Sacc.* (298). *In cortice.*

Massaria callispora *Sacc.* (298). *In ramis.*

Massaria inquinans *Fr.* (242). *In ramis* (Mich. I p. 400).

Melanomma Pulvis-pyrius *Sacc.* (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).

Rebentischia Massalongi *Sacc.* (243). *In cortice* (Mich. I p. 36).

Sphærella acerina *Fuck. In hypophyllo* (M. S. p. 93).

Uncinula aceris *Lév.* (U. bicornis *Lév.*) (163). *In epiphyllo* (M. S. p. 91).

Valsa ceratophora *Tul.* (175). (Mich. I p. 19).

Zignœlla (*Melanomma*) pulviscula *Sacc.* (266). *In ligno denudato* (Mich. I p. 450).

Eutypa (*Valsaria*) scabrosa *Nke.* (181). *In ligno denudato emortuo* (M. S. p. 128).

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs. In ramis* (Mich. I p. 92).

Discomyceteæ.

Rhytisma acerinum *Fr.* (359). *In foliis* (M. S. p. 159).

Rhytisma punctatum *Fr.* (359). *In foliis* (M. S. p. 160).

Myxomyceteæ.

Comatricha Persoonii *Rost. In trunco putrescente* (F. V. IV p. 39).

Sphæropsideæ.

Coniothecium chomatosporum *Cda.* (503). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 194).

Diplodia subtecta *Fr.* (405). *In ramulis* (F. V. V p. 209).

Discosia Artocreas *Fr.* (445). (Mich. I p. 201).

Hendersonia acericola *Sacc.* (419). *In foliis* (Mich. I p. 216).

Hendersonia sarmentorum *West.* (418). (Mich. I p. 214).

Leptothyrium acerinum *Cda.* (442). *In foliis* (Mich. I p. 202).

Melasmia acerina *Lév.* (443). *In foliis.* (Mich. I p. 203).

Phoma protracta *Sacc.* (377). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. I p. 259).

Phyllosticta Aceris *Sacc.* (370). *In foliis* (Mich. I p. 147).

Septoria seminalis *Sacc* (426). *In foliis seminalibus languidis* (Mich. p. 167).

Hyphomyceteæ.

Botrytis coccotricha *Sacc.* (777). *In ramis corticatis putrescentibus* (Mich. I p. 270).

Cladosporium stromatum *Pr.* (511). *In stromate Eutypæ lejoplacæ* (Mich. II p. 173).

Closterosporium strepsiceras *Ces.* (599). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 288).

Cordena pauciseptata *Pr.* (412). *In lignis putrescentibus.*

Helmintosporium appendiculatum *Corda.* (515). *In ramis* (Mich. II p. 173).

Helminthosporium appendiculatum *Cda.* (515). *In ramis* (Mich. II p. 173).

Helminthosporium cylindrosporum *Sacc.* (513). *In ramis putrescentibus* (F. V. V p. 191).

Microcera Massariæ (*Fusarium ciliatum*) *Link.* (540). *In ramis ex ostiolis Massariæ inquinantis* (M. S. p. 188).

Melanconiæ.

Haineria (*Glaosporium*) tremelina *Sacc.* (449). *In foliis emortuis* (Mich. II p. 168).

Marsonia (*Glœosporium*) truncatula *Sacc.* (456). *In foliis languidis* (Mich. I p. 221).

Septoglœum acerinum *Sacc.* *In foliis adhuc vivis* (Mich. II p. 541).

Acer

Pyrenomyceteæ.

Anthostoma decipiens *Nits.* (197). *In truncis.*
Botryosphæria Berengeriana *De Not.* (207). *In ramis corticatis.*
Ceratostomella rostrata *Sacc.* (203). *In ligno udo carioso.*
Chætosphæria fusca *Fuck.* (253). *In ramis decorticatis.*
Chilonectria Cucurbitula *Sacc.* (281). *In ramis corticatis.*
Cœlosphæria cupularis *Karst.* (172). *In ramis exsiccatis.*
Eutypa flavo-virens *Tul.* (181). *In cortice atque ligno.*
Eutypa velutina *Sacc.* (182). *In truncis decorticatis.*
Eutypella grandis *Nike.* (189). *In cortice duriore.*
Fenestella princeps *Tul.* (276). *In ramis corticatis.*
Glonium lineare *De Ntrs.* (305). *In ligno vetusto.*
Gnomonia setacea *De Ntrs.* (217). *In pag. inf. fol.*
Hypoxylon atropurpureum *Fr.* (200). *In lignis putridis.*
Hypoxylon cohærens *Fr.* (200). *In ramis corticatis.*
Hypoxylon rubiginosum *Fr.* (200). *In ramis emortuis.*
Hypoxylon serpens *Fr.* (201). *In ligno putri.*
Hysterium pulicare *Pers.* (306). *In cortice duriore* (F. Ven. IV. p. 26).
Lophiostoma excipuliforme *Ces. et DNtrs.* (301). *In cortice.*
Lophiostoma macrostomum *DNtrs.* (301). *In cortice duriore.*
Nectria sanguinea *Fr.* (284). *In ligno et cortice udo.*
Quaternaria Personii *Tul.* (174). *In ramis corticatis.*
Rosellinia rimincola *Rehm.* (192). *In rimis corticis vel in ramis.*
Trematosphæria pertusa *Fuck.* (255). *In lignis exsiccatis.*
Uncinula Aceris *Sacc.* (163). *In foliis.*
Valsa ambiens *Fr.* (177). *In ramis corticatis.*
Xylaria corniformis *Fr.* (198). *In truncis emortuis.*

Sphæropsideæ.

Cytospora flavo-virens *Sacc.* (376). *In cortice et ligno.*
Diplodia microsporella *Sacc.* (406). *In ramulis decorticatis.*
Melasmia punctata *Sacc. et Roumg.* (443). *In foliis.*
Phleospora Aceris *Sacc.* (437). *In foliis.*

Hyphomyceteæ.

Isaria umbrina *Pers.* (527). *In truncis.*
Oospora candidula *Sacc.* (467). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 545).
Periconia chlorocephala *Fres.* (503). *In ramis caulibusque* (Mich. II p. 291).

Negundo fraxinifoli *Nutt.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Negundinis *Sacc. et Speg.* (371). *In foliis* (Mich. I p. 149).

Leguminosæ.

Ulex europæus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Amphisphæria Passerinii *Sacc. et Speg. In ramis emortuis* (Mich. I p. 375).
Lophiotrema præmorsum *Sacc.* (298). *In ramis emortuis.*

Sphæropsideæ.

Diplodia Ulicis *Sacc. et Speg.* (402). *In ramulis putrescentibus* (Mich. I p. 353).

Spartium junceum *L.*

Pyrenomycetæ.

Physalosphora euganea *Sacc.* (205). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 244).
Pleospora Cytisi *Fuck.* (f. Spartii. *In ramis.* (Mich. II p. 251).

Sarothanmius scoparius *Wimm.*

Pyrenomyceteæ.

Cucurbitaria Spartii *Ces. In ramis dejectis* (Mich. II p. 252).
Diaporthe inæqualis *Nke.* (230). *In ramis emortuis* (Mich. II p. 161).
Lophiotrema præmorsum *Sacc.* (298). *In ramis emortuis.*

Sphæropsideæ.

Camarosporium alpinum *Speg.* (422). *In ramulis* (Mich. II p. 166).
Sphæropsis Saccardiana *Speg.* (397.) *In ramulis emortuis dejectis.*

Genista sericea *Wulf.*

Hypodermeæ.

Uromyces Genistæ tinctoriæ *Fuck.* (133). *In foliis* (M. S. p. 86).

Genista tinctoria *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Genistæ tinctoriæ *Fuck.* (133). *In foliis* (M. S. p. 86).

Pyrenomyceteæ.

Diaporhte inæqualis *Nke.* (230). *In ramis provectioribus emortuis* (M. S. p. 140).
Dothidea (*Diaporthe*) Sambuci *Fr.* (294). *In ramulis* (Mich. I p. 441).

Discomyceteæ.

Stictis radiata *Pers.* (354). *In ramis dejectis et in caulibus emortuis* (M. S. p. 156).

Sphæropsideæ.

Rhabdospora (*Septoria*) phomatoides *Sacc.* (437). *In ramulis* (Mich. I p. 175).

Genista

Pyrenomyceteæ.

Dothidea tetraspora *B. et Br.* (294). *In ramis emortuis.*
Lophiotrema (*Lophiostoma*). angustilabrum *Berk. et Br.* (300). *In ramulis dejectis.* (M. S. p. 110).

Cytisus Laburnum *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Genistæ tictoriæ *Wint.* (Uromyces Laburni *Fuch.*) (133). *In foliis.* (M. S. p. 86).

Pyrenomyceteæ.

Gibberella baccata *Sacc.* (Botryosphæria pulicaris *Ces. et DNtrs.* Subsp. typica (288). *In ramis.* (F. V. IV p. 5).
Cucurbitaria Laburni *Fr.* (274). *In ramis emortuis* (M. S. p. 121).
Leptosphæria Lucina *Sacc.* (247). *In foliis emortuis* (F. V. II p. 311).
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (186). *In ramis* (Mich. I p. 15).

Spæropsideæ.

Diplodia rudis *Kx.* (402). *In ramis corticatis putrescentibus* (F. V. V p. 207).
Phoma Laburni *Sacc.* (377). *In ramis.*
Phoma rudis *Sacc.* (383). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 257).
Phyllosticta Cytisi *Desm.* (370). *In foliis* (Mich. I p. 146).
Phyllosticta laburnicola *Sacc.* (373). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 152).
Rabenhorstia rudis *Fr.* (393). *In ramis.*
Septoria Cytisi *Desm.* *In foliis languidis* (F. V. V p. 205).

Cytisus nigricans *L.*

Hymenomyceteæ.

Stereum tabacinum *Fr.* (112). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 5).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe inæqualis *Nke.* (230). *In ramis provectioribus emortuis* (M. S. p. 140).
Diaporthe rudis *Nke.* (230). *In ramis* (M. S. p. 140).
Didymella (*Didymosphæria*) cladophila *Niessl.* (216). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 246).
Dothidea tetraspora *B. et Br.* (294). *In ramulis emortuis* (F. V. V p. 182).
Lisca (*Botryosphæria*) nemorosa *Sacc.* (286). *In ramulis* (Mich. I p. 42).
Massarina (*Massaria*) penicillata *Sacc.* (260). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 404).

Sphæropsideæ.

Diplodia nigricans *Sacc.* (402). *In ramulis* (Mich. II p. 269)-
Leptostromella (*Leptostroma*) hysterioides *Fr.* (445). *In caule* (Mich. II p. 282).
Phyllosticta cytisella *Sacc.* (367). *In foliis.*

Hyphomyceteæ.

Helminthosporium appendiculatum *Corda*. (515). *In ramis* (Mich. II p. 173).

Cytisus radiatus *B.*

Pyrenomyceteæ.

Rosellinia rimincola *Rehm*. (192). *In ramis decorticatis v. in corticis rimis* (F. V. II p. 329).

Teichospora anceps *Sacc*. (272). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 247).

Cytisus hirsutus *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces pallidus *Niessl*. (132). *In foliis*.

Cytisus

Sphæropsideæ.

Septoria Cytisi *Desm*. *In foliis* (Mich. I p. 171).

Hyphomyceteæ.

Botrytis griseola *Sacc*. (477). *In ramis dejectis* (F. V. V p. 195).

Lupinus albus *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Genistæ tinctoriæ *Wint*. Lupini *Sacc*. (133). *In foliis* (M. S. p. 208).

Hyphomyceteæ.

Fusarium roseum *Link*. (537). *In leguminibus* (Mich. II p. 295).

Fusarium incarnatum *Desm*. (539). *In foliis emortuis* (Mich. II p. 296).

Ononis spinosa *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Genistæ tinctoriæ *Wint*. (U. Ononidis *Pass*.) (133). *In foliis* (F. V. V p. 171).

Pyrenomyceteæ.

Lophiostoma caulium *Ces. et DNtrs.* (301).

Medicago lupulina *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora Trifoliorum *DBy.* (154). *In foliis* (F. V. V p. 172).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe pratensis *Sacc. et Speg.* (229). *In caulibus languidis* (Mich. I p. 389).

Melanomma dubiosum *Sacc.* (254). *In trunculis humifusis putrescentibus* (Mich. I p. 403).

Medicago sativa *L.*

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe communis (165). *In foliis vivis.*

Medicago

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria Medicaginum *Sacc.* (245). *In caulibus em.* (Mich. II p. 534

Ophiobolus (*Rhaphidosphora*) rudis *Fuck.* (277). *In caulibus dejectis* (M. S. p. 101).

Discomyceteæ.

Pseudopeziza Medicaginis *Sacc.* (356). *In foliis languentibus.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta (Ascochyta) Medicaginis *Fuck. In foliis* (M. S. p. 195).

Pyrenochæta (Phoma) penicillata *Fuck. In caulibus* (M. S. p. 191).

Septoria Medicaginis *Desm. In foliis* (M. S. p. 197).

Micelia sterilia.

Rhizoctonia violacea *Tul.* (544). *In radicibus.*

Hypodermeæ.

Uromyces striatus *Schröter.* (134). *In foliis.*

Discomyceteæ.

Pseudopeziza (*Phacidium*) Medicaginis *Lib.* (356). (F. V. IV p. 29).

Sphæropsideæ.

Phoma bacillaris *Sacc.* (380). *In caule* (Mich. II p. 273).
Phoma melæna *Mont. et Dur.* (381). *In caulibus exsiccatis.*

Melilotus officinalis *Desr.*

Pyrenomyceteæ.

Lophiostoma insidiosum *Ces. et DNtrs.* (302). Mich. I p. 447).
Pleospora Anthyllidis *Aud. In caulibus ramisque* (Mich. I p. 49).
Ophiobolus (*Raphidophora*) Montellica *Sacc.* (277). *In caulibus putrescentibus* (F. V. II p. 407).

Discomyceteæ.

Lecanidium herbarum *Sacc.* (350). *In caulibus exsiccatis et subdealbatis* (F. V. IV p. 30).

Hyphomyceteæ.

Chalara (*Sporoschisma*) montellica *Sacc.* (599). *In caulibus putrescentibus* (F. V. V p. 191).

Trifolium scabrum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Phyllachora Trifolii *Fuck.* (293). *In foliis* (M. S. p. 145).

Trifolium alpestre *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria compta *Sacc.* (433). *In foliis.* (Mich. I p. 189).

Hyphomyceteæ.

Cercospora helvola *Sacc.* (518). *In pag. inf. foliorum languidorum* (Mich. II p. 556).

Trifolium repens *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Trifolii *Fuck.* (134). *In foliis et petiolis* (M. S. p. 86).

Pyrenomyceteæ.

Phyllachora Trifolii. *Fuck.* (293). *In foliis* (M. S. p. 145).

Discomycetæ.

Pseudopeziza (*Phacidium*) Trifolii *Boud.* (346). *In foliis* (Mich. I p. 60).

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicola *Sacc.* (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).
Polythrincium Trifolii *Kunze.* (510). *In pag. inf. foliorum*

Trifolium

Hypodermeæ.

Uromyces striatus *Schröeter.* (134). *In foliis.*
Uromyces Trifolii *Fckl.* (134). *In foliis.*

Phycomyceteæ.

Peronospora trifoliorum *De Bary.* (154). *In follis.*

Pyrenomyceteæ.

Ophiobolus rudis *Rehm.* (277). *In caulibus emortuis.*

Anthyllis vulneraria *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Genistæ tinctoriæ (U. Anthyllidis *Schröt*). (133). *In foliis* (Mich. I p. 241).

Amorpha fruticosa *L.*

Pyrenomyceteæ.

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In ramis* (Mich. I p. 32).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).

Lotus corniculatus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe aggerum *Sacc. et Speg.* (235). *In caulibus* (Mich. I p. 387).

Galega officinalis *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria carpogena *Sacc.* (248). *In leguminibus.*

Sphæropsideæ.

Dothiorella Galegæ *Sacc.* (392). *In caulibus.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora Galegæ *Sacc.* (518). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 267).

Ramularia Galegæ *Sacc.* (487). *In foliis* (Mich. II p. 548).

Robinia pseudo-Acacia *L.*

Hyphomyceteæ.

Claudopus (Agaricus) inæqualis *Sacc.* (64). *Ad truncos* (M. S. p. 26).

Corticium cinereum *Fr. In ramis* (F. V. V p. 165).

Cyphella albo violascens *Fr.* (109). *Ad ramulos.*

Irpex canescens *Fr.* (104). *Ad truncos* (M. S. p. 59).

Irpex mollis *Berk. et Curt.* (104). *Ad truncos vetustos.*

Irpex obliquus *Fr.* (105). *Ad truncos* (M. S. p. 59).

Pleurotus (Agarius) ostreatus *Bull.* (50). *Ad truncos emortuos.*

Polyporus obliquus *Fr.* (94). *Ad truncos, frequens* (M. S. p. 59).

Radulum quercium *var.* Robiniæ *Fr.* (103). *In cortice putrescente* (Mich. I p. 3).

Stereum Boltonii *Sacc.* (112). *In truncis emortuis* (Mich. I p. 239).

Tremella moriformis *Berk* (121). *In rimis corticum* (F. V. V p. 166).

Pyrenomyceteæ.

Aglaospora profusa *DNtrs.* (257). *Vulgatissima in omnibus ramis truncisque emortuis* (Mich. I p. 460).

Coelosphæria cupularis *Karst.* (172). *In ramis exsiccatis.*

Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183). *In ramis emortuis putrescentibus* (Mich. I p. 21).

Cucurbitaria elongata *Grev.* (274). *In ramis* (M. S. 120).

Diaporthe fasciculata *Nke.* (226). *In ramis dejectis putridis* (M. S. p. 140).

Diaporthe oncostoma *Fuck.* (222). *In ramis emortuis* (M. S. p. 136).

Diatrypella verruciformis *Nke.* (184). *In ramis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 151).

Didymosphæria socialis *Sacc.* (237). *In ramis emortuis* (F. V. II p. 394).

Dothidea (*Diaporthe*) Sambuci *Fr.* (294). *In ramis* (Mich. I p. 414).

Eutypa (*Valsa*) heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis corticatis* (M. S. p. 129).

Eutypa (*Valsa*) lata *Nke.* (180). *In truncis ramisque decorticatis ramis in ipso cortice* (M. S. p. 128).

Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (148). (Mich. I p. 15).

Gibberella baccata *Sacc.* (*Botryosphæria pulicaris Ces. et DNtrs.*) Subsp. baccata. (288). *In ramis corticatis decorticatisque* (F. V. IV p. 5).

Gibberella Saubinetti (*Botryosphæria dispersa DNtrs.*) *Sacc.* (289). *In ramulis hornotinis* (M. S. p. 117).

Lasiosphæria sulphurella *Sacc.* (264). *In trunco decorticato putri* (Mich. I p. 440).

Leptosphæria petiolicola *Sacc.* (247). *In petiolis* (M. S. p. 105).

Lophiosphæra Fuckelii *Sacc.* (297). *In ramis.*

Nectria squamuligera *Sacc.* (285). *In ramulis.*

Rosellinia Aquila *DNtrs.* (191). *In lignis et ramis emortuis* (M. S. p. 108).

Rosellinia pulveracea *Fuck.* (192). *In ligno* (F. V. II p. 329).

Sphærella petiolicola *Auersw.* (210). *In petiolis dejectis* (M. S. p. 96).

Teichospora pezizoides *Sacc. et Speg.* (273). *In cortice duriore.*

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).

Zignœlla (*Melanomma*). pulviscula *Sacc.* (266). *In ligno denudato* (Mich. I p. 450).

Dyscomyceteæ.

Dimmasporia (*Polynema*) hispidulum *Fr.* (446). *In ligno denudato* (M. S. p. 189).

Helotium Scutula *Karst* v. petiolicola (332). *In petiolis* (F. V. IV p. 37.

Lanzia (*Helotium*) flavo-rufa *Sacc.* (339). *In truncis putrescentibus udis* (F. V. IV 37).

Mollisia (*Niptera*) Riccia *Sacc.* (338). *In ligno putrescente denudato* (M. S. p. 162 P. V. IV p. 33).

Schizoxylon æruginosum *Fuck.* (354). *In ramulis* (Mich. I p. 422).

Myxomyceteæ.

Badhamia hyalina *Berck.* (8). *Ad truncos* (F. V. IV p. 39).

Clathroptychium rugulosum *Rost.* (13). *In ramis* F. V. IV p. 39).

Lamproderma nigrescens *Sacc.* (12). *In foliis dejectis* (Mich. II p. 262).

Sphæropsideæ.

Aposphæria labens *Sacc.* (387). *In ligno et cortice.*
Ascochyta Robiniæ *S. A.* (412). *In foliis.* (Mich. I p. 163).
Camarosporium Robiniæ *West.* (422). *In ramis.*
Coniothyrium fœdans *Sacc.* (399). *In ramis corticatis.*
Coniothyrium Fuckelli *Sacc.* (393). (Mich. I p. 207).
Cytisporina (*Cytispora*) ludibunda *Sacc.* (439). *In ramis* (Mich. II p. 263).
Dendrophoma pulvis-pyrius *Sacc.* (388). *In ligno et cortice.*
Dinemasporium (*Polynema*) hispidulum *Fr.* (446). *In ligno denudato* (M. S. p. 189)
Dinemasporium strigosum *Sacc.* (447). *In ligno.*
Diplodia profusa *DNtrs.* (401). *In ramis putrescentibus* (F. V. V p. 208).
Discosia Artocreas *Fr.* (445). *In foliis* (Mich. I p. 201).
Hendersonia fusarioides *Sacc.* (417). *In cortice duriore* (Mich. I p. 213).
Hendersonia Robiniæ *West.* *In ramulis* (M. S. d. 199).
Phoma Fuckelii *Sacc.* (377). *In ramulis.*
Phoma Leguminum *West.*. (380). *In leguminibus deiectis.* (M. S p. 191).
Phoma pseudoacaciæ *Sacc.* (383). *In ramis deiectis.*
Phoma oncostoma *Thüm.* (383). *In ramulis corticatis.* (Mich. I p. 260).
Phyllosticta Robiniæ *Sacc.* *In foliis* (Mich. I p. 146).

Hyphomyceteæ.

Acrothecium obovatum *Cooke* (516). *In ramis* (M. S. p. 555).
Chalara (*Sporoschisma*) Ampullula *Sacc.* (509). *In truncis putribus* (F. V. V p. 191).
Coccospora aurantiaca *Wall.* (466). *In lignis putridis.*
Dacrymycella fertilissima *Bizz.* (533). *In ligno putrescente.*
Fusarium lateritium *Nees.* (537). *In ramis* (Mich. II. p. 295).
Gonatobotrys flava *Bon.* (483). *In ramis putridis*
Graphium stilboideum *Corda.* (529). *In ligno.*
Haplotrichum granulosum *Zarz.* (*Œdocephalum elegans Preuss*) *In ramis ad acerculos Tuberculariæ vulgaris* (M. S. p. 188).
Harpographium fasciculatum *Sacc.* 529). *In ramulis.*
Helminthosporium fusiforme *Corda.* (514). *In ramis decorticatis* (Mich. II p. 174).
Monilia candida *Bon.* (479). *In cortice putri.* (F. V. V p. 194).
Monilia fumosa *Sacc.* (479). *In cortice putri et udo* (Mich. II p. 544).
Ozonium (?) croceum *Pers.* (544). *Ad ramis in stromatibus Pyrenomycetum* (Mich. I p. 275).

Stysanus microsporus *Sacc.* (528). *In trunco* (Mich. I p. 274).
Tubercularia granulata *Pers.* (532). *In ramis* (F. V. V p. 197).
Tubercularia pusilla *Sacc.* (532). *In ramulis.*

Gleditschia triacanthos *L.*

Pyrenomyceteæ.

Calonectria macrospora *Sacc. et Speg.* (287). *In ramulo emortuo putrescente.* (Mich. I. p. 464).
Calonectria Tarvisina *Speg.* (287). *In ramulis putrescentibus.*
Cœlosphæria cupularis *Karst.* (172). *In ramis exsiccatis.*
Cucurbitaria Gleditschiæ *Ces. et DNtrs.* (274). *In ramis.* (M. S. p. 122).
Diaporthe occidentalis *Sacc. et Speg.* (230). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 385).
Dothidea (*Diaporthe*) Sambuci *Fr.* (294). *In ramis* (Mich. I p. 441).
Eutypa heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis* (F. V. V p. 15).
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). *In ramis* (Mich. I p. 15).
Gibberella Saubinetii *Sacc.* (289). *In ramulis tenellis.*
Leptosphæria vagabunda *Berk. et Br.* (245). *In ramis.*
Lisea (*Botryosphæria*) nemorosa *Sacc.* (286). *In ramulis* (Mich. I p. 42).
Rosellinia Aquila *DNtrs.* (191). *In lignis et ramis emortuis* (M. S. p. 108).
Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).

Sphæropsideæ.

Camarosporium (*Hendersonia*) Triacanthi *Sacc.* (422) *In ramis* (Mich. I p. 208).
Coniothyrium insitivum *Sacc.* (398). *In ramulis.* (Mich. I p. 206).
Diplodia Gleditschiæ *Pass.* (401) *In ramis* F. V. V p. 208).
Phoma Leguminum *West.* (380). *In leguminibus dejectis* (M. S. p. 191).

Hyphomyceteæ.

Coniosporium phaeospermum *Sacc.* (497). *In ligni's putridis* (Mich. II p. 292).

Melanconiæ.

Mixosporium incarnatum *Bon.* (453). *In ramis corticatis.* (Mich. I, p. 434),

Acacia Farnesiana *Willd.*

Sphæropsideæ.

Diplodia Farnesiana *Sacc.* (401). *In ramulis corticatis emortuis* (F. V. V p. 208).

Albizzia Julibrissin *Boivin.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe fasciculata *Nke.* (226). *In ramis* (M. S. p. 110).
Diaporthe mendax *Sacc.* (230). *In ramis* (F. V. IV p. 9).
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). *In ramis* (Mich. I p. 15).
Leptosphæria marginalis *Sacc.* (248). *In foliis* (Mich. I p. 244).
Leptosphæria Fuckelii *Sacc.* (297). *In ramis.*
Thyridaria incrustans *Sacc.* (258). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 14).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium insitivum *Sacc.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 206).
Coniothyrium incrustans *Sacc.* (398). *In ramis corticatis.*
Diplodia Julibrissin *Speg.* (401). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 484).
Phoma mendax (377). *In ramis.*

Astragalus glycyphyllos *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Astragali *Sacc.* *In foliis* (M. S. p. 208).

Pyrenomyceteæ.

Microsphæra Astragali (Calocladia holosericea *Lév.*) (164). *In foliis* (M. S. p. 209).

Sphæropsideæ

Septoria Astragali *Desm.* (428). *In foliis* (M. S. p. 196).
Phoma (*Sphæropsis*) melæna *Fr.* (381). *In caulibus* (M. S. p. 203).

Coronilla Emerus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Cucurbitaria Coronillæ *Sacc.* (274). *In ramulis* (F. V. V p. 178).
Diaporthe Coronillæ *Sacc.* (226). *In ramis* (F. V. V p. 181).

Sphærella Ariadna *Sacc.* (211). *In foliis.* (Mich. I p. 34).
Eutypa (*Valsa*) heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis* (Mich. I p. 19).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Emeri *Sacc.* (412). *In foliis.* (Mich. I p. 163).
Camarosporium Coronillæ (*Hendersonia Emeri Sacc. et Speg.*) (422). *In ramulis* (Mich. I p. 208).
Phoma Coronillæ *West.* (383). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 158).
Septoria Emeri *Sacc.* (424). *In foliis* (Mich. I p. 173).

Sophora japonica *L.*

Pyrenomyceteæ.

Botryosphæria Bèrengeriana *Sacc.* (207). (F. V. IV p. 4).
Diaporthe Ophites *Sacc.* (233). *In ramis* (F. V. IV. p. 13).
Diaporthe Sophoræ *Sacc.* (230). *In ramulis* (Mich. I. p. 384).
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).

Spæropsideæ.

Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Diplodia Sophoræ *Sacc.* (401). *In ramis* (Mich. II p. 268).
Dithiorella Bérengeriana *Sacc.* (392). *In ramis* (Mich. I p. 271).
Phoma Sophoræ *Sacc.* (383). *In ramis* (F. V. V p. 202).

Wistaria chinensis *DC.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe seposita *Sacc.* (230). *In ramis* (F. V. IV p. 7).

Sphæropsideæ.

Phoma seposita *Sacc.* (383). *In ramis* (F. V. IV p. 201).

Erythrina Chista-galli *L.*

Hyphomyceteæ.

Fusarium rimicolum *Sacc.* (536). *In rimis trunci putrescentis* (Mich. II p. 297).
Myrothecium roridum *Tode.* (541). *In foliis putridis* (Mich. II p. 175).
Closterosporium (*Sporidesmium*). Bizzozerianum *Sacc.* (499). *In foliis dejectis putrescentibus* (F. V. V p. 193).

Hedysarum obscurum *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Hedysari obscuri *Carest.* (133). *Ad folia viva* (Mich. II p. 155).

Onobrychis sativa *Lam.*

Sphæropsideæ.

Phoma Anaxea *Speg.* (385). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 482).

Pisum sativum *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Phaseoli *de Bary.* (134). *In foliis* (M. S. p. 85).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Pisi *Lib.* (413). *In leguminibus caulibusque.*

Lathyrus sylvestris *L.*

Pyrenomyceteæ.

Didymella (*Sphærella*) superflua *Fuck.* (217). *In caulibus emortuis* (M. S. p. 96).

Metasphæria (*Leptosphæria*) Lathyri *Sacc.* (260). *In caule emortuo dejecto* (M. S. p. 106).

Phomatospora Berkeleyi *Sacc.* (202). *In caulibus putrescentibus* (F. V. II p. 306).

Sphæropsideæ.

Septoria fulvescens *Sacc.* (434). *In foliis* (Mich. I p. 191).

Lathyrus niger *Bernh. (O. niger L.).*

Hypodermeæ.

Uromyces Orobi *Fuck.* (134). *In foliis* (M. S. p. 208).

Lathyrus vernus *Bernh. (O. vernus L.).*

Hypodermeæ.

Uromyces Orobi *Fuck.* (134). *In foliis* (M S. p. 208).

Phycomyceteæ.

Peronospora Viciæ *dBy.* (153). *In foliis* (Mich. I p. 242).

Pyrenomyceteæ.

Sphærella nemorosa *Sacc. et Speg.* (211). *In foliis languidis* (Mich. I p. 378).
Sphærella nerviseda *Sp.* (211). *In nervis foliorum putrescentium quæ toruloso reticulata evadunt* (Mich. I p. 456).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Orobi *Sacc.* (411). *In foliis* (Mich. I p. 161).
Asteroma Orobi *Fuck. In foliis* (Mich. II p. 300).
Phyllosticta orobina *Sacc.* (372). *In foliis* (Mich. I p. 149).
Septoria orobina *Sacc.* (432). *In foliis* (Mich. I p. 187).

Lathyrus latifolius *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Pisi *Wint.* (*U. Lathyri Fuck.*) (135). *In foliis* (M. S. p. 208).

Pyrenomyceteæ.

Didymosphæria epidermidis *Fuck.* (236). *In ramis* (F. V. II p. 323).
Leptosphæria Niessleana *Rabh.* (244). *In caulibus emortuis* (F. V. II p. 315).

Sphæropsideæ.

Phoma lathyrina *Sacc.* (385). *In leguminibus emortuis* (Mich. II p. 274).
Placosphæria Onobrychidis *Fuck.* (393). *In foliis caulibusque* (Mich. II p. 283).

Lathyrus

Sphæropsideæ.

Phoma Leguminum *West.* (380). *In leguminibus dejectis* (M. S. p. 191).
Phoma melæna *Mont. et Dur.* (381). *In caulibus exsiccatis.*

Vicia Faba *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Orobi *Wint.* (*U. Fabæ de Bary.*) (134). *In foliis* (M. S. p. 86).

Pyrenomyceteæ.

Ophiobolus rudis *Rehm.* (277). *In caulibus emortuis.*

Vicia sepium *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Orobi *Wint.* (*U. Viciæ Fuck.*) (134). *In foliis* (M. S. p. 86).

Vicia sativa *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Orobi *Wint.* (*U. Viciæ Fuck.*) (134). *In foliis* (M. S. p. 86).

Vicia hirsuta *Koch.* (Ervum hirsutum *L.*).

Hypodermeæ.

Uromyces Orbi *Schm.* (*U. Ervi West.*) (134). *In caulibus* (F. V. V p. 171).

Vicia Lens *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Orobi *Wint.* (U. Viciæ *Fuck.*) (134). *In foliis* (M. S. p 86).

Vicia.

Hyphomyceteæ.

Periconia pycnospora *Fries* (503). *In caulibus* (Mich. II p. 291)

Phaseolus vulgaris *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Phaseoli *de Bary.* (134). *In foliis* (M. S. p. 85).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Phaseolorum *Sacc.* (413). *In foliis* (Mich. I p. 164).
Phyllosticta phaseolina *Sacc.* (371). *In foliis* (Mich. I p. 149).
Phyllosticta Phaseolorum *Sacc. et Speg.* (377). *In foliis* (Mich. I p. 160).

Hyphomycetæ.

Cercospora olivascens *Sacc.* (518). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 268).
Isariopsis griseola *Sacc.* (529). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 273).

Melanconieæ.

Glœosporium *Lindemuthianum Sacc. et Magn.* (452) (Mich. I p. 129).

Dolichos

Hypodermeæ.

Uromyces Phaseoli *de Bary.* (134). *In foliis* (M. S. p. 85).

Cercis Siliquastrum *L.*

Sphæropsideæ.

Diplodia Siliquastri *Pass.* (402). *In ramulis* (M. S. p. 200).
Discosia Artocreas *Fr.* (445) *In foliis* (Mich. I p. 201).
Phyllosticta Siliquastri *Sacc. et Speg.* (371). *In foliis* (Mich. I p. 148).

Leguminosæ variæ.

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe communis *Fr.* (165). *In foliis.*
Erysiphe Martii *Lév.* (165). *In foliis* (M. S. p. 209).

Melanconieæ.

Glœosporium Kunzeanum *Niessl. In foliis* (Mich. II p. 541).

Rosaceæ.

Prunus communis *L.* (Amygdalus communis *L.*).

Pyrenomyceteæ.

Rebentischia (*Sphæria*) Massalongi *Mont.* (243). *Ad truncos emarcidos* (M. S. p. 99).

Prunus Persica *Celak.* (Persica vulgaris *D. C.*).

Hypodermeæ.

Puccinia Cerasi *Cda.* (138). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 8).

Pyrenomyceteæ.

Caryospora Putaminum *DNtrs.* (256). *In putamine putrescente* (Mich. I p. 451).

Cucurbitaria delitescens *Sacc* (274). *In ramis corticatis emortuis* Mich. II p. 252).

Lophiotrema duplex *Sacc.* (298). *In lignis ramisque exsiccatis.*

Leptosphæria vagabunda (*Sphæria fuscella Berk. et Br.*). (M. S. p. 98).

Valsa ceratophora *Tul.* (175). (Mich. I p. 19).

Eutypella (*Valsa*) Prunastri *Fr.* (179) *In ramis emortuis* (M. S. p. 131).

Discomyceteæ.

Exoascus deformans *Fuck.* (359). *In foliis* (Mich. I p. 62).

Sphæropsideæ.

Aposphæria (*Phoma*) Putaminum *Speg.* (387). *In parte interiore putaminum putrescentium* (Mich. II p. 275).

Diplodia Persicæ *Sacc.* (402). *In ramis* (Mich. II p. 267).

Phyllosticta Persicæ *Sacc.* (371). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 147).

Rhabdospora (*Septoria*) Persicæ *Sacc.* (437). *In ramulis junioribus* (Mich. I p. 174).

Hyphomyceteæ.

Cercosporella (*Cercospora*) Persica *Sacc.* (490). *In foliis adhuc vivis* (F. V. V p. 189).

Fumago vagans *Pers.* (523). *In foliis.*

Monilia (*Torula*) fructigena *Pers.* (480). *In fructibus putridis* (M. S. p. 177).

Melanconieæ.

Trullula olivascens (453). *In ramis putridis.*

Prunus Armeniaca *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Pruni spinosæ *Pers.* (*P. Prunorum Lk.*) (138). *In foliis* (Mich. I p. 9).

Pyrenomyceteæ.

Eutypella (*Valsa*) Prunastri *Fr.* (179). *In ramis emortuis* (M. S. p. 131).

Prunus domestica *L.*

Pyrenomyceteæ.

Puccinia Pruni spinosæ *Pers.* (*Puccinia Prunorum Fuck.*). (187). *In foliis* (M. S. p. 79).

Pyrenomyceteæ.

Ceratostoma Notarisii *Sacc.* (187). *In ligno putrido* (F. V. II p. 308).

Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).

Leptosphæria vagabunda (*Sphæria fuscella*) *Berck. et Br.* (245). (M. S. p. 97).

Pleospora vulgaris *Niessl.* (269). *In foliis putrescentibus* (Mich. I. p. 48).

Valsa ceratophora *Tul.* (175). (Mich. I p. 19).

Valsa leucostoma *Fr.* (178). *In ramis.*

Valsa microstoma *Fr.* (176). *In ramis.*

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). (F. V. IV p. 20).

Sphæropsideæ.

Ascochyta chlorospora *Speg.* (414). *In foliis languidis* (Mich. I p. 483).

Cytospora asterophora *Sacc.* (394). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 265).

Cytospora leucostoma *Pers.* (394). *In ramis* (Mich. II p. 264).

Diplodia Pruni *Fuck.* (402). *In ramis* (M. S. p. 200).

Phyllosticta (*Depazea*) prunicola *Opiz.* (375). *In foliis* (M. S. p. 193).

Phyllosticta prunicola *Sacc.* (875). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 483).

Hyphomyceteæ.

Cercospora circumscissa *Sacc.* (520). *In foliis* (F. V. V p. 189).

Cladosporium penicillioides *Pr.* (512). *In chrysalidibus ad folia adhuc pendula* (F. V. V p. 191).

Verticillium compactiusculum *Sacc.* (482). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 553).

Melanconieæ.

Polystigma rubrum *Sacc.* (441). *In foliis.*

Prunus insitiva *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Pruni spinosæ *Pers.* (*P. Prunorum Fuck.*) (138). *In foliis* (M. S. p. 79).

Prunus spinosa *L.*

Pyrenomyceteæ.

Botyrosphæria Bérengeriana *DNtrs.* (207). (F. V. IV p. 4).
Chætosphæria phæostoma *Fuck.* (253). *In ramis.*
Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (Mich. I p. 21).
Eutypa (*Valsa*) lata *Nke.* (180). *In truncis ramisque decorticatis rarius in ipso cortice* (M. S. p. 128).
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 15).
Eutypella (*Valsa*) Prunastri *Fr.* (179). *In ramis emortuis* (M. S. p. 131).
Podosphæra tridactyla (*P. Kunzei*) *Lév.* (162). *In foliis* (F. V. V p. 173).
Polystigma rubrum *DC.* (281). *In foliis.*
Uncinula Prunastri (*U. Wallrothii*) *Lév.* (163). *In foliis* (F. V. V p. 173).
Valsa microstoma *Fr.* (176). *In ramis* (F. V. V p. 179).
Valsa leucostoma *Fr.* (Valsa Personii *Nke.*) 178). *In ramis exsiccatis* (M. S. p. 134).

Prunus Cerasus *L.*

Hymenomyceteæ.

Fomes (*Polyporus*) applanatus *Fr.* (92). *Ad truncos non raro* (M. S. p. 51).
Panus conchatus Fr. (62). *Ad truncos non frequens* (M. S. p. 44).
Polyporus hirsutus *Fr.* (100). *Ad truncos* (F. V. V p. 163).
Polyporus zonatus *Nees.* (100). *Ad truncos.* M. S. p. 53).

Hypodermeæ.

Puccinia Cerasi *Cda.* (138). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 8).
Puccinia Pruni spinosæ *Pers.* (*P. Prunorum Fuck.*). (138). *In foliis* (M. S. p. 79).

Pyrenomyceteæ.

Calosphæria Princeps *Tul.* (173). *In cortice truncorum ramorumque deiectorum vel emortuorum* (M. S. p. 149).

Coronophora gregaria *Fuck.* (174)) *In ramis corticatis.*
Diaporthe Cerasi *Fuck.* (231). *In ramis* (M. S. p. 138).
Eutypella (*Valsa*) Prunastri *Fr.* (179). *In ramis emortuis* (M. S. p. 131).
Gnomonia erytrostoma *Awd.* (218). *In foliis adhuc pendulis immatura in putrescentibus maturescens* (Mich. I p. 382).
Polystigma ochraceum *DC.* (281). *In foliis* (M. S. p. 146).
Trematosphæria (*Caryospora*) Lichenopsis *Sacc.* (256). *In cortice adhuc vegeto* (F. V. V p. 178).
Venturia chlorospora *Karst.* (219). (Mich. I p. 382).

Discomyceteæ.

Cenangium Fuckelii *Sacc.* (344). *In ramis corticatis.*
Dermatea (*Cenangium*) Cerasi *Fr.* (243). *In ramis emortuis* (M. S. p. 160).

Sphæropsideæ.

Cytospora leucostoma *Pers.* (139). *In ramis* (Mich. II p. 264).
Depazea prunicola *Opiz.* (375). *In foliis* (M. S. p. 193).
Diplodia Cerasorum *Fuck.* (402). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 270).
Diplodia microsporella *Sacc.* (406). *In ramulis decorticatis.*
Discosia Artocreas *Fr.* (445). *In foliis exsiccatis* (Mich. I p. 201).
Hendersonia fructigena *Sacc.* (440). *In ramis arescentibus* (Mich. I p. 212).
Micropera Drupacearum *Lév.* (440). *In ramis emortuis.*
Phoma torrens *Sacc.* (380). *In truncis quos exsiccat atque enecat.*
Phyllosticta prunicola *Sacc.* (375). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 157).

Hyphomyceteæ.

Cercospora cerasella *Sacc.* (520). *In foliis* (Mich. I p. 266).
Closterosporium Amygdalearum *Sacc. In foliis subvivis* (Mich. II p. 557).
Dendrodochium rubellum *Sacc.* (534). *In cortice truncorum.*
Monilia cinerea *Bon.* (480). *In drupis putrescentibus* (F. V. V p. 195).

Prunus Padus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Calosphæria vibratilis *Nitsche.* (174). *In cortice ramorum.*
Polystigma ochraceum *D. C.* (281). *In foliis* (M. S. p. 146).

Sphæropsideæ.

Cytospora leucostoma *Pers.* (394). *In ramis* (Mich. II p. 264).

Prunus Laurocerasus *L.*

Diaporthe oligocarpa *Nke.* (*D. viridarii*) (231). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 301).

Dyscomyceteæ.

Calloria Antenorea *Sacc.* (348). *In ligno v. cortice interiore* (Mich. I p. 64).
Ombrophyla (*Coryne*) sarcoides *Fr.* (346). *In trunco putrescente* (M. S. p. 162).
Trochila Laurocerasi *Fr.* (357). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 60).

Sphæropsideæ.

Cytospora Laurocerasi *Fuck.* (394). *In folis ramulisque.*
Diplodia tecta *B. et Br.* (408). *In foliis putridis* (F. V. V p. 209).
Phoma epiphylla *Sacc.* (379). *In foliis.*
Phyllosticta Laurocerasi *Sacc. et Speg.* (373). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 153).

Prunus.

Hymenomyceteæ.

Fomes fulvus *Fr.* (93). *Ad basim truncorum.*
Odontia Pruni *Pasch.* (104). *In sarmentis* (Mich. I p. 540).

Hypodermeæ.

Puccinia Pruni spinosæ (*P. Prunorum Lk.*) 138). *In foliis* (Mich. I p. 9).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphæria pseudo-umbrina *Sacc.* (238). *In cortice duriore.*
Calosphæria minima *Tul.* (174). *In ramis.*
Cœlosphæria cupularis *Karst.* (172). *In ramis exsiccatis.*
Eutypa heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis corticatis.*
Eutypella Acharii *Tul.* (180). *In ramis decorticatis majoribus.*
Diatrype disciformis *Fr.* (184). *In ramis corticatis.*
Diatrype Stigma *Fr.* (184). *In ramis corticatis.*
Hypoxylon rubiginosum *Fr.* (200). *In ramis emortuis.*
Hysterium vulgare *DNtrs.* (306). *In cortice duriore.*

Lophiotrema crenatum *Sacc.* (258). *In ramis.*
Physalospora gregaria *Sacc.* (205). *In ramis corticatis.*
Podosphæria tridactyla *Lév.* (162). *In foliis* (M. S. p. 209).
Polystigma rubrum *Pers.* (281). *In foliis* (M. S. p. 146).
Rosellinia sordaria *Rekm.* (193). *In ligno.*

Myxomyceteæ.

Physarum subulatum *Schum. In ramis dejectis* (M S. p. 174).

Sphæropsideæ.

Cytospora Acharii *Sacc.* (396). *In ramis majoribus decorticatis.*
Cytospora microstoma *Sacc.* (394). *In ramis.*
Diplodia microsporella *Sacc.* (406). *In ramulis decorticatis.*
Diplodia Roumegueri *Sacc.*. (402). *In ramis emortuis.*
Hendersonia vagans *Fuck.* (418). *In cortice.*
Micropera Drupacearum *Lev.* (440). *In ramis emortuis.*
Sphæronema polymorphum *Auersw.* (388). *In truncis.*

Spiraea decumbens *Koch.*

Sphæropsideæ.

Septoria ascochytoides *Sacc.* (426). *In foliis* (Mich. I p. 178).

Spiraea Aruncus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Hypoderma virgultorum *DC.* (310). *In caulibus ramisque* (Mich. I p. 57).

Sphæreila Deianira *Sacc.* (211). *In foliis languentibus* (F. V. II p. 300).

Discomyceteæ.

Lachnella (*Trichopeziza*) leucophæa *Rehm.* (327). *In caule emortuo* (F. V. IV p. 33).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Arunci *Sacc.* (368). *In foliis* (Mich. I p. 143).

Hyphomyceteæ.

Ramularia Ulmariæ *Cooke.* ≠ Spiræ Arunci. *In foliis* (Mich. II p. 548).

Spiræa Filipendula *L.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Filipendulæ *Sacc. et Speg.* (368). *In foliis* (Mich. I p. 145-150).

Spiræe Ulmaria *L.*

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe Ulmariæ *Pers.* (165). *In foliis.*
Lophiostoma simillimum *Karst.* (302). *In ligno ramorum.*

Kerria japonica *D. C.*

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella limitata *Sacc.* (195). *In caulibus ramulisque.*
Diaporthe japonica *Sacc.* (227). *In ramis* (F. Ven. IV p. 11).
Leptosphæria Coniothyrium *Sacc.* (241). (F. V. II p. 317).
Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (245). (F. V. II p. 318).

Sphæropsideæ.

Diplodia Corchori *Berk.* (103). *In ramulis* (Mich. I p. 256).
Phoma japonica *Sacc.* (386). *In ramis* (F. V. V p. 201).

Hyphomyceteæ.

Gonytrichum cæsium *Nees.* (508). *In ramis putridis* (F. V. V p. 192).

Dryas octopetala *L.*

Pyrenomyceteæ.

Melanopsamma (*Amphisphæria*) anaxæa *Speg.* (218). *In radicibus* (Mich. II p. 249).
Didymella Dryadis *Speg.* (216). *Ad folia viva v. arida* (*Mich.* II p. 161).
Pyrenophora (*Pleospora*) Venturia *Speg.* (271). *Ad folia arida* (Mich. I p. 462).
Sphærella ootheca *Sacc.* (212). *In pag. sup. foliorum emortuorum* (Mich. II p. 160).

Discomyceteæ.

Sphæropeziza (*Heterosphæria*) alpina *Sacc.* (350). *In pag. sup. foliorum* (Mich. II p. 165).

Geum urbanum *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Gei *Rob. et Desm.* (432). *In foliis languidis* (F. V. V p. 207).

Potentilla alba *L.*

Hypodermeæ.

Phragmidium Fragariæ *Wint.* (*Phr. granulatum Fuck.*) (145). *In foliis* (Mich. II p. 157).

Potentilla verna *L.*

Hypodermeæ.

Phragmidium Potentillæ *Wint.* (*Phr. apiculatum Fuck.*) (145). (M. S. p. 78).

Potentilla Tormentilla *Sibth.* (Tormentilla erecta *L.*).

Hypodermeæ.

Phragmidium obtusum *Wint.* (*Phr. Tormentillæ Fuck.*) (144). *In foliis* (M. S. p. 207).

Pyrenomyceteæ.

Sphærella Ariadna *Sacc.* (211). *In foliis languidis* (Mich. I p. 379).

Sphæropsideæ.

Leptothyrium macrothecium *Fuck.* (442). *In foliis* (Mich. I. p. 202).
Phyllosticta Tormentillæ *Sacc.* (378). *In foliis* (Mich. I p. 159).
Septoria Tormentillæ *West.* (428). *In foliis languidis* (F. V. V p. 204).

Potentilla reptans *L.*

Pyunomyceteæ.

Venturia (*Ascospora*) Potentillæ *Fuck.* (220). *In foliis* (M. S. p. 200).

Spæropsideæ.

Ascochyta Potentillarum *Sacc.* (415). *In foliis* (Mich. I p. 170).
Phyllosticta potentillica *Sacc.* (368). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I. p. 139).

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicolum *Sacc.* (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Ramularia arvensis *Sacc.* (487). *In foliis languidis* (Mich. II p. 548).

Potentilla argentea *L.*

Hypodermeæ.

Phragmidium obtusum *Kze et Schm. em Tul.* (144). *In foliis* (M. S. p. 78).

Potentilla repens *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria sparsa *Fuck. In foliis* (M. S. p. 195).

Potentilla

Hypodermeæ.

Phragmidium Potentillæ *Wint.* (145). *In foliis.*

Melanconieæ.

Marsonia (*Glœosporium*) Potentillæ *Desm. et Oud.* (456). *In foliis* (Mich. I p. 220).

Fragaria indica *Andr.*

Hyphomyceteæ.

Ramularia modesta *Sacc.* (487). *In foliis* (Mich. II p. 550).

Fragaria chilœnsis *Molin.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta Fragariæ *Sacc.* (415). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 169).

Phyllosticta fragaricola *Desm. et Rob.* (368). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 140).

Septoria Fragariæ *Desm.* (433). *In foliis languidis* (F. V. V p. 206).

Fragaria

Pyrenomyceteæ.

Sphæria Fragariæ *Tul. In foliis* (M. S. p. 210).

Rubus discolor *Weihe. et Nees* (R. fruticosus *L.*)

Hymenomyceteæ.

Tremella foliicola *Fuck.* (?). *In pag. inf.* (F. V. V p. 166).

Hypodermeæ.

Phragmidium violaceum *Wint.* (*Phr. asperum Wallr.*) (145). *In foliis* (M. S. p. 207).

Phragmidium Rubi *Wint.* (*Phr. bulbosum Schlechtd*) (145). (*In foliis* (M. S. p. 79).

Pyrenomyceteæ.

Antostomella appendiculosa *Sacc.* (195). *In sarmentis* (Mich. I p. 244).

Anthostomella limitata *Sacc.* (195). *In caulibus ramulisque tenuioribus* (F. V. IV p. 2).

Clypeosphæria Notarisii *Fuck.* (253). *In ramis* (M. S. p. 210).

Diaporthe rostellata *Nke.* (231). *In ramis emortuis putrescentibus* (M. S. p. 139).

Didymosphæria permutata *Sacc.* (236). *In sarmentis emortuis* (Mich. II p. 533).

Fracchiæa heterogenea *Sacc.* (173). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 455).

Hypoderma virgultorum *DC.* (310). *In ramis exsiccatis* (M. S. p. 158).

Læstadia (*Diaporthe*) Zaviana *Sacc.* (231). *In cortice ramulorum exsiccatorum* (M. S. p. 139).

Leptosphæria (*Sphæria*) Coniothyrium *Fuck.* (244). *In ramis emortuis* (M. S. p. 98).

Leptosphæria vagabunda (*Sphæria fuscella Sacc. nec Berk. et Br.*) (245). (M. S. p. 98).

Lophiostoma dumeti *Sacc.* (300). *Ad ramos corticatos* (Mich. I p. 448).

Sphærella Ligea *Sacc.* (209). *In foliis languentibus* (F. V. II p. 300).

Sphærulina intermixta *Sacc.* (263). *In cortice nondum emortuo* (Mich. I p. 400).

Valsa Rubi *Fuck.* (175). *In ramis emarcidis* (M. S. p. 133).

Discomyceteæ.

Helotium rubicolum *Fuck.* (332). *In ramis putrescentibus.*

Lecanidion atratum *Rabh.* (350). *In ramis exsiccatis* (M. S. p. 161).

Mollisia *(Pyrenopeziza)* Rubi *Rehm.* (337). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 423).

Pezicula rhabarbarina *Tul.* (333). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 419).

Stegia dumeti *Sacc. et Speg.* (357). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 421).

Sphæropsideæ.

Camarosporium *(Hendersonia)* rubiculum *Sacc.* (422). *In ramulis* (Mich. I p. 209).

Diplodia Rubi *Fr.* (403). *In ramis* (M. S. p. 202).

Diplodia rubicola *Sacc.* (403). *In ramis* (Mich. I p. 256).

Hendersonia Rubi *West.* (418). *In sarmentis* (Mich. I p. 214).

Phoma vepris *Sacc.* (386). *In sarmentis.*

Phyllosticta rubicola *(Depazea areolata Fuck.)* (374). *In foliis* (M. S. p. 192).

Septoria Rubi *West.* (424). *In foliis* (Mich. I p. 172).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Rubi *Sacc.* (518). *In foliis languidis* (F. V. V p. 188).

Rhinotrichum griseum *Sacc.* (478). *In pag. inf. foliorum.*

Melanconieæ.

Coryneum foliicolum *Fuck. In foliis* (Mich. II p. 169).

Coryneum microstictum *Berk. et Br.* (457). *In ramis* (M. S. p 190).

Pestalozzia funerea *Desm.* f. typica. (459). *In foliis vivis vel emortuis* (Mich. I p. 478).

Trullula hysterioides *Speg.* (453). *In sarmentis putridis.*

Rubus cæsius *L.*

Hypodermeæ.

Phragmidium Rubi *Wint.* (*Phr. bulbosum. Schlechtl.*) (145). *In foliis* (M. S. p. 79).

Pyrenomyceteæ.

Glonium amplum *Dub.* (306). *In ramulis* (M. S. p. 158).

Hyponectria flavo-nitens *Sacc. et Speg.* (281). *In sarmentis emortuis quæ flavo-punctata fiunt* (Mich. I p. 441).

Microthyrium microscopicum *Desm.* (295). *In sarmentis corticalis* (Mich. I p. 381).

Venturia Kunzei *Sacc.* (219). *In pag. sup. foliorum viventium* (F. V. V p. 174).

Discomyceteæ.

Lachnella (*Velutaria*) rufo-olivacea *Fuck.* (327). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 443).

Sphæropsideæ.

Discosia Artocreas *Fr.* (445). (Mich. I p. 201).
Phyllosticta rubicola *Rabh.* (374). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 154).
Robilarda sessilis *Sacc.* (416). *In foliis languidis* (Mich. I p. 261).
Septoria Rubi *West.* (424). *In foliis* (Mich. I p. 172).

Melanconieæ.

Pestalozzia longiseta *Speg.* (459). *Ad folia viva vel languida* (Mich. I p. 478).

Rubus idæus *L.*

Hypodermeæ.

Phragmidium gracile *Grev.* (145). (M. S. p. 78).

Pyrenomyceteæ.

Diaporte insignis *Fuck.* (231). *In cortice sarmentorum* (Mich, I p. 284).

Discomyceteæ.

Coccomyces Rubi *Karst. In sarmentis putrescentibus* (Mich. II p. 262).
Phacidium rugosum *Fr.* (356). *In sarmentis emortuis* (Mich. II p. 165).

Sphæropsideæ.

Leptostroma Rubi *Speg.* (443). *In sarmentis* (Mich. II p. 182).
Septoria Rubi *West.* (424). *In foliis* (Mich. I p. 272).

Rubus Chamæmorus *L.*

Hymenomyceteæ.

Panus (*Agaricus*) Craterellus *DR.* (62). *In sarmentis putrescentibus* (F. V. V p. 162).
Stereum tabacinum *Fr.* (112). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 5).

Pyrenomycetæ.

Antostomella clypeata *Sacc. In sarmentis emortuis* (Mich. II p. 532).

Didymosphæria bruncola *Niessl.* (236). *In caulibus exsiccatis.*

Ceratostoma Jani-collinum *Sacc. et Speg.* (187). *In ramis* (Mich. I p. 246).

Fenestella princeps *Tul.* (276). *In ramis corticatis.*

Hypoderma virgultorum *DC.* (310). *In sarmentis emortuis.*

Hysterium angustatum *Alb. et Schw.* (306). *In ramis putrescentibus.*

Leptosphæria Coniothyrium *Sacc.* (244). *In sarmentis emortuis* (F. V. II p. 317).

Leptosphæria fuscella *Ces. et DNtrs.* (245). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 39).

Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (245). *In sarmentis.*

Lophidium compressum *Sacc.* (302). *In ligno.*

Lophiosphæra Fuckelii *Sacc.* (297). *In ramis.*

Lophiotrema præmorsum *Sacc.* (298). *In ramis emortuis.*

Rosellinia Aquila (α) *DNtrs.* (191). *In lignis et ramis emortuis* (M. S. p. 108).

Hyphomycetæ.

Torula Uredinis *Fr. In pag. inf. foliorum* (M. S. p. 177).

Melanconieæ.

Gloeosporium Venetum *Speg.* (450). *Ad folia viva vel languida* (Mich. I p. 477).

Haineria Rubi *Sacc.* (449). *In foliis.*

Agrimonia Eupatorium *L.*

Hypodermeæ.

Uredo Agrimoniæ Eupatoriæ *DC.* (*Coleosporium ochraceum Bon*). *In foliis* (M. S. p. 206).

Hyphomyceteæ.

Corethropsis pulchra *Sacc.* (471). *In foliis.*

Alchemilla vulgaris *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Alchemillæ *Schröt.* (132). *In pag. inf. foliorum* (F. V. V. p. 170).

Pyrenomyceteæ.

Venturia Alchemillæ *B. et Br.* (220). *In foliis* (F. V. V p. 174).

Hyphomyceteæ.

Ovularia pusilla *Sacc.* (479). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 547).
Ramularia aplospora *Speg.* *In foliis* (Mich. II p. 170).

Poterium Sanguisorba *L.*

Hypodermeæ.

Phragmidium Fragariæ *Wint.* (*Phr. Poterii Fuck.*) (145). *In foliis* (M. S. p. 78).

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria modesta *Karst.* (246). *In caulibus.*

Rosa gallica *L.*

Pyrenomyceteæ.

Nectria Urceolus *Speg.* (284). *In ramulis emortuis putrescentibus* (Mich. I p. 463).

Rosa alpina *L.*

Hypodermeæ.

Phragmidium fusiforme *Schröt.* (145). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 438).

Pyrenomyceteæ.

Nectriella villosula *Speg.* (281). *In ramulis emortuis* (Mich. I p 463).

Rosa canina *L.*

Pyrenomyceteæ.

Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183). (Mich. I p. 21).
Cucurbitaria Rosæ *Wint.* *In ramis putrescentibus* (Mich. I p. 408).
Diaporthe simulans *Sacc.* (277). *In ramis majoribus* (F. V. IV p. 11).

Discomyceteæ.

Pezicula (*Cenangium*) Rosæ *Sacc.* (333). *In ramis emortuis* (M. S. p. 160).

Schyzoxylon Berkelejanum *Speg.* (354). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 471).

Sphæropsideæ.

Cytospora Rosarum *Grèv.* (394). *In ramulis.*
Phoma incarcerata *Sacc.* (383). *In ramis.*
Septoria Rosæ *Desm.* (425). *In foliis* (Mich. I p. 176).

Hyphomyceteæ.

Fusarium roseum *Link.* (537). *In fructibus* (Mich. II p. 295).

Melanconieæ.

Pestalozzia lignicola *Cooke.* (460). *In ramulis emortuis.*

Rosa arvensis *Huds.*

Sphæropsideæ.

Septoria Rosæ arvensis *Sacc.* (425). *In foliis* (Mich. I p. 176).

Rosa muscosa *L.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta rosicola *Sacc.* (412). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 164).

Melanconieæ.

Pestalozzia compta *Sacc.* (458). *In foliis languidis* (Mich. II p. 542).

Rosa centifolia *L.*

Hypodermeæ.

Phragmidium subcorticium *Wint.* (*Cœoma miniatum Bon.*) (145). *In foliis calycibusque* (M. S. p. 75).

Pyrenomyceteæ.

Botryosphæria Bérengeriana *Sacc.* (207). (F. V. IV p. 4).
Gibberella Saubinetii *Sacc.* (289). (*Botryosphæria dispersa DNtrs.*) (289). *In ramulis hornotinis* (M. S. p. 117).
Valsa ceratophora *Tul.* (175). *In cortice ramorum* (M. S. p. 133).

Discomyceteæ.

Stictis Saccardoi *Rehm.* (354). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 61).

Stictis pallidula *Sacc.* (354). *In ramis emortuis.*

Sphæropsideæ.

Actinonema Rosæ *Fr.* (416). *Epigina; in foliis* (M. S. p. 198).
Diplodia Rosæ *Fr.* (403). *In ramis* (M. S. p. 200).

Hyphomyceteæ.

Cercospora rosicola *Pass.* (520). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 267).

Melanconieæ.

Coryneum microstictum *Berck. et Br.* (457). *In ramis* (M. S. p. 190).

Rosæ cultæ

Melanconieæ.

Libertella Rosæ *Desm.* (455). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 283).

Rosa.

Hypodermeæ.

Phragmidium subcorticium (*Schrank*) *Wint.* (*Phr. Rosarum Rabh. em Fuck.*) (145). *In foliis* (M. S. p. 79).

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella clypeata *Sacc. In sarmentis emortuis* (Mich. II p. 532).
Clypeosphæria Notarisii *Fuck.* (253). *In ramis emortuis.*
Botryosphæria Berengeriana *DNtrs.* (207). *In cortice sub epidermide et raro supra epidermidem ramorum truncorumque tabescentium* (M. S. p. 116).
Hypoderma virgultorum *DC.* (310). *In caulibus ramisque* (Mich. I p. 57).
Leptosphæria fuscella *Ces. et DNtrs.* (245). *In sarmentis putridis.*
Leptosphæria Coniothyrium *Sacc.* (244). (F. V. II p. 317).
Lophiotrema crenatum *Sacc.* 298). *In ramis.*
Metasphæria (*Sphæria*) sæpincola *Fr. In ramulis* (M. S. p. 210).
Physalospora gregaria *Sacc.* (205). *In ramis corticatis.*
Sphærotheca pannosa *Fuck.* (163). *In foliorum petiolis et florum pedunculis* (M. S. p. 90).
Zignöella eutypoides *Sacc. In truncis ramisque* (Mich. II p. 248).

Spæropsideæ.

Coniothyrium Fuckelii *Sacc.* (399). (Mich. I p. 207).

Dendrophoma pleurospora *Sacc.* (388). *In ramis.*
Discosia Artocreas *Fr.* (445). *In foliis* (Mich. I p. 201).

Hyphomyceteæ.

Exosporium fructicola *Sacc.* (541). *In fructibus putrescentibus.*
Oidium leucoconium *Desm.* (470). *In foliis calicibusque.*
Verticillium candidulum *Sacc.* (481). *In fructibus putrescentibus* (Mich. II p. 553).
Tubercularia vulgaris *Pers.* (532). *Ad ramos.*

Calycanthus floridus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sphærella Coneglanensis *Speg.* (210). *Ad folia emortua dejecta* (Mich. I p. 455).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Calycanthi *Sacc. et Speg.* (412). *In foliis* (Mich. I p. 162).
Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Diplodia Calycanthi *Speg.* (404). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 485).
Epicoccum purpurascens *Ehrb.* (540). *In foliis.*
Hendersonia sarmentorum *West.* (418). (Mich. I p. 214).
Septoria Calycanthi *Sacc. et Speg.* (425). *In foliis.*

Chimonanthus fragrans *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe extorris *Sacc.* (266). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 30).
Eutypa (*Valsa*). ludibunda *Sacc.* (180). *In ramis* (Mich. I p. 15).
Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In ramis* (Mich. I p. 32).

Sphæropsideæ.

Diplodia Chimonanthi *Sacc.* (404). *In ramis* (Mich. II p. 265).
Phyllosticta Calycanthi *Sacc. et Speg.*

Chimonanthus

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria Coniothyrium *Sacc.* (241). (F. V. II p. 317).

Cratægus oxyacantha *L.*

Hypodermeæ.

Gymnosporangium clavariæforme *Sacc.* (*Ceratitium laceratum Rabh.*). (146). *In foliis et ramulis* (Mich. p. I 365).

Pyrenomyceteæ.

Aponectria inaurata *S.* (285). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 544).
Calosphæria ciliatula *Karst.* (173). *In ramis.*
Cryptovalsa Nitschkei *Fuck.* (183). (Mich. I p. 22).
Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183). Mich. I p. 21).
Diaporthe Cratægi *Nke.* (223). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. I p. 441).
Diaporthe semiimmersa *Nke.* (227). (F. V. IV p. 12).
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). *In ramis* (Mich. I p. 15).
Leptosphæria vagabunda (*Sphæria fuscella Berk. et Br.*). (245). (M. S. p. 98).
Lophodermium hysterioides *Chir.* (310). *Ad folia dejecta.*
Otthia Cratægi *Fuck.* (239). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 248).
Podosphæra Oxyacanthe *De Bary.* (*Podosphæra clandestina Lév.*). (162). *In foliis* (F. V. V p. 173).
Valsa Hoffmanni *Nke.* (175). *In ramis exsiccatis* (M. S. p. 132).
Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In ramis* (F. V. IV p. 20).

Sphæropsideæ.

Diplodia Cratægi *Fuck.* (402). *In ramis* (M. S. p. 201).
Phoma crategi *Fuck.* (377). *In ramis corticatis.*
Phyllosticta Cratægi *Speg.* (365). *In foliis* (Mich. I p. 483).
Septoria Cratægi *K.* (426). *In pag. sup. foliorum* (F. V. V p. 206).
Phleospora (*Septoria*) Oxyacantha *Kze.* (437). *In foliis* (M. S. p. 197).

Hyphomyceteæ.

Coryneum microstictum *B. et Br.* (456). *In ramis.*
Coryneum pestalozzioides *Sacc.* (457). *In foliis languidis.*
Hirudinaria macrospora *Ces.* (500). *In foliis* (F. V. V. p. 190).

Cratægus

Pyrenomyceteæ.

Diatrypella verruciformis *Nits.* (184). *In ramis.*

Didymella analepta *Sacc.* (216). *In ramulis corticatis.*
Eutypa lata *Tul.* (181). *In ligno et cortice.*
Fenestella princeps *Tul.* (276). *In ramis et cortice.*
Gloniopsis biformis *Sacc.* (308). *In ligno denudato.*
Gnomonia setacea *De Not.* (217). *In pag. inf. foliorum.*
Hypoxylon fuscum *Fr.* (200). *In cortice.*
Phyllactinia suffulta *Sacc.* (163). *In foliis vivis.*

Aronia rutundifolia *L.*

Hypodermeæ.

Gymnosporangium juniperinum (*Wint.* (*Ceratitium comutum Rabh.*) (146). (Mich. I p. 365).

Pyrenomyceteæ.

Aylographum vagum *Desm.* (305). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 45).

Photinia glabra *Lind.*

Pyrenomyceteæ.

Valsa ceratophora *Tul.* (175). (Mich. I p. 19).

Photinia serrulata *Lind.*

Sphæropsideæ.

Diplodia Photiniæ *Speg.* (408). *In foliis dejectis putrescentibus* (Mich. I p. 485). (Mich. II p. 269).
Discosia Artocreas *Fr.* (435). *In foliis* (Mich. II p. 201).
Pestalozzia funerea *Desm.* f. typica. (459). *In foliis vivis vel e-mortuis* (Mich. I p. 478).
Phyllosticta Photiniæ *Sacc.* (375). *In foliis* (Mich. I p. 156).
Phyllosticta photinicola *Sacc.* (375). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 157).

Hyphomyceteæ.

Circinotrichum maculiforme *Ness.* (506). *In foliis putridis* (M. S. p. 211).

Photinia

Pyrenomyceteæ.

Aylographum vagum *Desm.* (305). *In foliis.*

Hyphomyceteæ.

Circinotrichum maculiforme *Ness.* (506). *In foliis* (Mich. I p. 272).

Mespilus germanica *L.*

Sphæropsideæ.

Entomosporium maculatum *Lév. var.* domesticum (445). *In foliis.*
Phyllosticta Mespili *Sacc.* (376). *In foliis* (M. I. p. 159).
Septoria Mespili *Sacc.* (426). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 177)

Hyphomyceteæ.

Hirudinaria Mespili *Ces.* (500). *In foliis* (F. V. V p. 190).

Eriobotrya japonica *Lindl.*

Hymenomyceteæ.

Polyporus versicolor *Fr.* (100). *Ad truncos emortuos.*

Pyrenomyceteæ.

Physalospora gregaria *Sacc.* (205). *In ramis corticatis.*

Sphæropsideæ.

Diplodia Eriobotryæ *Sacc.* (408). *In nervis foliorum* (Mich. II p. 267).
Discosia Artocreas *Fr.* (445). *In foliis* (Mich. I p. 201).

Pyrus Cydonia *L.* (Cydonia vulgaris *Pers.*).

Pyrenomyceteæ.

Eutypa (*Valsa*) lata *Nke.* (180). *In truncis ramisque decorticatis rarius in ipso cortice* (M. S. p. 128).
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15.
Rosellinia Aquila *DNtrs.* (191). *In ligni et ramis emortuis* (M. S. p. 108).

Sphæropsideæ.

Diplodia Cydoniæ *Sacc.* (402). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 269).
Hendersonia foliorum *Fuck.* (419). *In foliis* (M. S. p. 200).

Melanconieæ.

Glœosporium Cydoniæ *Mont. In foliis languidis* (Mich. II p. 540).

Pyrus communis *L.*

Hymenomyceteæ.

Marasmius capillipes *Sacc.* (60). *In foliis dejectis* (F. V. V p. 162).
Naucoria (*Agaricus*) rimulincola *Lasch.* (76). *In rimis corticis durioris* (F. V. V p. 161).
Panus Delastrei *Mtgn.* (62). *In cortice duriore* (Mich. I p. 3).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphæria Spegazziniana *Sacc.* (238). *In ligno decorticato putri* (Mich. I p. 32).
Anthostoma Venetum *Sacc.* (196). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 25).
Diaporthe ambigua *Nke.* (231). *In ramulis corticatis* (F. V. V p. 181).
Didymella analepta *Sacc.* (216). *In ramulis.*
Eutypa lata *Tul.* (181). *In ligno et cortice.*
Eutypa lejoplaca *Cooke.* (181). *In ramis decorticatis.*
Gloniopsis biformis *Sacc.* (308). *In ligno denudato.*
Glonium lineare *De Not.* (305). *In ligno vetusto.*
Hysterium angustatum *Alb. et Schw.* (306). *In ramis atque in cortice.*
Leptosphæria Lucilla *Sacc.* (297). *In foliis languidis* (F. V. II p. 310).
Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (245). (F. V. II p. 318).
Lophidium (*Lophiostoma*) gregarium *Fuck.* (303). *In cortice duriore* (F. V. V. p. 177).
Lophiosphæra lignicola *Sacc.* (297). *In ligno.*
Lophodermium hysterioides *Sacc.* (310). *In foliis aridis.*
Ostropa cinerea *Fr.* (312). *In ramis exsiccatis.*
Melanomma Pulvis-pyrius *Sacc.* (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).
Rosselinia pulveracea *Fuch.* (192). *In lignis denudatis* (M. S. p. 109).
Sphærella Bellona *Sacc.* (209). *In foliis languidis* (Mich. I p. 244).
Sphærella Pyri *Auersw.* (209). *In foliis exsiccatis.*
Sphærella Sentina *Fuck. In foliis* (M. S. p. 209).

Valsa ambiens *Fr.* (177). *In cortice truncorum ramorumque languentium* (M. S. p. 131).

Discomyceteæ.

Calloria vinosa *Fr.* (346). *In cortice duriore* (F. V. IV p 30).
Exoascus bullatus *Fuck.* (359). *In foliis* (Mich. I p. 62).

Sphæropsideæ.

Ascochyta pyricola *Sacc.* (414). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 168).
Asteroma geographicum *Desm.* (389). *In foliis.*
Coniothecium Epidermidis *Cda.* (503). *In ramis* (F. V. V p. 194).
Diplodia Malorum *Fuck.* (408). *In fructibus putrescentibus* (M. S. p. 202).
Diplodia Pseudo-Diplodia *Fuck.* (402). *In ramulis* (M. S. p. 201).
Hendersonia pyricola *Sacc.* (419). *In foliis languidis.*
Hendersonia vagans *Fuck.* (418). *In cortice.*
Phyllosticta pyricola *Sacc. et Speg.* (373). *In foliis* (Mich. I p. 153).
Phyllosticta Pyrina *Sacc.* (365). *In foliis* (Mich. I p. 134).

Hyphomyceteæ.

Fusicladium dendriticum *Fuck.* (510). *In pag. inf. foliorum.*
Hyphoderma roseum *Fr.* (475). *In cortice* (M. S. p. 187).
Monilia (*Torula*) fructigena *Pers.* (480). *In fructibus putridis* (M. S. p. 177).
Oospora virescens *Wallr.* (468). *In foliis putridis.*
Septonema Hormiscium *Sacc.* (498). *In cortice* (Mich. II p. 559).
Septonema rude *Sacc.* (498). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 270).
Torula virescens *Sacc.* *In foliis putridis* (F V. V p. 190).

Melanconieæ.

Coremium vulgare *Cda.* (525). *In fructibus corruptis* (M. S. p. 183).
Glœosporium fructigenum *Berk.* (452). *In pyris putridis* (F. V. V p. 262).
Pestalozzia breviseta *Sacc.* (459). *In pag. inf. foliorum.*

Pyrus Malus *L.*

Hypodermeæ.

Æcidium penicillatum *A. et S.* (149). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Anthostoma Venetum *Sacc.* (196). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 25).
Anthostoma melanotes *Sacc.* (196). *In ramis decorticatis.*
Hysterium angustatum *A. et S.* (306). *In ramis.*
Lophiosphæra subcorticalis *Trev.* (297). *In ligno corticeque.*
Leptosphæria Pomona *Sacc.* (248). *In pag. sup. foliorum.* (F. V. V p. 176).
Nummularia discreta *Tul.* (202). *In ramis crassioribus.*
Valsa acclinis *Fr.* (177). *In ramis exsiccatis.*
Valsa Auerswaldi *Nits.* (178). *In ramis.*

Discomyceteæ.

Lachnella (*Helotium*) papillaris *Karst.* (228). *In ligno decorticato putre* (Mich. I p. 426).
Mollisia (*Tapesia*) minutissima *Fuck.* (333). *In ligno putri* (Mich. II p. 260).

Sphæropsideæ.

Aposphæria (*Phoma*) fusco-maculans *Sacc.* (387). *In ligno decorticato* (Mich. II p. 275).
Asteroma Mali *Desm.* (398). *In pag. sup. foliorum.* (Mich. II p. 300).
Diplodia Pseudo-Diplodia *Fuck.* (402). *In ramulis.* (M. S. p. 201).
Discosia Artocreas *Fr.* (445). (Mich. I p. 201).
Monilia fructigena *Pers.* (480). *In fructibus putridis.*
Phyllosticta prunicola *Sacc.* (375). *In pag. sup. foliorum* (M. I p. 157).
Sphæropsis Mali *Sacc.* (397). *In ramulis.*
Vermicularia trichella *Fr.* (391). *In maculis exaridis foliorum* (F. V. V p. 199).

Hyphomyceteæ.

Botrytis granuliformis *Sacc.* (478). *In ligno denudato* (Mich. II p. 286).
Fusicladium dendriticum *Fuck.* (510). *In pag. sup. foliorum* (M. S. p. 182).
Spilocæa Pomi *Fr. In pomis vegetis* (M. S. p. 177).
Verticillium epimyces *B. et Br. var.* epicarpium *Sacc.* (482). *In epicarpio putrescente* (Mich. II p. 553).
Verticillium lateritium *Berk.* (482). *In epicarpio putrescente.*

Melanconieæ.

Trullula nitidula *Sacc.* (454). *In ligno.*

Pyrus torminalis *Ehrb.* (Cratægus torminalis *L.* Sorbus torminalis *Crtz.*).

Hypodermeæ.

Gymnosporangium juniperinum (*Ceratitium laceratum Rabh.*) (146). (Mich. I p. 365).

Pyrenomyceteæ.

Eutypella (*Valsa*) Sorbi *Fr.* (179). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 368).
Linospora Magnagutiana *Sacc.* (278). *In foliis* (Mich. I p. 45).
Sphærella topographica *Sacc. et Speg.* (209). *In foliis languidis* (Mich. I p. 380).

Sphæropsideæ.

Actinonema Cratægi *Pers.* (416). *In foliis* (Mich. II p. 281).
Asteroma geographicum *Desm.* (389). *In foliis.*
Discosia Artocreas *Fr.* (445). (Mich. I p. 201).
Hendersonia Torminalis *Sacc.* (419). *In foliis languidis* (F. V. V p. 207).
Septoria hyalospora *Sacc.* (427). *In foliis languidis.*

Hypodermeæ.

Fusicladium (*Passalora*) dentriticum *Sacc.* (510). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 265).
Graphium aspergilloides *Speg.* (529). *In pag. inf. foliorum putrescentium* (Mich. I p. 476).

Pyrus Aria *Ehrb.* (Sorbus Aria *Crtz.*).

Hypodermeæ.

Æcidium penicillatum *Wint.* (*Ceratitium laceratum Rabh.*) (149). (Mich. I p. 365).

Sphæropsideæ.

Asteroma geographicum *Desm.* (389). *In foliis.*
Septoria Sorbi *Fuck.* *In foliis.* (M. S. p. 197).

Pyrus Sorbus *Gærtn* (Sorbus domestica *L.*).

Pyrenomyceteæ.

Calosphæria vibratilis *Nitshke.* (174). *In cortice ramorum.*
Coronophora gregaria *Fuck.* (174). *In ramis corticatis.*
Eutypella Sorbi *Fr.* (179). *In ramis corticatis.*
Fenestella vestita *Sacc.* (276). *In ramis corticatis emortuis.*
Lophiotrema duplex *Sacc.* (298). *In lignis ramisque.*
Nummularia discreta *Tul.* (202). *In ramis crassioribus.*
Sillia ferruginea *Karst.* (279). *In ramis corticatis emortuis.*

Sphæropsideæ.

Hendersonia vagans *Fuck.* (418). *In cortice ramorum.*
Septoria hyalospora *Fuck.* (427). *In foliis languidis* (F. V. V p. 204).

Pyrus Aucuparia *Gærtn* (Sorbus Aucuparia *L.*).

Hypodermeæ.

Gymnosporangium Juniperinum *Lk.* (146). *In foliis* (M. S. p. 88).

Pyrenomyceteæ.

Eutypa aspera *Fuck.* (180). *In ramis.*
Eutypella Sorbi *Fr.* (179). *In ramis.*
Diaporthe patria *Speg.* (222). *In ramulis dejectis* (Mich. II p. 250).
Valsa leucostoma *Fr.* (178). *In ramis.*
Venturia chlorospora *Karst.* (219). (Mich. I p. 382).

Sphæropsideæ

Cytospora rubescens *Fr.* (394). *In ramulis.*

Lythraceæ.

Lythrum Salicaria *L.*

Pyrenomyceteæ.

Didymosphæria conoidea *Niessl.* (236). *In caulibus exsiccatis.*
Lophiotrema Scrophulariæ *Sacc. var.* cruentulum *Bizz.* (299). *In caulibus exsiccatis.*
Lophiotrema (*Lophiostoma*) vagabundum *Sacc.* (299). *In caulibus* (Mich. I p. 447).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Lythri *Niessl.* (520). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 269).

Sphæropsideæ.

Septoria Brissaccana *Sacc. et Lév.* (431). *In foliis languidis.*

Lagerstrœmia indica *L.*

Pyrenomyceteæ.

Hysterium pulicare *Pers.* (306). *In cortice duriore* (F. V. IV p. 26).

Myxomyceteæ.

Didymium complanatum *Fuck.* (10). *In cortice* (M. S. p. 174).

Sphæropsideæ.

Diplodia Lagerstrœmiæ *Speg.* (405). *In ramulis emortuis dejectis* (Mich. I p. 485).

Phoma Lagerstrœmiæ *Speg.* (384). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 482)

Onagrarieæ.

Epilobium montanum *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Epilobii *D. C.* (141). *In foliis* (Mich. II p. 156).

Hyphomyceteæ.

Cercospora montana *Sacc.* (518). *In foliis* (Mich. II p. 169).

Ramularia montana *Speg.* (487). *Ad folia languida* (Mich. II p. 169).

Epilobium parviflorum *Schreb.*

Sphæropsideæ.

Septoria Epilobii *West.* (431). *In foliis* (M. S. p. 195).

Epilobium hirsutum *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria (*Ascochyta*) Epilobii *Rabh.* (431). *In foliis* (M. S. p. 194).

Epilobium angustifolium *L.*

Hypodermeæ.

Melampsora (*Pucciniatrum*) Epilobii *Ott.* (147). *Ad folia viva vel languida* (Mich. II p. 155).

Pyrenomyceteæ.

Gnomonia Epilobii *Avod.* (217). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 439).

Epilobium Dodonæi *Vill.*

Pyrenomyceteæ.

Dydimella (*Didymosphæria*). Fuckeliana *Sacc. In caulibus emortuis* (Mich. I p. 440).

Leptosphæria Cadubriæ *Speg.* (246). *Ad caules dejectos putres* (Mich. II p. 250).

Sphærella microspila *Cooke.* (211). *In foliis emortuis* (F. V. V p. 175).

Epilobium

Pyrenomyceteæ.

Clypeosphæria Notarisii *Fuck.* (273). *In ramis emortuis.*

Hypoderma commune *Duby.* (310). *In caulibus.*

Pleospora vulgaris *Nits.* (269). *In caulibus emortuis.*

Sphærella microspila *Cooke.* (111). *In foliis.*

Sphæropsideæ.

Septoria Epilobii *Rabenh.* (431).

Oenothera biennis *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria (*Depazea*) Oenotheræ *Lasch.* (431). *In foliis* (M. S. p. 192).

Circæa alpina *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Circææ *Pers.* (136). *In foliis.* (F. V. V. p. 170).

Melampsora (*Pucciniastrum*) Circææ *Wint.* (147). *In foliis* (Mich. II p. 155).

Circæa intermedia *Ehrb.*

Hypodermeæ.

Melampsora (*Pucciniastrum*) Circææ *Wint.* (147). *In foliis* (Mich. II p. 155).

Circæa Lutetiana *L.*

Hypodermeæ.

Melampsora Circeæ *Thüm.* (147). *In foliis.*
Puccinia Circææ *Pers.* (136). *In foliis* (F. V. V p. 170).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta lutetiana *Sacc.* (376). *In foliis* (Mich. I p. 159).

Crassulaceæ.

Sedum maximum *Sent.*

Pyrenomyceteæ.

Dothidella thoracella *Sacc.* (*Euryachora Sedi Fuck.*) *In caulibus putrescentibus* (Mich. I p. 53).

Sedum reflexum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe muralis *Speg.* (228). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 450).

Sedum album *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe muralis *Speg.* (228). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 458).

Ficoideæ.

Mesembrianthemum acinacifolium

Pyrenomycetæ.

Diaporthe Neapolitana *Sacc.* *In ramis emortuis* (Mich. I p. 388).

Cactaceæ.

Opuntia Ficus-indica *Mill.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria sicula *Sacc. et Beltr. In trunco putrescente* (Mich. I p. 397).

Sphæropsideæ

Phyllosticta Opuntiæ *Sacc. et Speg.* (375). *In cladodiis* (Mich. I 156).

Opuntia vulgaris *Mill.* (O. nana *Vis.*)

Sphæropsideæ.

Diplodia Opuntiæ *Sacc.* (409). *In cladodiis* (Mich. II p. 267).

Echinocactus

Sphæropsideæ.

Phoma torrens *Sacc.* (380). *In truncis quos enecat.*

Mammillaria

Sphæropsideæ.

Phoma torrens *Sacc.* (380). *In truncis quos enecat.*

Saxifrageæ.

Saxifraga rotundifolia *L.*

Melanconieæ.

Cylindrosporium microspermum *Speg.* (454). *Ad folia viva v. languida* (Mich. II p. 169).

Saxifraga Aizoon *Jacq.*

Sphæropsideæ.

Phoma alpina *Speg.* (382). *In scapis dejectis putrescentibus* (Mich. II p. 272).

Hydrangea hortensis *Sm.*

Sphæropsideæ.

Septoria Hydrangeæ *Bizz.* (427). *In foliis.*

Ribes rubrum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Cryptovalsa Rabenhorstii *Nke.* (183). (Mich. I p. 21).
Plowrightia (*Dothidea*) ribesia *Fr.* (187). *In ramis emortuis* (F. V. V p. 182).
Diaporthe Strumella *Fuck.* (222). *In ramulis exsiccatis.*

Sphæropsideæ.

Diplodia Ribis *Sacc.* (405). *In ramis.*

Melanconieæ.

Glœosporium Ribis *Mtgn. et Desm.* (449). *In foliis* (F. V. V p. 202).

Ribes aureum *Pursh.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria vagabunda (*Sphæria fuscella*) *Berk. et Br.* (245). (M. S. p. 97).

Ribes Grossularia *Spach.*

Pyrenomyceteæ.

Calosphæria ciliatula (*C. Wahlenbergii*) (173). *Karst. In ramulis* (F. V. IV p. 21).
Cucurbitaria Ribis *Sacc.* (275). *In trunco* (M. S. p. 210).
Diaporthe Strumella *Fuck.* (222). *In ramulis exsiccatis.*

Sphæropsideæ.

Dendrophoma pleurospora *Sacc.* (388). *In ramis.*
Phyllosticta Grossulariæ *Sacc.* (366). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 136).
Septoria Grossulariæ *West.* (424). *In foliis* (F. V. V p. 207).

Philadelphus coronarius *L.*

Pyrenomyceteæ.

Botryosphæria Berengeriana *De Not.* (207). *In ramis.*
Diaporthe Landeghemiæ *Nits.* (233). *In ramis emortuis.*
Rosellinia Desmazierii *Sacc.* (192). *In basi putrescente trunci* (Mich. I p. 371).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Philadelphi *Sacc. et Speg.* (113). *In foliis* (Mich. I p. 165).
Camarosporium macrosporum *Berk. et Br.* (422). *In ramulis.*
Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Hendersonia pulchella *Sacc.* (417). *In ramulis* (M. S. p. 209).
Phoma Landeghemiæ *Sacc.* (384). *In ramis emortuis.*

Hyphomyceteæ.

Graphium Desmazierii *Sacc.* (529). *In truncis putrescentibus.*
Ramularia Philadelphi *Sacc.* (486). *In foliis languidis.*

Deutzia scabra *Thunb.*

Pyrenomyceteæ.

Botryosphæria Bérengeriana *Sacc.* (207). (F. V. IV p. 4).
Diaporthe Landeghemiæ *Nke.* (233). *In ramis emortuis* (M. S p. 139).

Sphæropsideæ.

Cytospora asterophora *Sacc. In ramis* (Mich. II p. 265).

Myrtaceæ.

Punica Granatum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Didymella analepta *Körb.* (216). *In ramulis corticatis* (Mich. II p. 248).
Nectriella Versoniana *Sacc.* (280). *In fructibus immaturis dejectis et putrescentibus* (Mich. II p. 256).
Valsa punica *Sacc. et Speg.* (175). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 367).

Discomyceteæ.

Cryptodiscus maior *Sacc.* (353). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 62).

Sphæropsideæ.

Cytospora punica *Sacc.* (394). *In ramis corticatis.*

Dendrophoma (*Phoma*) cytisporoides *Sacc.* (388). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 273).

Phoma Granati *Sacc.* (378). *In calycibus, petalis, rarius in foliis exsiccatis* (F. V. V p. 200).

Zithia (*Phoma*) Versoniana *Sacc.* (440). *In fructibus immaturis dejectis* (Mich. I p. 272).

Phyllosticta punica *Sacc. et Speg.* (375). *In foliis* (Mich. I p. 156).

Eucalyptus Stewenianus *L.*

Sphæropsideæ.

Pestalozzia funerea *Desm.* (459). f. typica. (459). *In foliis vivis v. emortuis* (Mich. I p. 478).

Umbelliferæ.

Eryngium campestre *L.*

Pyrenomyceteæ.

Pleospora vulgaris *Niessl.* (269). *In caule* (Mich. I p. 48).

Sphæropsideæ.

Vermicularia Eryngii *Fuck.* (392). *In caulibus petiolisque exsiccatis* (M. S. p. 191).

Eryngium amethystinum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe nigrella *Niessl. var.* tetraspora *Sacc.* (227). *In caule emortuo* (Mich. II p. 250).

Eryngium.

Hymenomyceteæ.

Pleurotus (*Agaricus*) Eryngii *DC.* (19). *In pratis ad radices* (Mich. I p. 435).

Conium maculatum *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Aethusæ *Mart.* (*Puccinia Conii Fuck.*) (138). *In foliis* (F. V. V p. 169).

Pyrenomyceteæ.

Gibberella Saubinetii *Sacc.* (289). *In caulibus exsiccatis.*

Spæropsideæ.

Vermicularia Dematium *Fr.* (391). *In caulibus emortuis.*

Bupleurum aristatum *Barth.*

Hypodermeæ.

Puccinia Bupleuri *Bud.* (141). *In foliis* (Mich. II p. 156).

Bupleurum gramineum *Vill.*

Hypodermeæ.

Puccinia Bupleuri *Bud.* (141). *In foliis* (Mich. II p. 156).

Apium graveolens *L.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora Apii *Fres.* (519). *In foliis* (F. V. V p. 190).

Petroselinum sativum *Hoff.*

Hypodermeæ.

Puccinia Aethusæ *Mart.* (138). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Pleospora vulgaris *Niessl.* (269). *In caule* (Mich. I p. 48).

Ophiobolus (*Raphidophora*) rubellus *Fuck. In caulibus exsiccatis* (M. S. p. 101).

Sphæropsideæ.

Phoma nebulosa *Mtgne.* (381). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 258).

Septoria Petroscelini *Desm.* (429). *In foliis languidis* (Mich. I p. 182).

Sium angustifolium *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Sii *Desm.* (428). *In foliis* (M. S. p. 196).

Pimpinella magna *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Pimpinellæ *Lk.* (141). *In foliis* (M. S p. 207).

Aegopodium Podagraria *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Aegopodii *Lk. em Fuck.* (136). *In foliis* (M. S. p. 80).

Phycomyceteæ.

Peronospora nivea *de Bary.* (151). *In pag. inf. foliorum* (M. S. p. 88).

Pyrenomyceteæ.

Phyllachora Podagrariæ *Karst.* (*Ph. Aegopodii Fuck.*) (293). *In pag. inferiore foliorum* (M. S. p. 145).

Sphæropsideæ.

Septoria ægopodina *Sacc.* (430). *In foliis* (Mich. I p. 185).
Septoria Podagrariæ *Lasch.* (434). *In foliis* (Mich. I p. 192).

Chærophyllum hirsutum *L.*

Hypodermeæ.

Aecidium Chærophylli *Kirchn.* (149). *In petiolis v. in pag. inf. foliorum vivorum* (Mich. I p. 364).

Myrrhis odorata *Scop.*

Discomyceteæ.

Heterosphæria Patella *Fr.* (350). *In caulibus putridis* (Mich. II p. 262).

Mollisia (*Niptera*). Grappensis *Sacc.* (335). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 442).

Athamantha cretensis *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Pimpinellæ *Linck.* (141). *In foliis.*

Fœniculum dulce *D. C.*

Discomycetæ.

Mollisia Chailletii *Sacc.* (336). *In caulibus putrescentibus.*

Aethusa Cynapium *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Aethusæ *Lk.* (138). *In foliis* (F. V. V p. 169).

Angelica sylvestris *L.*

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella limitata *Sacc.* (195). *In caulibus ramulisque tenuioribus* (F. V. IV p. 2).
Gibberella Saubinetii *Sacc.* (*Botryosphæria dispersa DNtrs.* (289). *In caulibus putrescentibus* (M. S. p. 117).
Diaporthe Berkeleyi *Nke.* (227). (F. V. IV p. 12).
Erysiphe Umbelliferarum *De Bary.* (165). *In foliis.*
Gloniella perexigua *Speg.* (308. *Ad caules dejectos putrescentes.*
Leptosphæria conoidea *DNtrs.* (243). *In caulibus* (F. V. II p. 314).
Lophiostoma insidiosum *Ces. et DNtrs.* (302). (Mich. I p. 417).
Phyllachora Angelicæ *Fuck.* (293). *In foliis* (F. V. V p. 181).

Myxomyceteæ.

Comatricha friesiana *D. By.* (12). *Ad palos udos nec non in caule* (F. V. IV p. 39).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium conoideum *Sacc.* (308). *In caule putri* (Mich. I p. 203).
Phoma complanata *Desm.* (381). *In caulibus emortuis.*

Hyphomyceteæ.

Dendryphium curtum *B. et Br.* (517). *In lignis putridis, ramisque* (Mich. II p. 291).
Fusicladium depressum *Sacc.* (510). *In foliis.*

Ferula Ferulago *L.* (Ferulago galbanifera *Koch.*).

Hypodermeæ.

Puccinia Ferulæ *Rud.* (141). *In foliis caulibusque vivis* (Mich. II p. 158).

Puccinia Aethusæ *Mart.* (*Puccinia bullata Schroet.*) (138). *In foliis caulibusque* (Mich. II p. 246).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Berkeleyi *Nke.* (227). *In caule* (Mich. I p. 542).

Peucedanum Cervaria *Lèv.*

Hypodermeæ.

Puccinia Oreoselini *Fuck.* (138). *In foliis* (M. S. 207).

Pyrenomycetæ.

Leptosphæria spectabilis *Niessl.* (*L. Penicillium Sacc.*) (246). *In caule* (F. V II p. 316).

Peucedanum Oreofelinum *Monch.*

Hypodermeæ.

Puccinia Oreoselini *Fuck.* (138). *In foliis* (M. S. p. 207).

Peucedanum sativum *B. et H.* (Pastinaca sativa *L.*).

Sphæropsideæ.

Septoria Pastinacæ *West. In foliis languidis* (F. V. V p. 207).

Peucedanum

Hypodermeæ.

Puccinia Oreoselini *Fuck.* (138). *In foliis* (M. S. p. 207).

Sphæropsideæ.

Leptostromella (*Leptostroma*) hysterioides *Fr.* (445). *In caule* (Mich. II p. 282).

Heracleum Sphondylium *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Pimpinellæ *Lk.* (141). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe inquilina *Nits.* (227). *In caulibus emortuis.*
Leptosphæria massarioides *Sacc. et Speg.* (246). *In caulibus putrescentibus superficie denigratis* (Mich. I p. 181).
Phyllachora Heraclei *Fuck.* (292). *In foliis* (F. V. V p. 181).

Sphæropsideæ.

Hendersonia Heraclei *Sacc.* (418). *In caulibus* (Mich. I p. 213).
Phoma complanata *Desm.* (381). *In caulibus emortuis.*
Rhabdospora (*Septoria*) Nebula *Sacc.* (438). *In caulibus* (Mich. I p. 193).
Septoria Heraclei *Desm.* (434). *In foliis* (Mich. I p. 192).

Hyphomyceteæ.

Acrotheca caulium *Sacc.* (504). *In caulibus putrescentibus.*
Ramularia Heraclei *Sacc.* (487). *In pagina inferiore foliorum.*

Melanconieæ.

Cylindrosporium Heraclei *Oud. In pag. inferiore* (F. V. V p. 186).

Daucus Carota *L.*

Discomyceteæ.

Heterosphæria Patella *Fr.* (350). *In caulibus exsiccatis* (M. S. p. 160).

Caucalis Anthriscus *B. et H.* (Torilis Anthriscus *Gm.*),

Pyrenomyceteæ.

Lophiostoma insidiosum *Ces et DNtrs.* (302). (Mich. I p. 447).
Sphærella leptasca *Awd.* (212). *In caulibus putrescentibus* (Mich. p. 381).

Laserpitium latifolium *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Aethusæ *Mart.* (*P. Umbelliferarum DC. e.*) (138). *In petiolis et foliis* (M. S. p. 80).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Laserpitii *Sacc.* (369). *In foliis* (Mich. I p. 145).

Umbellatæ variæ.

Phycomyceteæ.

Peronospora nivea *De Bary.* (151). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Didymella superflua *Sacc.* (217). *In caulibus emortuis.*
Erysiphe Martii *Lev.* (165). *In foliis.*
Erysiphe Umbelliferarum *De Bar.* (165). *In foliis.*
Leptosphæria modesta *Karst.* (246). *In caulibus.*
Leptosphæria rubicunda *Rehm.* (244). *In caulibus putrescentibus.*
Pyrenophora hispida *Sacc.* (272). *In caulibus emortuis.*
Sphærella leptasea *Auersw.* (212). *In caulibus putrescentibus.*

Hyphomyceteæ.

Oidium erysiphoides *Fr. var.* Umbelliferarum (470). *In foliis.*

Araliaceæ.

Hedera Helix *L.*

Pyrenomycetæ.

Aylographum vagum *Desm.* (305). *In foliis exsiccatis.*
Diaporthe pulla *Nke.* (225). *In ramis emortuis durioribus.* (M. S. p. 140).
Eutypa (*Valsa*) heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis* (Mich. I p. 19).
Eutypa lejoplaca *Cooke.* (181). *In ramis decorticatis.*
Hypoderma Hederæ *DNtrs.* (309). *In foliis dejectis.* (Mich. I p. 57).
Hypomyces rosellus *Tul.* (283). *In foliis putrescentibus* (M. S. p. 124).
Lophiotrema Hederæ *Fuck.* (297). *In ramis induratis* (Mich. II p. 255).
Metasphæria (*Sphæria*) Hederæ *Sow.* (261). *In pag. inferiore foliorum* (M. S. p. 96).
Metasphæria (*Leptosphæria*) Helicicola *Niessl.* (261). *In foliis putrescentibus* (F. V. II p. 313).

Nectria sinopica *Fr.* (283). (F. V. IV p. 23).

Discomyceteæ.

Trochila Craterium *Tul.* (357). *In foliis* (M. S. p. 161).

Myxomyceteæ.

Physarum didermoides *Rost.* (10). *In ramis, foliis, frustulis.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta maculans *Fuck. In foliis* (M. S. p. 194).
Camarosporium sarmenticium *Sacc.* (423). *In sarmentis corticatis.*
Coniothyrium Hederæ *Sacc.* (399). *In ramulis foliisque* (Mich. I p. 204).
Diplodia Hederæ *Fuck.* (405). *In caulibus dejectis* (M. S. p. 202).
Hendersonia sarmentorum *West.* (418). *In ramulis dejectis* (Mich. I p. 214).
Phoma cylindrospora *Sacc.* (379). *In foliis.*
Phoma leucostigma *Sacc. In foliis dejectis* (Mich. I p. 259).
Phoma pulla *Sacc.* (384). *In ramulis emortuis.*
Phyllosticta concentrica *Sacc.* (367). *In foliis languidis* (Mich. I p. 136). (F. V. V p. 203).
Phyllosticta hedericola *DR. et M.* (367). *In foliis languidis* (F. V. V p. 293).
Septoria Hederæ *Desm.* (424). *In foliis* (M. S. p. 197).
Sphæronæmella Mowgeotii *Fr.* (440). *In sarmentis.*
Vermicularia trichella *Fr.* (391). *In foliis* (M. S. p. 191).

Hyphomyceteæ.

Sporocybe byssoides *Bon.* (528). *In trunco putrescente* (F. V. V p. 196).
Sporotrichum incrustans *Sacc.* (475). *In foliis subemortuis* (Mich. II p. 553).
Trichothecium candidum *Wallr.* (484). *In foliis putrescentibus.*
Tubercularia vulgaris *Pers. var.* sarmentorum (532). *In sarmentis.*

Melanconieæ.

Glœosporium Helicis *Oud. In foliis* (Mich. II p. 540).
Glœosporium paradoxum *Fuck.* (450). *In foliis* (Mich. I p. 219).
Melanconium microspermum *Ness.* (455). *In ramis emortuis* (M. S. p 179).
Thyrsidium hedericolum *Dur. et Mont.* (456). *In ramulis.*

Cornaceæ.

Cornus sanguinea *L.*

Hymenomycetæ.

Cyphella albo-violascens *Fr.* (109). *Ad ramulos.*

Pyrenomyceteæ.

Antostomella limitata *Sacc.* (195). *In caulibus ramulisque tenuioribus* (F. V. IV p. 2).

Botryosphæria Berengeriana *DNtrs.* (207). *In cortice sub epidermide et raro supra epidermidem ramorum truncorunque tubercentium* (M. S. p. 116 F. V. IV p. 4).

Calosphæria minima *Tul.* (174). *In cortice ramorum emortuorum* (M. S. p. 149).

Chilonectria cucurbitula *Sacc.* (281). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. I p. 442).

Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc. In ramis* (Mich. I p. 21).

Diaporthe crassicollis *Nke.* (226). *In ramis* (M. S. p. 211).

Erysiphe tortilis *Lk.* (165). *In pag. inf. foliorum* (F. V. V p. 173).

Eutypa lacerata *Sacc.* (181). *In ramis et in ligno.*

Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). *In ramis* (Mich. I p. 15)

Fenestella Princeps *Tul. In ramis emortuis* (M. S. p. 127).

Leptosphæria Fiedlæri *Sacc. In ramulis* (Mich. I p. 39).

Leptosphæria platicarpa *Sacc.* (245). *Ad ramulos putrescentes.*

Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (245). *In ramulis* (F. V. II p. 318).

Linospora elata *Sacc. et Speg.* (279). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 405).

Lophiostoma oreophilum *Speg. In ramulis putrescentibus* (Mich. I p. 467).

Melanomma Pulvis-pyrius *Sacc.* (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).

Rosellinia protuberans *Karst.* (192). *In ligno putri, decorticato* I p. 371).

Sphæria Corni *Sow. In ramulis* (M. S. p. 210).

Sphæria Systema solare *Fuck. In foliis* (M. S. p. 210).

Valsa fallax *Nke.* (177). *In ramulis* (M. S. p. 133).

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In ramis* (Mich. I p. 32).

Discomyceteæ.

Calloria? pusilla *Speg. In foliis dejectis putrescentibus* (Mich. I p. 474).

Dimerosporium pulchrum *Sacc.* (166). *In foliis languentibus* (Mich. II p. 299).

Helotium macrosporum *Sacc.* (329). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 535).

Sphæropsideæ.

Ascochyta cornicola *Sacc.* (415). *In foliis* (Mich. I p. 169).

Coniothyrium vagabundum *Sacc.* (399). *In ramis* (F. V. V p. 200).

Diplodia mammillana *Fr.* (405). *In ramis* (M. S. p. 201).

Hendersonia Fiedleri *West.* (418). *In ramulis* (Mich. I p. 212).

Phyllosticta cornicola *Rabh.* (371). *In foliis* (Mich. I p. 148).

Septoria cornicola *Kichx.* (426). *In foliis languidis* (F. V. V p. 204).

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicola *Sacc.* *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Ramularia angustissima *Sacc.* (486). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 548).

Melanconieæ.

Marsonia angustata *Pers.* (457). *In ramis dejectis.*

Pestalozzia Veneta *Sacc.* (458). *In ramis corticatis.*

Cornus mas *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Corni maris *Sacc.* (426). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 178).

Cornus alba *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Corni *Fuck.* (233). *In ramulis corticatis* (Mich I p. 29).

Cornus

Hymenomyceteæ.

Cyphella albo-violascens (109). *Ad ramulos* (M. S. p. 161).

Pyrenomyceteæ.

Cryptovalsa Nitschkei *Fuck.* (183). *In ramis corticatis.*

Diatrypella aspera *Nits.* (185). *In ramis.*

Eutypa lata *Tul.* (181). *In ligno et cortice.*

Lophidium compressum *Sacc.* (302). *In ligno.*
Lophiotrema crenatum *Sacc.* (298). *In ramis.*
Phyllactinia suffulta *Sacc.* (163). *In foliis vivis.*
Physalospora (*Botryosphæria*) Corni *Sacc.* (206). (F. V. V p. 4).
Physalospora gregaria *Sacc.* (205). *In ramis corticatis.*
Rosellinia Desmazierii *Sacc.* (192). *Ad basim truncorum.*

Sphæropsideæ.

Dothiorella gregaria *Sacc.* (392). *In ramis corticatis.*
Septoria cornicola *Kichx.* (426). *In ramulis* (Mich. I p. 178).

Hyphomyceteæ.

Graphium Desmazieri. *Sacc.* (529). *In truncis putrescentibus.*
Macrosporium Sarcinula *Berck.* *In foliis* (M. S. p. 182).

Aucuba japonica *Thunb.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Aucubæ *Sacc.* *In ramis emortuis* (Mich. I p. 390).
Diaporthe Ophites *Sacc.* (233). *In ramis* (F. V. IV p. 13).
Physalospora (*Botryosphæria*) pustulata *Sacc.* (205). *In ramis ramulisque* (F. V. IV p. 3).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Aucubæ *Sacc. et Speg.* (414). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 167).
Coniothyrium Aucubæ *Sacc.* (399). *In ramis ramulisque.*
Diplodia aucubicola *Sacc.* (404). *In ramulis.*
Phyllosticta Aucubæ *Sacc. et Speg.* (373). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 153).
Phyllosticta aucubicola *Sacc.* (365). *In foliis languidis* (Mich. II p. 276).
Phoma Aucubæ *West.* (284). *In ramis* (F. V. V p. 201).

Rubiaceæ.

Galium verum *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Valantiæ *Pers.* (*P. heterochroa Desm.*) (136). *In foliis* (F. V. V p. 168).

Galium sylvatium *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Galiorum *Link.* (141). *In foliis* (M. S. p. 207).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphæria Galiorum *Sacc. In caule* (M. S. p. 210).

Anthostomella Italica *Sacc. et Speg.* (195). *In caulibus putrescentibus* (Mich. I p. 439).

Anthostomella Tomicoidos *Sacc.* (195). *Ad caules putrescentes* (F. V. IV p. 1).

Diaporthe mazzantioides *Sacc. et Speg.* (234). *In caule* (Mich. I p. 385).

Leptosphæria Galiorum *Ces. et DNtrs.* (244). *In caulibus dejectis* (M. S. p. 104).

Lophiotrema (*Lophiostoma*) alpigenum *Fuck.* (299). *In caule putrescente* (Mich. I p. 448).

Mazzantia Galii *Mtgn.* (291). *In caulibus putrescentibus* (Mich. I p. 52).

Sphærella minor *Karst.* (212). *In caulibus putrescentibus* (Mich. I p. 381).

Melanconieæ.

Pestalozzia herbicola *Sacc.* (460). *In foliis exsiccatis.*

Galium Aparine *Mœnch.*

Phycomyceteæ.

Peronospora calotheca *De Bary. var.* Aparines *De Bary.* (153). *In foliis.*

Galium Mollugo *L*

Hypodermeæ.

Melampsora Galii *Wint.* (*M. guttata Schröt.*) (147). *In pag. inf. foliorum* (F. V. V p. 168).

Hyphomyceteæ.

Peronospora calotheca *D. By.* (153). *In foliis* (F. V. V p. 172).

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria Galiicola *Sacc.* (241). *Ad caules dejectos putrescentes* (M. S. p. 104).

Galium

Pyrenomyceteæ.

Didymosphæria Galiorum *Fuck.* (237). *In caulibus.*
Lophiostoma caulium *Ces. et DNtrs.* (301). *In caulibus exsiccatis.*
Pleospora media *Niessl.* (269). *In caulibus emortuis.*

Sphæropsideæ.

Hendersonia pulchella *Sacc.* (417). (Mich. I p. 213).
Phoma herbarum *West.* (380). *In caulibus.*
Placosphæria Galii *Sacc.* (393). *In caulibus.*

Coffea arabica *L.*

Hymenomyceteæ.

Clitocybe (*Agaricus*) neapolitana *Pers.*). (42). *In sedimento decocti coffeici* (Mich. I p. 546).

Caprifoliaceæ.

Sambucus Ebulus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Didymella effusa *Sacc.* (216) *In caulibus emortuis.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta Ebuli *Fuck. In foliis.* (M. S. p. 194).
Septoria Ebuli *Rob. et Desm In foliis.*

Sambucus nigra *L.*

Hymenomyceteæ.

Corticium Sambuci *Fr.* (115) *In caudicibus putrescentibus* (M. S. p. 64).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe circumscripta *Otth.* (232). (Mich. I p. 29).
Diaporthe spiculosa *Nke.* (225). (F. V. IV p. 12).
Dothidea Sambuci *Fr.* (291). *In ramis emortuis* (F. V. V p. 182).

Eutypa (*Valsa*) heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis corticatis* (M. S. p. 129).

Eutypa (*Valsa*) lata *Nke.* (181). *In truncis ramisque, decorticatis in ipso cortice* (M S. p. 128).

Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). *In ramis* (Mich. I p. 15).

Gibberella (*Botryosphæria*) pulicaris *DNtrs.* subsp. typica. (288). *In ramis corticatis emortuis* (M. S. p. 118. F. V. IV p. 5).

Herpotrichia Schledermayeriana *Fuck.* (266). *In ima basi putrescente ramorum subradicalium* (F. V. II p. 326).

Leptosphæria Coniothyrium *Sacc.* (244). (F. V. II p. 317).

Leptosphæria rubicunda *Rehm.* (244). *In ramulis hornotinis superficie dilute cruentatis* (F. V. II p. 315).

Lophiostoma (*Leptosphæria*) Sambuci *Sacc.* (301) *Sub epidermide ramulorum hornotinorum* (M. S. p. 104).

Melanomma fuscidulum *Sacc.* (254). *In trunco ramisque* (Mich. I p. 450).

Phomatospora Berkeleyi *Sacc.* (205) *In ramulis hornotinis* (F. V. II p. 306).

Sordaria leucotricha *Speg.* (189). *In ramulis putridis* (Mich. I p. 225).

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In ramis* (Mich. I p. 32).

Sphæropsideæ.

Aposphæria (*Phoma*) fuscidula *Sacc.* (387). *In ramis decorticatis* (Mich. I p. 271).

Ascochyta Sambuci *Sacc.* (415). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 168).

Dichomera (*Hendersonia*) Saubinetii *Mtgn.* (423). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 209).

Diplodia sambucina *Sacc.* (404). *In ramulis hornotinis* (Mich. II p. 268).

Hendersonia pulchella *Sacc.* (417). *In ramis* (Mich. I p. 213).

Hendersonia Sambuci *Müll.* (418). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 213).

Phoma Sambucella *Sacc.* (303). *In ramis emortuis.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora depazeoides *Sacc.* (520). *In foliis languidis* (F. V. V p. 187).

Cercospora penicillata *Fres.* *In foliis* (M. S. p. 181).

Coniosporium melanconideum *Sacc.* (498). *In ligno ramisque decorticatis* (Mich. II p. 293).

Fusarium pyrochroum *Sacc.* (536). *In ramulis* (Mich. II p. 295).

Ramularia sambucina *Sacc.* (486). *In foliis* (Mich. II p. 551).

Tubercularia Sambuci *Cda.* (532). *In ramis* (F. V. V p. 197).

Sambucus racemosa *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe spiculosa *Nits.* (225). *In ramis emortuis.*
Gibberella pulicaris *Sacc.* (288). *In ramis corticatis.*
Rosellinia ambigua *Sacc.* (193). *In ramis emortuis* (F. V. II p. 328).

Sambucus

Hymenomyceteæ.

Auricularia sambucina *Mart.* (111). *Ad truncos* (M. S p. 65).

Pyrenomyceteæ.

Didymosphæria epidermidis *Fuck.* (236). *In ramis corticatis.*
Fenestella vestita *Sacc.* (276). *In ramis corticatis emortuis.*
Hypoderma commune *Duby.* (310) *In caulibus.*
Melanomma pulvis-pyrius *Fuck.* (253). *In ligno.*
Sordaria lanuginosa *Sacc.* (189). *In caulibus ramisque putridis* Mich. I p. 225-226).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium fuscidulum *Sacc. In ramis decorticatis* (Mich. I p. 205).

Hyphomyceteæ.

Arthrobotryum atrum *B. et Br. A. majus Sacc.* (530). *In ramis decorticatis* (Mich. II p. 555).

Viburnum Tinus *L.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta Tini *Sacc.* (416). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 170),
Diplodia Tini *Sacc.* (408). *In foliis* (Mich. II p. 269).
Camarosporium *(Hendersonia)* Tini *Sacc.* (423). *In foliis languidis* (Mich. I p. 209).
Phyllosticta tinea *Sacc.* (365). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 135).

Hyphomyceteæ.

Cercospora tinea *Sacc.* (519). *In foliis languidis* (Mich. I p. 268).

Melanconieæ.

Glœosporium tineum *Sacc.* (450). *In foliis* (Mich. I p. 219).

Viburnum Lantana *L.*

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella limitata *Sacc.* (195). *In caulibus ramulisque tenuioribus* (F. V. IV p. 2).

Hysterographium Fraxini *De Not.* (309). *In ramis.*

Leptosphæria (*Sphæria*) fuscella (*Berk. et Br.* (245). *In ramis* (M. S. p. 97).

Microsphæra Hedwigii *Lév.* (164). *In foliis* (F. V. V. p. 173).

Valsa Viburni *Fuck. In ramulis* (Mich. II p. 159).

Discomyceteæ.

Helotium collinum *Speg.* (331). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 473).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Lantanæ *Sacc.* (412). *In foliis* (Mich. I p. 162).

Diplodia Lantanæ *Fuck.* (403). *In ramulis* (M. S. p. 201).

Septoria (*Ascochyta*) Viburni *Lasch.* (425). *In foliis* (M. S. p. 194).

Viburnum Opulus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Botryosphæria Bérengeriana *DNtrs.* (207). *In cortice sub epidermide* (M. S p. 116).

Diaporthe Beckhausii *Nke.* (227). (F. V. V. p. 12).

Fenestella vestita *Sacc.* (*Cucurbitaria vagans Sacc.*) (276). *In ramis emortuis putrescentibus* (M. S. p. 122).

Gibberella baccata *Sacc.* (288). *In ramis corticatis decorticatisque* (F. V. IV p. 5).

Lophiotrema crenatum *Sacc.* (298). *In ramis.*

Leptosphæria vagabunda (*Sphæria fuscella Berk. et Br.*) (245). *In ramis* (M. S. p. 97).

Ostropa cinerea *Fr.* (312). *In ramis exsiccatis.*

Sphæropsideæ.

Asteroma vagans *Desm.* (389). *In foliis languidis.*

Phyllosticta Opuli *Sacc.* (370). *In foliis* (Mich. I p. 146).

Septoria Viburni *West.* (425). *In foliis* (M. S. p. 197).

Hyphomyceteæ.

Cercospora depazeoides *Sacc.* (520). *In foliis.*
Cercospora penicillata *Fres. In foliis* (M. S p. 181).

Lonicera Caprifolium *L.*

Pyrenomyceteæ.

Aylographum sarmentorum *DNtrs. In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 54).
Diaporthe cryptica *Nits.* (226). *In sarmentis emortuis.*
Fracchiæa heterogenea *Sacc.* (173). *In ramis corticatis decorticatisque exsiccatis* (M. S. p. 115).
Metasphæria corticola *Sacc.* (261). *In ramulis corticatis.*
Microsphæra Dubyi *Lév.* (164). *In foliis* (Mich. I p. 14).
Sphærella Climenia *Sacc.* (210). *In foliis* (Mich. I p. 35).
Teichospora ignavis *Karst.* (273). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 47).

Sphæropsideæ.

Depazea Caprifolii *Opiz. In foliis* (M. S. p. 193).
Diplodia Loniceræ *Fuck.* (404). *In ramis putrescentibus* (F. V. V p. 208).
Phoma cryptica *Sacc.* (383). *In sarmentis emortuis.*
Phyllosticta Caprifolii *Sacc* (367). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 137).
Rhabdospora (*Septoria*) Caprifolii *Sacc.* (437). *In sarmentis nondum emortuis* (Mich. I p. 174).

Melanconieæ.

Pestalozzia funerea *Desm.* (459). *var.* crassipes. *In ramulis emortuis.*

Lonicera Periclymenum. *L.*

Pyrenomyceteæ.

Lasiobotrys Loniceræ *Kze.* (166). *In foliis languidis.*

Lonicera Xylosteum. *L.*

Hypodermeæ.

Accidium Xilostei *Wallr.* (*Æc. Periclymeni Schum.*) (149). *In foliis* (F. V. V p. 171).

Pyrenomyceteæ.

Anthostoma Xylostei *DNtrs.* (196). *In truncis emortuis putrescentibus* (M. S. p. 112).
Capnodium Loniceræ *Fuck.* (169). *In ramulis.*
Diaporthe cryptica *Nits.* (226). *In sarmentis emortuis.*
Dimerosporium pulchrum *Sacc.* (166). (F. V. II p. 299).
Eutypa aspera *Fuck.* (180). *In ramis.*
Lasiobotrys Loniceræ *Kze.* (166) *In foliis languidis.*
Robergea unica *Desm.* (312). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 252).
Sphærella collina *Sacc. et Speg. In foliis emortuis* (Mich. I p. p. 379).

Sphæropsideæ.

Camarosporium (*Hendersonia*) polymorphum *Sacc.* (122). *In ramis* (Mich. I p. 208).
Coniothyrium olivaceum *Bon. In ramulis* (Mich. I p. 205).
Hendersonia pulchella *Sacc.* (117). (Mich. I p. 213).
Phyllosticta vulgaris *Desm. In foliis* (M. S. p. 195).

Hyphomyceteæ.

Dendryphium toruloides *Sacc.* (517). *In ramulis* (F. V. V p. 191).
Dendryphium curtum *B. et Br.* (517). *ramosius. *In lignis putridis ramisque* (Mich. II p. 291).

Lonicera nigra *L.*

Pyrenomyceteæ.

Anthostoma alpigenum *Sacc.* (196). *In ramis ramulisque corticatis* (F. V. IV p. 18).
Eutypa aspera *Fuck.* (180). *In ramis.*
Lasiobotrys Loniceræ *Kze.* (166). *In utraque pag. foliorum languidorum* (Mich. I p. 366).

Discomyceteæ.

Lachnella barbata *Fr.* (326). *In ramis emortuis* (F. V. IV p. 30).

Lonicera alpigena *L.*

Melanconieæ.

Helminthosporium apiculatum *Corda. In ramis* (Mich. II. p. 173).

Lonicera sempervirens *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe cryptica *Nke.* (226). *In ramis provectioribus emortuis* (M. S. p. 141).

Didymosphæria Loniceræ *Sacc.* (236). *Sub cortice dejecto trunci* (M. S. p. 113).

Didymosphæria epidermidis *Fuck.* (236). (F. V. II p. 323).

Lophiotrema (*Lophiostoma*) alpigenum *Fuck.* (299). *In trunco* (M. S. p. 111).

Lonicera

Pyrenomycetæ.

Dothidea (*Diaporthe*) Sambuci *Fr.* (294). *In ramis* (Mich. I p. 441).

Leptosphæria dumetorum *Niessl.* (244). *In caulibus exsiccatis.*

Melomastia Friesii *Nits.* (266). *In ramis truncisque denudatis.*

Sphæropsideæ.

Leptothyrium pictum *B. et Br.* (442). *In foliis.*

Weigelia rosea *Lindl.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta Weigeliæ *Sacc.* (415). *In foliis* (Mich. I p. 170).

Phoma Weigeliæ *Speg.* (377). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 481)

Phyllosticta Weigeliæ *Sacc. et Speg.* (367). *In foliis* (Mich. I p. 139).

Hyphomyceteæ.

Ramularia Weigeliæ *Speg.* (486). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 475).

Leycesteria formosa *Wall.*

Sphæropsideæ.

Septoria Leycesteriæ (426). *In foliis.*

Valerianaceæ.

Valeriana officinalis *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Valerianæ *Carest. et Ces.* (139). *In foliis languidis* (Mich. I p. 9).

Uromyces Valerianæ *Fuck.* (134). *In foliis* (M. S. p. 208).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Valerianæ *Fuck.* (235). (F. V. IV p. 12).
Leptosphæria Agnita *Ces. et DNtrs.* (246). *In caulibus putrescentibus* (F. V. II p. 316).
Sphærella Galatea *Sacc.* (213). *In caulibus aridis* (F. V. II p. 304).

Melanconieæ.

Cylindrosporium Valerianæ *Speg. In hypophyllo* (Mich. I p. 475).

Hyphomycetæ.

Ramularia Valerianæ *Sacc.* (187) *In pag. inf. foliorum.*

Valeriana tripteris *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Valerianæ (134) *In foliis.*

Centranthus ruber *D. C.*

Hymenomycetæ.

Cyphella Capula *Fr.* (109). *In caule* (Mich. I p. 437).

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria galiicola *Sacc. var.* brachyspora (244). *In caulibus.*

Dipsaceæ.

Dipsacus sylvestris *Mill.*

Phycomycetæ.

Peronospora Dipsaci *Tul.* (154). *In foliis* (Mich. I p. 243).

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria bractearum *Sacc.* (249). *In bracteis capitulorum.*
Leptosphæria carpophila *Sacc.* (249). *In bracteis capitulorum* (Mich. I p. 397).
Pleospora vulgaris *Niess.* (269). *In caulibus emortuis.*

Scabiosa arvensis *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria scabiosicola *Desm.* (428). *In foliis* (M. S. p. 195).

Scabiosa sylvatica *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sphærella sylvatica *Sacc. et Speg.* (211). *In foliis emortuis* (Mich. I p. 380).

Scabiosa Succisa *L.* (Succisa pratensis *Much.*).

Hypodermeæ.

Aecidium Scabiosæ *Dozy et M.* (149). *In foliis.*
Puccinia Succisæ *K. et S. In foliis* (M. S. p 207).

Phycomyceteæ.

Synchytrium Taraxaci *var.* Succisæ *De Bary.* (160). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria modesta *Karst.* (246). *In caulibus.*

Sphæropsideæ.

Septoria scabiosicola (*Depazea succisicola Opiz.*). (428). *In foliis* (M. S. p. 193).
Septoria succisicola *Sacc.* (434). *In pag. sup. foliorum nondum emortuorum* (Mich. I p. 191).

Scabiosa Succisa *L.* (Succisa pratensis *Much.*).

Hyphomyceteæ.

Ramularia Succisæ *Sacc.* (487). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 551).

Scabiosa graminifolia *L.*

Pyrenomyceteæ.

Pleospora media *Niessl.* (269). *In caulibus* (Mich. I p. 48).

Sphæropsideæ.

Rhabdospora (*Septoria*) caulicola *Sacc.* (439). *In caulibus languidis* (Mich. I p. 193).

Dipsaceæ variæ

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe communis (165). *In foliis.*

Compositæ.

Epatorium cannabinum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Hypoderma commune *Duby.* (310). *In caulibus.*
Heptameria (*Leptosphæria*) obesa *Sacc.* (252). *In caule* (Mich. I p. 38).
Leptosphæria agnita *Ces. et DNtrs.* (246). *In caulibus exsiccatis.*
Ophiobolus vulgaris *Sacc.* (277). *In caulibus.*

Discomyceteæ.

Mollisia (*Niptera*) cinerea *Fuck.* (334). *In caulibus* (Mich. I p. 424).

Sphæropsideæ.

Septoria Eupatorii *Rob. In foliis languidis* (F. V. V. p. 205).

Hyphomyceteæ.

Cercospora crassa *Sacc.* *Eupatorii (521). *In foliis* (Mich. II p. 557).

Adenostyles alpina *B. et F.*

Hypodermeæ.

Coleosporium Sonchi arvensis (*C. Cacaliæ Fuck.*) (148). *Ad folia viva* (Mich. II p. 155).
Uromyces Cacaliæ *Lév.* (133). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 156).

Adenostyles albifrons *Reich.*

Hyphomyceteæ.

Ramularia filaris *Fres.* (188). *In pag. inferiore* (F. V. V. p. 186).

Homogyne alpina *Cass.*

Hyphomyceteæ.

Ramularia cervina *Speg.* (188). *Ad folia viva v. languida* (Mich. II. p. 170).

Petasites officinalis *Mœnch.*

Hypodermeæ.

Coleosporium Sonchi arvensis *(C. Petasitidis DBy.) In pag. inferiore foliorum* (F. V. V p. 168).

Petasites niveus *Baum.*

Hypodermeæ.

Coleosporium Sonchi arvensis (*C. Petasitidis de By.*) (148). *In foliis* (Mich. I p. 11).

Petasites albus *Gærtn.*

Hypodermeæ.

Aecidium Compositarum *Mart.* (149). *In foliis.*

Tussilago Farfara *L.*

Hypodermeæ.

Aecidium Tussilaginis *Sacc.* (149). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 242).
Cæoma Tussilaginis *Lév. In foliis* (M. S. p. 242).
Coleosporium Sonchi arvensis (148). *In foliis.*

Pyrenomycetæ.

Capnodium elongatum *Berk. et Desm.* (169). *In foliis* (Mich. I p. 50).
Sphærella Pieris *Sacc. In pag. superiore foliorum languentium* (F. V. II p. 302).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Farfaræ *Sacc.* (369). *In foliis* (Mich. I p. 144).
Septoria Fuckelii *Sacc.* (433). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 190).

Hyphomyceteæ.

Fusarium incarnatum *Desm.* (539) *In foliis emortuis* (Mich. II p. 296).
Tuberculina (*Tubercularia*) vinosa *Sacc.* (533). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 262).

Solidago Virga-aurea *L.*

Pyrenomyceteæ.

Didymosphæria conoidea *Niessl.* (236). *In caulibus exsiccatis.*
Leptosphæria modesta *Karst.* (246). *In caulibus.*

Sphæropsideæ.

Septoria Virgureæ *Desm.* (431). *In foliis languidis* (F. V. V p. 207).

Hyphomyceteæ.

Cercospora fulvescens *Sacc.* (519). *In foliis vivis* (F. V. V p. 189).

Erigeron canadensis *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora entospora *B. et Br.* (155). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Ophiobolus pellitus *Sacc.* (278). *In caulibus exsiccatis.*
Leptosphæria ogilviensis *De Not.* (245). *In caulibus.*

Hyphomyceteæ.

Cercosporella (*Cercospora*) cana *Sacc.* (499). *In foliis languidis* (F. V. V p. 188).

Aster Novi-Belgii *Nees.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe orthoceras *Nits.* (228). *In caulibus emortuis.*
Leptosphæria ogilviensis *De Not.* (245). *In caulibus.*
Lophiostoma insidiosum *Ces. et DNtrs.* (302). *In caulibus* (Mich. I p. 447).
Lophiostoma Niessleanum *Sacc.* (302). *In caulibus putrescentibus* (Mich. I p. 448).

Tagetes hortenses.

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe indica *Sacc. et Speg.* (228). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 391).

Bellis perennis *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria bellidicola *Rob. et Desm.* (428). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 182).

Hyphomyceteæ.

Ramularia Bellidis *Sacc.* (488). *Amphigena In foliis* (Mich. II p. 548).

Stenactis annua *Ness.*

Pyrenomyceteæ.

Didymella (*Didymosphæria*) exigua *Niessl.* (216). *In caulibus* (Mich. I p. 376).

Senecio vulgaris *L.*

Hypodermeæ.

Coleosporium (*Cæoma*) Senecionis *Fr.* (148). *In hypophyllo* (M. S. p. 76).

Phycomyceteæ.

Peronospora gangliformis *Berk.* (152). *In foliis* (F. V. V. p. 171).

Hyphomyceteæ.

Ramularia macrospora *Fr.* *Senecionis *Sacc.* (488). *In hypophyllo* (Mich. II p. 549).

Senecio Jacobæa *L.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Jacobeæ *Sacc.* (371). *In foliis* (Mich. I p. 149).

Hyphomyceteæ.

Ramularia pruinosa *Speg.* (488). *Ad folia* (Mich. II p. 170).

Senecio præaltus *Bert.*

Sphæropsideæ.

Septoria anaxea *Sacc.* (433) *In pag. inferiore foliorum* (Mich. I p. 190).

Senecio Doronicum *L.*

Hypodermeæ.

Coleosporium Sonchi arvensis *Wint.* (*C. Senecionum Fuch.*) *In foliis* (Mich. I p. 10).

Senecio nemorensis *L.*

Hypodermeæ.

Coleosporium Sonchi arvensis *Wint.* (*C. senecionum Fuck.*) (148). *In foliis* (M. S. p. 207).

Pyrenomyceteæ.

Lophiotrema (*Lophiostoma*) vagabundum *Sacc.* (299). *In caulibus* (Mich. I p. 447).

Discomyceteæ.

Helotium herbarum *Fr.* *In caule putrescente* (F. V. IV p. 37).
Helotidium (*Helotium*) nanum *Sacc.* (333). *In caule* (F. V. IV p. 36).
Mollisia (*Pyrenopeziza*) lugubris *Sacc.* (337). *In caulium putrescentium basi* (F. V. V p. 33).

Sphæropsideæ.

Septoria Senecionis *West.* (128). *In foliis* (M. S. p. 197).

Senecio cordatus *Koch.*

Pyrenomyceteæ.

Sphærella subalpina *Sacc.* (215). *In foliis nondum emortuis* (Mich. II p. 247).

Senecio

Hypodermeæ.

Coleosporium Senecionis *Fuck.* (148). *In foliis* (Mich. I p. 10).
Puccinia conglomerata *Wint.* (*P. Senecionis Lib.*) (139). *In petiolis foliisque vivis* (F. V. V p. 169).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe orthoceras *Nits.* (228). *In caulibus emortuis.*

Leptosphæria Doliolum *Ces. et DNtrs.* (243). *In caulibus* (F. V. II p. 314).
Leptosphæria ogilviensis *De Not.* (245). *In caulibus.*

Sphæropsideæ.

Leptothyrium vulgare *Sacc.* (442). *In caulibus emortuis.*
Phoma Achilleæ *Sacc.* (386). *In caulibus emortuis.*

Hyphomyceteæ.

Ramularia Coleospori *Sacc.* (489). *Ad folia* (Mich. II p. 170).

Aronicum scorpioides *Koch.*

Hyphomyceteæ.

Fusicladium Aronici *Sacc.* (510). *In pag. inf. foliorum vivorum* (Mich. II p. 171).

Arnica montana *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sphærella Arnicæ *Speg.* (212). *In foliis* (Mich. II p. 247).

Leucanthemum vulgare *Lam.* (Chrysanthemum Leucanthemum *L.*).

Hypodermeæ.

Aecidium Leucanthemi *DC.* (149). *In foliis* (Mich. I p. 242).

Sphæropsideæ.

Septoria Leucanthemi *Sacc. et Speg.* (434). *In foliis* (Mich. I p. 191).
Phyllosticta Leucanthemi *Speg.* (368). *In foliis* (Mich. II p. 277).

Pyretrum corymbosum *W.*

Hypodermeæ.

Puccinia Tanaceti *DC. In foliis* (F. V. V p. 169).

Pyretrum Parthenium *Smih.* (Chrysanthemum Parthenium *L.*).

Hyphomyceteæ.

Ramularia Bellunensis *Speg.* (488). *Ad folia et caules* (Mich. I p. p. 475).

Achillea Millefolium *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Asteris *Duby.* (*P. Millefolii Fuck.*) (136). *In foliis* (F. V. V p. 169).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe orthoceras *Nits.* (228). *In caulibus emortuis.*
Lophiostoma simillimum *Karst.* (*Leptosphæria Achilleæ Ces. et DNtrs.*) (302). *In caulibus exsiccatis* (M. S. p. 104).

Sphæropsideæ.

Phoma Achilleæ *Sacc.* (386). *In caulibus emortuis.*

Tanacetum vulgare *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Tanaceti *DC.* (141). *In foliis* (F. V. V p. 169).

Tanacetum Balsamita *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Balsamitæ *Rabh.* (138). *In foliis caulibusque* (M. S. p. p. 207).

Arthemisia camphorata *Vill.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe oblita *Sacc. et Speg.* (235). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 386).
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).
Gloniella minima *Sacc.* (307). *In ramulis exsiccatis.*
Lophiosphæra (*Lophiostoma*) anaxea *Sacc.* (297). *In caule ramisque* (Mich. I p. 446).

Artemisia Absinthium *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Artemisiarum *Duby.* (138). *In foliis* (F. V. V p. 169).
Puccinia Tanaceti *DC.* (141). *In foliis.*

Artemisia vulgaris *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Artemisiarum *Duby.* (138). *In foliis* (F. V. V p. 169).
Puccinia Tanaceti *DC.* (141). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe Linkii *Lév.* (164). *In foliis* (M. S. p. 209).
Leptosphæria dumetorum *Niessl.* (244). *In caule ramisque* (F. V. p. 316).

Discomyceteæ.

Helotium Scutula *Karst.* (332). *In caulibus exsiccatis.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora ferruginea *Fuck.* (521). *In pag. inf. foliorum* (M. S. p. 180).

Artemisia

Pyrenomyceteæ.

Didymosphæria brunneola *Niessl.* (236). *In caulibus exsiccatis.*
Dothidea tetraspora *B. et Br.* (294). *In ramis emortuis.*
Dothidea lichenicola *Mass. In caulibus* (Mich. I p. 53).
Hypoderma commune *Duby.* (310). *In caulibus.*
Leptosphæria dumetorum *Niessl.* (244). *In caulibus exsiccatis.*
Melomastia Friesii *Nits.* (276). *In ramis truncisque denudatis.*
Pyrenophora hispida *Sacc.* (272). *In caulibus emortuis.*

Discomyceteæ.

Helotium herbarum *Fr.* (331). *In caulibus putrescentibus.*

Helianthus annuus *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Tanaceti *DC.* (*P. Helianthi Schw.*) (141). *In foliis nondum emortuis* (Mich. II p. 562).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe orthoceras *Nke.* (228). *In ramis deiectis putrescentibus* (M. S. p. 142).

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria dumetorum *Niessl.* (244). *In caulibus exsiccatis.*
Sordaria lanuginosa *Sacc.* (189). *In caulibus ramisque putridis* (Mich. I p. 225).

Hyphomyceteæ.

Fusarium roseum *Link.* (537). *In caule* (Mich. II p. 295).

Bidens tripartita *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria ogilviensis *Ces. et De Not.* (245). *In caulibus.*

Sphæropsideæ.

Septoria Bidentis *Sacc.* (129). *In foliis languentibus* (F. V. V p. 205).

Xanthium strumarium *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Xanthii *Desm.*. *In foliis languidis* (F. V. V p. 206).

Xanthium

Pyrenomyceteæ.

Ophiobolus (*Raphidospora*) Xanthii *Ces. et DNtrs. In caulibus emortuis* (M. S. p. 102).

Sphæropsideæ.

Septoria Xanthii *Desm* (Mich. I p. 192).

Inula hirta *L.*

Hypodermeæ.

Cæoma Inulæ *Fuck. In foliis* (Mich. I p. 76).

Inula salicina *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Inulæ *Sacc. et Speg.* (433). *In foliis* (Mich. I p. 190).

Inula crithmoides *L.*

Pyrenomycetæ.

Leptosphæria helminthospora *DNtrs.* (245). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 396).

Pulicaria dysenterica *Gaertn.* (Inula dysenterica *L.*)

Hypodermeæ.

Accidium zonale *Tul.* (135). *In foliis.*

Hyphomyceteæ.

Ovularia Inulæ *Sacc.* (479). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 547).

Buphtalmum salicifolium *L.*

Hypodermeæ.

Accidium zonale *Tul.* (135). *In foliis.*

Calendula officinalis *L.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora Calendulæ *Sacc.* (519). *In foliis languidis* (Mich. I p. 267).

Arctium minus *Schk.* (Lappa minor *DC.*).

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe Montagnei *Lév.* (165). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 366).
Lophiostoma insidiosum *Ces. et DNtrs* (302). (Mich. I p. 447).
Ophiobolus (*Rhaphidospora*) Bardanæ *Fuck.* (275) *In caulibus* (M. S. p. 102).

Sphæropsideæ.

Diplodia herbarum *Lév.* (410). *In caulibus* (M. S. p. 202).
Phyllosticta Lappæ *Sacc.* (372). *In foliis* (Mich. I p. 151).
Septoria Lapparum *Sacc.* (430) *In foliis* (Mich. I p. 184).

Arctium majus *Schk* (Arctium Lappa *L.*).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Arctii *Nke.* (228). (Mich. I p. 388).

Lappa

Hypodermeæ.

Puccinia flosculosarum *Wint.* (*P. Bardanæ Cda.*) (140). *In foliis* (M S. P. 207).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Arctii *Nke.* (228). *In caulibus* (M. S. p. 211).
Leptosphæria Galiicola *Sacc.* (244). *In caulibus* (F. V. V p. 315).
Phomatospora Berkeleyi *Sacc.* (205). *In caulibus putrescentibus* (F. V. II p. 306).
Pleospora vulgaris *Nits.* (269). *In caulibus emortuis.*

Discomyceteæ.

Helotium (*Peziza*) caulicola *Fr.* (333). *In caulibus* (F. V. IV p. 34).

Sphæropsideæ.

Phoma immersa *Sacc.* (386). *In caulibus.*

Carlina acaulis *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria anthophila *Sacc. et Speg.* (249). *In inf. parte anthodii secedentis putrescentis* (Mich. I p. 396).

Discomyceteæ.

Helotium robustius *Karst. In anthodii putrescentis parte inferiore* (Mich. II p. 261).

Carlina vulgaris *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Tanaceti *DC.* (141). *In foliis* (Mich. I p. 9).

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella Tomicoides *Sacc.* (195). *Ad caulem putrescentem* (F. V. IV p. 1).
Diaporthe perexigua *Sacc.* (228). *In caulibus* (F. V. IV p. 11).
Venturia montellica *Sacc.* (220). *In foliis putrescentibus* (F. V. IV p. 2).

Dysconyceteæ.

Mollisia (*Niptera*) nemophila *Sacc.* (335). *In foliis putrescentibus* (F. V. IV p. 32).

Sphæropsideæ.

Phoma perexigua *Sacc.* (385). *In caule* (F. V. V p. 201).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Carlinæ *Sacc.* (521). *In pag inf. foliorum* (Mich. I p. 269).

Serratula tinctoria *L.*

Hyphomyceteæ.

Ovularia Serratulæ *Sacc.* (478). *In pag inf. foliorum* (Mich. II p. 547).

Centaurea nigrescens *W.*

Hypodermeæ.

Puccinia flosculosarum *Wint.* (*Aecidium Centaureæ DC*). (140). *In foliis* (Mich. I p. 241).

Pyrenomyceteæ.

Lophiotrema (*Lophiostoma*) vagabundum *Sacc.* (299). *In caulibus* (Mich. I p. 447).

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicola *Sacc.* *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Centaurea Cyanus *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia flosculosarum *Wint.* (*P. Centaureæ Fuck.*) (140). *In foliis* (M. S. p. 80).
Puccinia suaveolens *Schröt.* (*P. Cyanii Pass.*) (138). *In caule foliisque* (F. V. V p. 169).

Centaurea montana *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia flosculosarum *Wint.* (*P. Centaureæ DC.* (140). *In foliis* (M. S. p. 80).

Centaurea Scabiosa *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Arctii *Nke.* (228). *In caulibus* (Mich. I. p. 388).
Pleospora media *Niessl.* (269). *In caulibus* (Mich. I p. 48).

Sphæropsideæ.

Phoma endorhodia *Sacc.* (381). *In caulibus emortuis* (Mich. II p. 275).

Centaurea.

Phycomyceteæ.

Peronospora gangliformis *De Bary.* (152). *In foliis.*
Cystopus cubicus *De Bary. In foliis.*

Carduus

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Arctii *Nits.* (278). *In caulibus emortuis.*
Ophiobolus acuminatus *Duby.* (277). *Ad caules.*

Cnicus lanceolatus *W.* (Cirsium lanceolatum *Scop.*)

Hypodermeæ.

Puccinia flosculosarum Wint. (*P. Cirsii Larsch. em Fuck.*) (140). *In foliis* (M. S. p. 81).

Pyrenomyceteæ.

Ophiobolus (*Rhaphidophora*) acuminatus *Sacc.* (277). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 543).

Cnicus Eriophorum *W.* (Cirsium Eriophorum *Scop.*).

Hypodermeæ.

Puccinia flosculosarum *Wint.* (*P. Cirsii Fuck.*). (140). *In foliis* (M. S. p. 81).

Cnicus palustris *W.* (Cirsium palustre *Scop.*).

Discomyceteæ.

Pirottæa Bresadolæ *Sacc.* *In caulibus* (Mich. II p. 536).

Cnicus arvensis *Sm.* (Cirsium arvense *Scop.*).

Hypodermeæ.

Aecidiolum Cirsii *Sacc.* (138). *In foliis* (Mich. I p. 12).

Phycomyceteæ.

Cystopus spinulosus *De By.* (156). *In hypophyllo* (M. S. p. 89).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Cirsii *Desm.* (368). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 143).

Septoria Cirsii *Niessl.* (482). *In foliis* (Mich. I p. 188).

Silybum Marianum *Gærtn.*

Sphæropsideæ.

Septoria Silybi *Pass.* (432). *In foliis.*

Cirsium arachnoideum *Bbrst.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta profusa *Sacc.* (368). *In foliis* (Mich. I p. 260).

Cirsium

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Arctii *Nits.* (228). *In caulibus emortuis.*
Leptosphæria modesta *Karst.* (246). *In caulibus,*

Lapsana communis *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia flosculosarum *Wint.* (*P. Lapsanæ Fuck.*). (140). *In caule et foliis* (M. S. p. 207).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe erthoceras *Nits.* (228). *In caulibus emortuis.*

Spæropsideæ.

Phoma Achilleæ *Sacc.* (386). *In caulibus emortuis.*

Hyphomyceteæ.

Cylindrium Cordæ *Sacc. In foliis* (F. V. V p. 186).
Ramularia Lapsanæ *Sacc.* (488). *In pag. inf. foliorum vivorum* (Mich. II p. 549).

Cichorium Intybus *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Cichorii *Bellynk. In foliis languidis.* (F. V. V p. 169).

Sphæropsideæ.

Phoma Achilleæ *Sacc.* (886). *In caulibus emortuis.*

Leontodon proteiforme *Vill.* (Leontodon hastile L.).

Hypodermeæ.

Puccinia flosculosarum *Wint.* (*P. variabilis Grév.*) 140). *In foliis* (F. V. V S. 169).

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicola *Sacc. In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Picris hieracioides *L.*

Pyrenomycetæ.

Leptosphæria ogilviensis *C. et DNtrs.* (245). *In caulibus emortuis* (F. V. V p. 176).

Scorzonera humilis *L.*

Hypodermeæ.

Ustilago Tragopogi pratensis *Wint.* (*U. receptaculorum Tul.*). *In receptaculis florum* (M. S. p. 73).

Scorzonera hispanica *L.*

Hypodermeæ.

Aecidiolum minutellum *Speg.* (148). *In foliis* (Mich. I p. 477).
Ustilago Tragopogi pratensis *Wint.* (*U. receptaculorum Tul.*). (129). *In receptaculis florum* (Mich. I p. 453).

Tragopogon pratense *L.*

Hypodermeæ.

Aecidiolum Tragopogonis *Corda.* (141). *In foliis* (Mich. I p. 11).
Puccinia Tragopogonis *Corda em. Fuck.* (141). *In foliis* (M. S. p. 81).

Phycomyceteæ.

Cystopus cubicus *dBy.* (156). *In caulibus, foliis floribusque* (Mich. I p. 455).

Lactuca sativa *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora gangliformis *Berk.* (152). *In foliis* (F. V. V p. 171).

Sphæropsideæ.

Septoria Lactucæ *Pass.* (431). *Ad folia viva vel languida* (Mich. II p. 278).

Lactuca muralis *Fres.*

Hypodermeæ.

Puccinia flosculosarum *Wint.* (*P. Chondrillæ Corda*) (140). *In foliis* (M. S. p. 80).

Prenanthes purpurea *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Prenanthis *Fuck.* (141). *In foliis* (M. S. p. 208).

Sonchus oleraceus *L.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Sonchi *Sacc.* (368). *In foliis* (Mich. I p. 141).
Septoria Sonchi *Sacc.* (430). *In caulibus foliisque nondum emortuis* (Mich. I p. 183).

Sonchus arvensis *L.*

Hypodermeæ.

Cæoma Sonchi *Lév.* (148). *In foliis* (M. S. p. 76).

Sonchus

Hypodermeæ.

Puccinia Sonchi. *Rob. et Desm.* (138). *In foliis* (Mich. I p. 241).

Taraxacum vulgare *Lam.* (T. officinale *Vill.*)

Hypodermeæ.

Puccinia flosculosarum *Wint.* (*Aecidium Taraxaci Schm. et Kze.*) (140). *In foliis* (Mich. I p. 11).

Phycomyceteæ.

Synchytrium Taraxaci *dBy. et Woron.* (160). *In foliis* (Mich. I p. 113 II p. 530).

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe Montagnei *Lév.* (165). *In foliis.*

Hieracium murorum *L.*

Hypodermeæ.

Aecidium Compositarum *Mart.* (140). *In foliis vivis* (Mich. I p. 454).

Hieracium umbellatum *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia flosculosarum *Wint.* (*P. Hieracii Mart.*) (140). *In foliis* (M. S. p. 207).

Hieracium

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria agnita *Ces. et DNrts.* (246). *In caulibus putrescentibus* (F. V. II p. 316).

Myxomyceteæ.

Didymium squamulosum *A. et S.* (10) *In foliis.*

Dahlia variabilis *Desf.* (Georgina *Willd.*).

Sphæropsideæ.

Sclerotium Semen *Tode.* (543). *In caule dejecto* (F. V. V p. 210).

Hyphomyceteæ.

Fusarium Georginæ *Berk.* (539). *In radicibus tuberosis* (Mich. I p. 296).

Compositæ variæ

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe communis *Fr.* (165). *In foliis.*
Erysiphe lamprocarpa *Lév.* (164). *In foliis.*

Sphæropsideæ.

Phoma albicans *Desm.* (381). *In caulibus.*

Campanulaceæ.

Phyteuma Scheuchzeri *All.*

Pyrenomyceteæ.

Euryachora stellaris *Fuck.* (293). *In foliis calycibusque* (M. S. p. 145).

Phyteuma spicatum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Euryachora stellaris *Fuck.* (293). *In foliis vivis.*

Hyphomyceteæ.

Ramularia Phyteumatis *Sacc. et Wint. In foliis* Mich. II p. 548).

Phyteuma

Hypodermeæ.

Uromyces Phyteumatum *Lév.* (133). *In foliis vivis* (Mich. I p. 8).

Sphæropsideæ.

Septoria Phyteumatis *Siegm.* (430). *In foliis* (Mich. I p. 184).

Specularia Speculum *D. C.*

Hypodermeæ.

Coleosporium Campanulæ *Fr.* (*Cœoma Campanulacearum Fr.*) (147). *In foliis* (M. S. p. 76).

Campanula Rapunculus *L.*

Hypodermeæ.

Coleosporium Campanulæ *Fr.* (*Cœoma Campanulacearum Fr.*) (147). *In foliis* (M. S. p. 76).

Campanula rapunculoides *L.*

Hypodermeæ.

Coleosporium Campanulæ (*Caeoma Campanulacearum Fr.* (147) *In foliis* (M. S. p. 76).

Campanula Trachelium *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe minuscula *Sacc. et Speg.* (22). *In caule* (Mich. I p. 387).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Campanulæ *Sacc. et Speg.* (372). *In foliis.*

Hyphomyceteæ.

Ramularia macrospora *Fres.* (*R. Campanulæ Sacc.*) (488). *In hypophyllo* (Mich. I. p. 549).

Campanula sibirica *L.*

Discomyceteæ.

Pseudopeziza (*Phacidium*) radians *Rob. et Desm.* (156), *In utraque pagina foliorum* (Mich. I. p. 60).

Campanula

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe lamprocarpa *Lév.* (164). *In foliis.*
Euryachora stellaris *Fuck.* (293). *In foliis vivis*

Hyphomyceteæ.

Ramularia Coleosporii *Sacc.* (489). *Ad folia* (Mich. II. p. 170).

Cucurbitaceæ.

Cucumis Colocynthis *L.*

Melanconieæ.

Glœosporium lagenarium *Sacc. et Roum.* (452). *In epicarpio* (Mich. II p. 283).

Cucumis Citrullus *Sering.*

Hyphomycetæ.

Fusarium cyclogenum *Sacc. In cortice* (F. V. V p. 197).
Fusarium reticulatum *Mont.* (538) (Mich. II p. 296).

Cucumis Melo *L.*

Melanconieæ.

Gloeosporium lagenarium *Sacc. et Roum.* (452) *In epicarpio* (Mich. II p. 283).

Cucurbita Pepo *L.*

Pyrenomyceteæ.

Didymella (*Didymosphæria*) effusa *Niessl.* (216) *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 246).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Cucurbitacearum *Sacc.* (369). *In foliis* (Mich. I p. 145).
Septoria Cucurbitacearum *Sacc.* (429). *In foliis languidis* (F. V. V p. 205.)

Hyphomyceteæ.

Fusarium oxysporum *Schl.* *aurantiacum *Rabh.* (538). *In epicarpio* (Mich. II p. 296)

Cucurbita Melopepo *L.*

Pyrenomyceteæ.

Pleospora mucosa *Speg.* (269). *In cortice putri* (Mich. II p. 252).

Sphæropsideæ.

Phoma mucosa *Speg.* (282) *In cortice putri* (Mich. II p. 273).

Cucurbita lagenaria *Arrab.*

Sphæropsideæ.

Vermicularia Wallrothii *Sacc* (392). *In epicarpio putre* (F. V. V p. 199).

Hyphomyceteæ.

Volutella ciliata *Fr.* (535) *In cortice putri* (F. V. V 198).

Cuburbita

Pyrenomyceteæ.

Gibberella Saubinetii *Sacc* (*Botryosphæria dispersa DNtrs.*). (289) *In caulibus putrescentibus* (M. S. p. 177).
Melanospora leucotricha *Corda* (282). *In epicarpio putrescente.*

Myxomyceteæ.

Didymium farinaceum *Schrad.* (10). *In caule* (F. V. IV p. 40).

Hyphomyceteæ.

Macrosporium heteronemum *Desm.* (524). *In epicarpio putrescente* (Mich. II p. 291).

Ecballion Elaterium *Rich.*(Momordica Elaterium *L.*)

Sphæropsideæ.

Ascochyta Elaterii *Sacc.* (414). *In foliis.* (Mich. I p. 166).

Lagenaria vulgaris. *Ser.*

Sphæropsideæ.

Hendersonia Lagenaria *Sacc.* (420). *In epicarpio putri* (Mich. I p. 212).

Hyphomyceteæ.

Coniosporium apiosporioides *Sacc.* *In cortice putri* (Mich. II p. 293).

Ericaceæ.

Pyrola uniflora. *L.*

Hypodermeæ.

Uredo Pirolæ *Gmel.* (150) *In foliis.*

Rhododendron ferrugineum *L.*

Hypodermeæ.

Chrysomyxa Rhododendri *de Bary* (148). (*Puccinia Rhododendri Fuck.*) (M. S. p. 80). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 155).

Pyrenomyceteæ.

Apiosporium Rhododendri *Fuck.* (167). *In foliis ramulisque.*

Dimerosporium oreophilum *Speg.* (169). *Ad ramulos vivos.* (Mich. II p. 160).

Physalospora alpina *Speg.* (205). *In foliis dejectis putrescentibus.* (Mich. II p. 159).

Hyphomyceteæ.

Torula Rhododendri *Kunze* (496). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 171).

Rhododendron hirsutum *L.*

Hypodermeæ

Chrysomyxa Rhododendri *De Bary.* (148). *In pag inf. foliorum*, (Mich. II p. 155).

Rhododendron Chamæcistus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Dimerosporium maculosum *Speg.* (168). *Ad folia viva v. exsiccata* (Mich. II p. 159).

Hyphomyceteæ.

Cladotrichum maculosum *Sacc.* (512). *In foliis nondum emortuis.* (Mich. p. II 171).

Rhododendron

Pyrenomyceteæ.

Malanomma Rhododendri *Rehm. In ramulis corticatis* (Mich. II p. 562).

Arctostaphylos alpina *Spr.*

Pyrenomyceteæ.

Venturia alpina *Sacc.* (220). *In foliis.* (F. V. IV p. 3).

Sphæropsideæ.

Asteroma alpinum *Sacc.* (389). *In foliis.* (Mich. II p. 300).

Calluna vulgaris *Sall.*

Pyrenomyceteæ.

Didymella Barbieri *Sacc.* (216). *In ramis emortuis.* (Mich. I p. 374).
Hysterium fruticum *Sacc.* (306). *In ramulis decorticatis.*
Hysterium pulicare *Pers* (306). *In ramulis decorticatis* (Mich. I p. 414).

Oxycoccos palustris *Pers.* (Vaccinium Oxycoccum *L.*)

Discomyceteæ.

Stictis anaxaea *Speg.* (353). *Ad folia dejecta putrescentia* (Mich. II p. 261).

Vaccinium Myrtillus *L.*

Hypodermeæ.

Melampsora Vaccinii (*Caeoma Vacciniorum Lk.*, *Thecopsora myrtillina Karst.*) (147). *In foliis* (Mich. II p. 155).

Pyrenomyceteæ.

Podosphæra myrtillina *Kunze.* (162). *In foliis.*

Vaccinium Vitis-Idæa *L.*

Hymenomyceteæ.

Exobasidium Vitis-Idææ *Wor.* (111). *In foliis vivis* (Mich. I p. 363).

Hypodermeæ.

Melampsora Vaccinii *Wint* (*Thecopsora Vacciniorum Karst.* (147). *In foliis.* (Mich II p. 155).

Pyrenomyceteæ.

Lophodermium maculare *DNtrs.* (310). *Ad folia dejecta* (Mich. I p. 468).
Physalospora Claræ-Bonæ *Speg.* (206). *In foliis arvilis adhuc pendulis.* (Mich. II p. 159).

Discomyceteæ.

Ciboria (*Sclerotinia*) oreophila *Sacc.* (345). *In pag. sup. foliorum* (F. V. IV p. 35).

Sphæropsideæ.

Septoria Stemmatea *Berk. In foliis.* (M. S. p. 197).

Symphoricarpus racemosus *Michx.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Ryckholtii *Nke.* (233). *In truncis ramisque* (M. S. p. 211).
Melanomma pulvis-pyrius *Sacc.* (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).

Sphæropsideæ.

Diplodia Symphoricarpi *Sacc.* (103). *In ramulis* (F. V. V 208).
Phyllosticta Symphoricarpi *West.* (371). *In foliis.* (Mich. I p. 148).
Phoma Ryckholtii *Sacc.* (383). *In ramulis truncisque.*

Volkameria fragrans *P. Br.*

Sphæropsideæ.

Phoma Volkameriæ *Speg.* (386). *In ramis emortuis putrescentibus* (Mich. I. p. 481).

Oleaceæ.

Jasminum officinale *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diporthe culta *Sacc. et Speg.* (226). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 390).

Sphæropsideæ.

Hendersonia biseptata *Sacc.* (418). *In ramulis.*
Hendersonia sarmentorum *West.* (418). (Mich. I p. 214).
Phyllosticta Jasmini *Sacc.* (367). *In foliis* (Mich. I p. 138).
Diplodia Jasmini *West. In ramulis* (F. V. V p. 208).

Olea europea *L.*

Hymenomyceteæ.

Pleurotus (*Agaricus*) olearius *D. C.* (49). *Ad truncos* (M. S. p. 22).

Pyrenomyceteæ.

Acrospermum compressum *Tode* (312). *In foliis dejectis putrescentibus* (Mich. I p. 56).
Anthostomella Olearum *Sacc. et Speg.* (195). *In cortice duriore* (Mich. I p. 25).
Aylographum vagum *Desm.* (305). *In foliis exsiccatis.*
Cesatiella australis *Sacc. et Speg. In ramis emortuis* (Mich I p. 250).
Diaporthe Veneta *Sacc. et Speg.* (232). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 383).
Glonipsis (*Hysterium*) australis *Duby.* (309). *In trunco decorticato* (F. V. IV p. 26).
Hysterium pulicare *Pers. In cortice duriore* (Mich. I p. 55).
Hysterographium graminodes *Sacc.* (309). *In ligno decorticato* (Mich. I p. 413).

Trematosphæria *(Caryospora)* Olearum *Sacc.* (255). *In cortice duriore* (Mich. I p. 451).
Valsa Mediterranea *DNtrs.* (177). *In ramis emortuis* (F. V. V p. 179).

Discomyceteæ.

Embolus ochreatus *DNtrs* (?) *In ligno decorticato* (F. V. IV p. 28).

Sphæropsideæ.

Hendersonia Oleæ *Desm. In foliis dejectis* (F. V. V p. 207).
Phoma Oleæ *D. C.* (379). *In foliis deiectis.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora cladosporoides *Sacc.* (521). *In foliis languidis* (Mich. II. p. 556).
Sirodesmium antiquum *Sacc.* (500). *In ligno.*
Sirodesmium granulosum *DNtrs.* (500). *In ligno* (Mich. II p. 290).

Olea fragrans *Lour.*

Hyphomyceteæ.

Oospora (*Torula*) hyalinula *Sacc.* (467). *In foliis a* Capnodio Footii *invasis* (Mich. I p. 265).

Phyllirea media *L,*

Pyrenomyceteæ.

Asteroma circinans *Desm.* (389). *In foliis.*
Aylographum vagum *Desm.* (305) *In foliis exsiccatis.*

Lygustrum Vulgare *L.*

Pyrenomyceteæ.

Cryptovalsa Nilschkii *Fuck.* (183). (Mich. I p. 22).
Diaporthe Brachyceras *Sacc.* (226) *In ramis* (F. V. IV p. 11).
Dimenosporium pulchrum *Sacc.* (166). *In foliis languentibus* (F. V. II p. 299).
Lophiostoma insidiosum *Ces. et DNtrs.* (302). (Mich. I p. 417).
Melomastia Friesii *Nke. In ramulis* (M. S. p. 210).

Sphærella Ligustri *Fuck. In foliis* (M. S. p. 209).
Valsa Cypri *Tul. In ramulis* (F. V. IV p. 16).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Ligustri *Sacc. et Speg.* (413). *In foliis* (Mich. I p. 165).
Diplodia Ligustri *West.* (403). *In ramis* (Mich. II p. 266).
Diplodia Mamma *Fuck. In ramulis* (M. S. p. 202).
Discosia Artocreas *Fr.* (455). (Mich. I p. 201).
Phyllosticta Ligustri *Sacc.* (365). *In foliis* (Mich. I p. 134).
Phyllosticta ligustrina *Sacc. et Speg.* (375). *In foliis* (Mich. I p. 160).

Hyphomyceteæ.

Macrosporium Sarcinula *Berk. In foliis* (M. S. p. 182).
Sarcinella heterospora *Sacc.* (523). *In foliis vivis.*

Ligustrum japonicum *Thunb.*

Discomyceteæ.

Tympanis (*Cenangium*) Ligustri *Fuck.* (344). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 58).

Syringa vulgaris *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe nodosa *Fuck.* (232). (F. V. IV p. 12).
Diaporthe resecans *Nke.* (232). *In ramulis emortuis* (M. S. p. 138).
Hysterographium Fraxini *De Not.* (309). *In ramis.*
Leptosphæria vagabunda (*Sphæria fuscella Berk. et Br.* (245). (M. S. p. 98).
Lophiotrema crenatum *Sacc.* (298). *In ramis.*
Melomastia Friesii *Nits.* (266) *In ramis truncisque denudatis.*
Ostropa cinerea *Fr.* (312) *In ramis exsiccatis.*
Robergea unica *Desm.* (312) *In ramulis emortuis.*
Rosellinia Aquila *DNtrs.* (191) *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. II 327).
Valsa Syringæ *Nke.* (175). (F. V. IV p. 16).
Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). (F. V. IV p. 20).

Sphæropsideæ.

Asteroma vagans *Desm.* (389). *In foliis languidis.*
Cytospora Syringæ *Sacc.* (395). *In ramis.*

Diplodia Lilacis (*D. Syringæ*) *Aucrsw.* (403). *In ramulis* (M. S. p. 201).
Phyllosticta Syringæ *West.* (371). *In foliis* (Mich. I p. 147).
Phoma depressa *Sacc.* (383). *In ramis.*
Phoma resecans *Sacc. In ramis* (Mich. I p. 257).
Phoma Syringina *Sacc.* (383). *In ramis siccis vel. corticatis.*
Septoria Syringæ *Sacc. et Speg.* (425). *In foliis* (Mich. I p. 176).

Fraxinus Ornus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183). (Mich. I p. 22).
Diaporthe obscurans *Sacc.* (239). *In cortice ramulorum* (F. V. IV p. 7).
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).
Eutypella (*Valsa*) cerviculata *Fr.* (179) *In cortice duriore* (M S. p. 131).
Gloniella minima (*Hysterium minimum Sacc.*) (307). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 55).
Hypoxylon coccineum *Fres. In truncis et ramis* (M. S. p. 152).
Ophioceras (*Raphidophora*) macrocarpum *Sacc.* (279). *In ramulis* (F. V. II p. 306).
Ostropa cinerea *Fr. In ramis decorticatis* (Mich. II p. 257).
Sphærulina fraxinea *Sacc. et Sp.* (263). *In foliis languidis.*
Sphærulina myriadea *Sacc. In foliis languidis* (Mich. I p. 399).
Valsa ceratophora *Tul.* (175). (Mich. I p. 19).
Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In ramis* (Mich. I p. 32).
Zignoella nematasca *Sacc. et Speg.* (267) *In ramulis decorticatis putrescentibus* (Mich I p. 101).

Discomyceteæ.

Stictis Pupula *Fr.* (353). *In ramis.*

Sphæropsideæ

Ascochyta Ormi *Sacc. et Speg.* (414). *In foliis* (Mich. I p. 167).
Diplodia inquinans *West.* (403). *In truncis.*
Discosia Artocreas *Fr.* (445). (Mich. I p. 201).
Fusicoccum ornellum *Sacc.* (393) *In ramis.*
Septoria elacospora *Sacc.* (427). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 178).
Septoria Fraxini *Fr In foliis* (M. S. p. 196).
Septoria Orni *Pass.* (426). *In ramulis* (Mich. I p. 177).

Hyphomyceteæ.

Torula antennata *Pers.* (496). *In ligno cæso* (Mich. I p. 292).

Melanconieæ.

Gloesporium Orni *Sacc.* (449). *In pag. sup. foliorum* (Mich I p. 219).

Fraxinus excelsior *L.*

Pyrenomyceteæ.

Cryptosphæria millepunctata *Grev.* (182). *In ramis emortuis.*
Diaporthe obscurans *Sacc.* (232). *In cortice ramulorum* (F. V. IV p. 7).
Lophiostoma dumeti *Sacc.* (300). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 467).
Spherella petiolicola *Auersw.* (210). *In petiolis foliorum.*

Fraxinus

Hymenomyceteæ.

Polyporus fraxineus *Fr.* (99). *Ad truncos* (M. S. p. 52).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphæria umbrina *De Not.* (237). *In cortice crassiore.*
Anthostoma melanotes *Sacc.* (196). *In ramis decorticatis.*
Cryptosphæria ocellata *Ces. et De Not.* (183). *In ramis.*
Daldinia concentrica *Ces. et De Not.* (201). *In truncis.*
Eutypa leyoplaca *Cooke.* (181). *In ramis decorticatis.*
Giberella Saubinetii *Sacc.* (289). *In ramulis tenellis.*
Glonium lineare *DNtrs.* (305). *In ligno denudato* (M. S. p. 159).
Hypoxylon rubiginosum *Fr.* (200). *Ir ramis emortuis.*
Hysterium Bérengerii *Sacc.* (307). *In ligno decorticato* (F. V. IV p. 25).
Hysterium elongatum *Walk. In ligno* (M. S. p. 158).
Hysterographium (*Hysterium*) Fraxini *Pers.* (309). *Ad ramulos* (M. S. p. 158)
Lophiostoma excipuliforme *Ces. et De Not.* (301). *In cortice duriore.*

Melomastia Friesii *Nits.* (266). *In ramis truncisque denudatis.*
Ostropa cinerea *Fr.* (312). *In ramis exsiccatis.*
Phyllosticta suffulta *Sacc.* (163). *In foliis vivis.*
Tobergea unica *Desm.* (312). *In ramulis emortuis.*
Teichospora obducens *Fuck.* (273). *In ligno* (M. S. p. 210).

Sphæropsideæ.

Diplodia Fraxini *Fr.* (103). *In ramis* (M. S. p. 201).
Phoma pterophila *Fuck.* (379). *In samaris dejectis* (Mich. I p. 258).
Phoma samararum *Desm* (379). *In samaris.* (M. S. p. 191).

Forsythia viridissima *Lindl.*

Pyrenomyceteæ.

Sphærella verna *Sacc. et Speg.* (210). *In pag. inf. quae cinerascit* (Mich. I p. 379).

Forsythia suspensa *Thunb.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Forsythiæ *Sacc.* (370). *In foliis* (Mich. I p. 147).

Sapotaceæ.

Bumelia lycioides *Swartz.*

Sphæropsideæ.

Septoria Bumeliæ *Sacc.* (427). *In foliis languidis* (Mich. I p. 180).

Ebenaceæ.

Diospyrus Lotus *L.*

Hymenomyceteæ.

Corticium granulatum *Sacc.* (115). *Ad corticem* (F. V. V p. 165).

Sphæropsideæ.

Aposphæria Diospyri *Sacc.* (387). *In ramis decorticatis.*
Phoma Diospyri *Sacc.* (378). *In ramis decorticatis* (Mich. I p. 258).

Apocinaceæ.

Nerium Oleander *L.*

Pyrenomyceteæ.

Apiosporium foedum *Sacc. In pag. sup. foliorum ramulisque iunioribus* (F. V. II p. 299).
Capnodium Nerii *Rabh.* (170). *In foliis ramulisque* (F. V. V p. 176).
Spærella mediterranea *Sacc.* (210). *In pag. sup. foliorum languentium* (Mich. I p. 36).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Oleandri *Sacc. et Speg. In foliis* (Mich. I p. 162).
Chætophoma fœda *Sacc.* (389). *In foliis ramulisque vivis.*
Diplodia Nerii *Speg.* (406). *In ramulis et petiolis foliorum* (Mich. I p. 486).
Diplodia Oleandri *Speg.* (409). *Ad folia dejecta* (Mich. I p. 486).
Phoma Nerii *Speg.* (384). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 482).
Phyllosticta Nerii *West.* (367). *In foliis* (Mich. I p. 138).
Septoria oleandrina *Sacc. In foliis languidis* (Mich. I p. 171).

Hyphomyceteæ.

Cercospora nericlla *Sacc.* (519). *In foliis nondum emortuis* (Mich. I p. 294).

Melanconieæ.

Pestalozzia versicolor *Speg.* (460). *Ad folia dejecta putrescentia* (Mich. I p. 479).

Vinca major *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Berkeley *Pass.* (*P. Vincæ Berk.*) *In foliis* (M. S. p. 82).

Pyrenomyceteæ.

Antrostomella limitata *Sacc.* (195) *In calicibus ramulisque tenuioribus* (F. V. IV p 1).
Calonectria Bloxami *Sacc.* (288). *In ramulis* (F. V. IV p. 23).

Hyphomyceteæ.

Ramularia Vincæ *Sacc.* (489). *In foliis.* (Mich. II p. 551).

Vinca minor *L.*

Pyrenomyceteæ.

Metasphæria (*Spærella*) Vincæ *Fuck.* (261). *In foliis* (M. S. p. 209).

Sphæropsideæ.

Depazea Vincæ *Fuck. In foliis* (M. S. p. 193).
Phoma cylindrospora *Sacc.* (379). *In foliis.*

Apocinum venetum *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria littorea *Sacc.* (431). *In foliis nondum emortuis* (Mich. II p. 280).

Asclepiadaceæ.

Cynanchum acutum *L.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora punctiformis *Sacc. et Roum. In foliis.* (Mich. II p. 556).

Cynanchum Vincetoxicum *Br.*

Hypodermeæ.

Cronartium asclepiadeum *Fr.* (146). *In foliis.* (M. S. p. 208).

Pyrenomyceteæ.

Hypoderma Vincetoxici *Duby.* (310). *In caulibus.*
Hypoderma virgultorum *DC.* (310). *In caulibus ramisque.*
Leptosphæria modesta *Awd.* (246). *In caule putri* (Mich. I p. 37).
Leptosphæria scotophila *Sacc.* (246). *In caulibus.* (F. V. II. p. 317).
Leptostromella hysterioides *Fr.* (443). *In caule* (Mich. II p. 282).
Sphærella Vincetoxici (212). *In caulibus emortuis.*

Discomyceteæ.

Mollisia (*Niptera*) Dehnii *Sacc.* (335). *var.* Fuscidula *Sacc. In caule emortuo* (F. V. IV p. 32).
Mollisia (*Pirenopeziza*) atrata *Fuck.* (336). *In caule* (F. V. IV p 33).

Sphæropsideæ.

Phoma Vincetoxici *West.* (381). *In caulibus et fructibus.*
Phyllosticta Asclepiadearum *West.* (369). *In foliis* (Mich. I p. 140).
Phyllosticta atro maculans *Speg.* (369). *Ad folia arida* (Mich. II p. 276).
Phyllosticta Vincetoxici *Sacc.* (375). *In foliis.* (Mich. I p. 156).
Septoria asclepiadea *Sacc.* (434). *In foliis.* (Mich. I p. 193).
Septoria (*Depazea*) Vincetoxici *Awd,* (428). *In foliis languidis* (F. V, V p. 206).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Bellynckii *Sacc.* (521). *In pag. inf. foliorum viventium v. languentium* (F. V. V p. 188)

Hoya carnosa *R. Br.*

Sphæropsideæ.

Septoria Hoyæ *Sacc.* (424). *In foliis* (Mich. I p. 172).

Hyphomyceteæ.

Stachydium bicolor *Lk.* (508). *In foliis putrescentibus* (F. V. V p. 195).

Melanconieæ.

Glœosperium alline *Sacc.* (450). *In foliis.*
Glœosporium macropus *Sacc.* (450). *In foliis* (Mich. I p. 217).
Glœosporium sphærelloides *Sacc.* (450). *In fol. exsiccatis.*

Marsdenia erecta *Valk. et Arn.*

Sphæropsideæ.

Diplodia Marsdenia *Thüm.* (410). *In caulibus* (Mich. II p. 266).
Septoria asclepiadea *Sacc.* (434). *In foliis* (Mich. I p. 193).

Gentianaceæ.

Gentiana cruciata *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Gentianæ *Lk. em Fuck.* (140). *In calycibus* (M. S. p. 82).

Gentiana acaulis *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Gentianæ *Lk. em Fuck.* (140). *In calycibus* (M. S. p. 82).

Gentiana asclepiadea *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Gentianæ *Lk.* (140). *In foliis.*

Sphæropsideæ.

Septoria microsora *Speg.* (131). *In foliis* (Mich. II p. 278).

Chlora perfoliata *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora Chloræ *D. By.* (153). *In caulibus, foliis, pedunculisque* (Mich. I p. 12).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Chloræ *Sacc. et Speg.* (412). *In foliis* (Mich. II p. 163).
Rhabdospora (*Septoria*) Chloræ *Sacc. et Speg.* (438). *In foliis caulibusque* (Mich. I p. 192).

Erythraea Centaurium *Pers.*

Phycomyceteæ.

Peronospora Chloræ *D. Bary* (*Peronospora Erythræa Kühn*) (153). *In foliis* (Mich. I p. 365).

Pyrenomyceteæ.

Apiosporium Centaurii *Fuck.* (167). *In foliis et caulibus.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Erythræa *Sacc. et Speg.* (374). *In foliis.* (Mich. I p. 152).

Hyphomyceteæ.

Torula Centaurii *Fuck.* (497). *In foliis* (F. V. V p. 192).

Polemoniaceæ.

Phlox paniculata *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Phlocis *Sacc. et Speg.* (430). *In foliis* (Mich. I p. 184).

Convolvulaceæ.

Convolvulus arvensis *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Convolvuli *Cast* (140). *In foliis* (M. S. p. 83).

Sphæropsideæ.

Septoria Convolvuli *Desm.* (427). *In foliis* (M. S. p. 196).
Septoria sepium *Desm.* (431). *In foliis* (Mich. I p. 185).

Convolvulus Soldanella *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Calystegiæ *West.* (430). *f. Soldanelleae Speg. In foliis* (Mich. II p. 280).

Convolvulus sepium *L.* (Calistegia sepium *A. Br.*).

Hypodermeæ.

Aecidiolum Convolvuli *Sacc.* (140). *In foliis* (Mich. I p. 12).
Puccinia Convolvuli *Cast.* (140). *In foliis* (M. S. p. 83).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Calystegiæ *Sacc.* (413). *In foliis* (Mich. I p. 165).
Phyllosticta Calystegiæ *Sacc.* (369). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 141).
Phyllosticta nervisequa *Sacc.* (377). *In foliis* (Mich. I p. 160).
Septoria Calystegiæ *West. In foliis* (M. S. p. 196).

Hyphomyceteæ.

Fusarium roseum *Link.* (537). *In caule* (Mich. II p. 294).
Tuberculina (*Tubercularia*) persicina *Ditm.* (533). *In foliis* (F. V. V p. 197).

Convolvulus

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe Martii *Lév.* (165). *In foliis.*
Gibberella Saubinetii *Sacc.* (*Botriosphaeria dispersa DNtrs.*) (289). *In caulibus putrescentibus* (M. S. p. 117).

Pharbitis hispida *Choisy.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Pharbitis *Sacc.* (369). *In foliis* (Mich. I p. 144).

Borraginaceæ.

Onosma arenarium *Waldst.*

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe ovidula *Lév.* (165). *In foliis et caulibus.*

Echium

Pyrenomyceteæ.

Pleospora media *Niessl.* (269). *In caulibus emortuis.*

Lithospermum officinale *L.*

Pyrenomyceteæ.

Pyrenophora (*Pleospora*) hispida *Niessl.* (272). *In caulibus emortuis putrescentibus* (Mich. I p. 462).

Pulmonaria officinalis *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Pulmonariæ *Sacc.* (433). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 188).

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicola *Sacc.* (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).
Ramularia cylindroides *Sacc.* *In foliis* (Mich. II p. 551).

Myosotis palustris *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora Mysotidis *DBy.* (153). *In foliis* (F. V. IV p. 171).

Melanconieæ.

Cylindrosporium Myosotidis *Sacc.* (454). *In pag. inf. foliorum.*

Lycopsis arvensis *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia striæformis *West.* (*P. Straminis Fuck. em DBy.*) (142). *In foliis* (M. S. p. 83).

Borrago officinalis *L.*

Pyrenomyceteæ.

Erisiphe horridula *Lév.* (165). *In foliis et caulibus.*

Symphytum officinale *L.*

Hypodermeæ.

Uredo (*Cacoma*) Symphyti *Fuck.* (150). *In foliis* (M. S. p. 76).

Pyrenosporeæ.

Peronospora Myosotidis *De Bary.* (153). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe horridula *Lév.* (165). *In foliis.* (F. V. V p. 173).

Gibberella Saubinetii (*Botryosphaeria pulicaris DNtrs.*) (289). *subsp. Saubinetii* (F. V. IV p. 5).

Hyphomyceteæ.

Ovularia (*Ramularia*) Asperifolii *Sacc.* (478). *In foliis* (F. V. V p. 168).

Cynoglossum officinale *L.*

Hyphomyceteæ.

Ovularia Cynoglossi *Sacc.* (478). *In foliis.* (Mich. II. p. 546).

Cynoglossum pictum *Ait.*

Hypodermeæ.

Puccinia striæformis *West.* (*P. Straminis Fuck. em D. By.* (142). *In foliis* (M. S. p. 83).

Omphalodes verna *Much.*

Hyphomyceteæ.

Volutella gilva *Sacc.* (535). *In caulibus* (Mich. II. p. 289).

Solanaceæ.

Datura Stramonium *L.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta Daturæ *Sacc.* (412). *In foliis* (Mich. I p. 163).

Hyphomyceteæ.

Cercospora crassa *Sacc.* (412). *In foliis languidis.*

Lycium europaeum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Didimosporium Striola *Sacc. In ramulis languidis* (Mich. II p. 540).
Microsphæra Lycii *Sacc. et R.* (164). *In foliis.*

Lycium sinense *Mill.*

Sphæropsideæ.

Phoma importata *Sacc.* (386). *In caulibus emortuis.*

Nicotiana Tabacum *L.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta capsulicola *Sacc. et Speg.* (374). *In capsulis* (Mich. I p. 152).

Solanum Dulcamara *L.*

Pyrenomyceteæ.

Cucurbitaria Dulcamaræ *Fr.* (275). *In ramis emortuis* (M. S. p. 121).
Diaporthe Dulcamaræ *Nke.* (229). (F. V. IV p. 12).
Didymella (*Sphaerella*) superflua *Fuck.* (217). *In caulibus emortuis* (M, S. p. 96).
Eutypa heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis* (F. V. IV p. 15).
Leptosphæria acuta *Fuck.* (246). *In ramulis novellis* (M. S, p. 105).
Leptosphæria Doliolum *Ces. et DNtrs.* (243). *In caulibus herbaceis* (M. S. p. 103).
Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (F. V. II p. 318).
Lophiostoma simillimum *Karst.* (302). *In ligno ramorum.*
Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In ramis* (Mich. I p. 32).

Discomyceteæ.

Helotidiun nanum *Sacc.* (333). *In caule* (F. V. IV p. 36).

Sphæropsideæ.

Hendersonia Dulcamaræ *Sacc. In foliis* (Mich. I p. 215).
Phoma Dulcamaræ *Nitschke.* (386). *In caule* (Mich. II p. 272).
Phyllosticta (*Ascochyta*) Dulcamaræ *Sacc.* (376). *In foliis* (Mich. I p. 160).
Septoria Dulcamaræ *Desm.* (428). *In foliis* (M. S. p. 196).

Hyphomyceteæ.

Dendryphium curtum *B. et Br. var.* ramosius. *In lignis putridis, ramisque* (Mich. II p. 291).
Fusarium roseum *Link.* (537). *In ramulis* (Mich. II p. 295).
Graphium fissum *Fr.* (529). *In ramis.*

Solanum lycopersicum *L.* (Lycopersicum esculentum *Mill.*)

Saccharomyceteæ.

Saccharomyces sphæricus *Sacc.* (26) *In succo baccarum concreto.*

Phycomyceteæ.

Peronospora infestans *DBy.* (151). *In foliis caulibusque* (F. V. V p. 171).

Hyphomyceteæ.

Fusarium aurantiacum *Link.* (539). *In baccis putrescentibus* (Mich. II p. 296).

Melanconieæ.

Glœsporium phomoides *Sacc.* (452). *In epicarpio fructuum* (Mich. II p. 540).

Solanum tuberosum *L.*

Schizomyceteæ.

Clostridium butyricum *Prazm.* (20). *In tuberis putrescentibus.*
Micrococcus cyaneus *Schrót.* (23). *Ad tubera cocta.*
Micrococcus luteus *Cohn.* (23). *Ad tubera cocta.*
Micrococcus prodigiosus *Cohn.* (23). *Ad tubera cocta.*
Micrococcus violaceus *Cohn.* (23). *Ad tubera cocta.*

Saccharomyceteæ.

Saccharomyces sphæricus *Sacc.* (26). *In succo baccarum concreto.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Tuslanei *Nits.* (229). *In caulibus.*
Phomatospora Berkeley *Sacc.* (205). *In caulibus putrescentibus.*

Sphæropsideæ.

Phoma Berkeleyi *Sacc.* (381). *In caulibus putrescentibus.*
Vermicularia atramentaria *B. et Br.* (391). *In caulibus putridis* (F. V. V 199).
Vermicularia eupyrena *Sacc.* (391). *In caule denique decorticato emortuo* (Mich. II p. 563).

Hyphomyceteæ.

Dendrodochium affine *Sacc. In caulibus emortuis* (Mich. II p. 562).
Fusarium Solani *Sacc.* (539). *In tuberis* (Mich. II p. 297).
Verticillium lateritium *Berk.* (482). *In tuberis.*

Solanum Melongena *L.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta hortorum *Speg. In foliis vivis* (Mich. II p. 277).

Solanum nigrum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria acuta *Karst* (246). *In caulibus emortuis.*
Ophiobolus vulgaris *Sacc.* (277). *In caulibus.*

Hyphomyceteæ.

Acrotheca Solani *Sacc.* (504). *In foliis languidis.*
Dendrodochium roseum *Sacc.* (533). *In caulibus* (Mich. II p. 298).

Solanum

Pyrenomyceteæ.

Raphidophora rubella *Fuck. In caulibus exsiccatis* (M. S. p. 101).

Physalis Alkekengi *L.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta physalina *Sacc.* (413). *In foliis languidis* (Mich. I p. 93).
Phyllosticta Physaleos *Sacc.* (372). *In foliis* (Mich. I p 150).

Petunia

Sphæropsideæ.

Ascochyta Petuniæ *Speg.* (413). *In foliis languidis cujusdam speciei cultæ* (Mich. II p. 278).
Phyllosticta Petuniæ *Speg.* (372). *In foliis cujusdam speciei cultæ* (Mich. II. p. 278).

Plantagineæ.

Plantago lanceolata *L.*

Hypodermeæ.

Aecidium Plantaginis *Ces.* (149). *In foliis* (Mich. I p. 241).

Pyrenomyceteæ.

Erysife lamprocarpa *Lk.* (164). *In foliis* (M. S. p. 91).
Pleospora pallida *Sacc. et Speg.* (271). *Ad folia putrida* (Mich. I p. 232).

Discomyceteæ.

Excipula nervisequia *Fr.* (446). *In foliis* (F. V. V p. 199).
Mollisia (*Pyrenopeziza*) Plantaginis *Fuck.* (336). *In foliis scapisque* (Mich. I 423).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium scapisedum *Sacc. et Speg.* (398). *In scapis emortuis* (Mich. II p. 204).

Phoma subordinaria *Desm.* (379). *In scapis* (F. V. V p. 200).

Hyphomyceteæ.

Cercosporella (*Cercospora*) pantoleuca *Sacc.* (490). *In pag. superiore foliorum* (Mich. I p. 267).
Cercospora Plantaginis *Sacc.* (519). *In foliis* (Mich. I p. 267).
Illosporium maculicola *Sacc.* (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).
Synchytrium plantagineum *Sacc. et Speg.* (159). *In foliis.* (Mich I p. 243).

Plantago media *L.*

Hyphomyceteæ.

Gyroceras Plantaginis *Sacc.* (499). *In foliis* (Mich. I p. 266).

Plantago major *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora alta *Fuck.* (155). *In pag. inferiore foliorum* (Mich. I p. 12).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Plantaginis *Sacc. et Speg.* (414). *In foliis* (Mich. I p. 166).
Phillosticta Plantaginis *Sacc.* (369). *In foliis.* (Mich. I p. 140).
Septoria plantaginea *Pass.* (431). *In foliis ad utramque paginam* (Mich. II p. 167).

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicola *Sacc.* (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).
Isaria epiphylla *Pers.* (526). *In foliis* (M. S. p. 187).
Volutella gilva *Sacc.* (535). *In foliis putridis* (Mich. II p. 298).

Plantago

Hymenomyceteæ.

Corticium epiphyllum *Sacc*) *In foliis nondum emortuis* (Mich. I p. 6).

Pyrenomyceteæ.

Apiosporium Plantaginis *Fuck.* (167). *In pag. inf. foliorum.*
Diaporthe adunca *Niessl.* (228). *In scapis* (F. V. IV p. 12).

Myxomyceteæ.

Didymium herbarun *Fr.* *In foliis* (M. S p. 174).

Scrofulariaceæ.

Verbascum phlomoides *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Scrofulariæ *Wint.* (*U. Verbasci Niessl.*) *In foliis* (F. V. V p. 170).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Verbasci *Sacc. et Speg.* (414). *In foliis* (Mich. I p. 166).

Verbascum Blattaria *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora sordida *Berk. et Br.* (155). *In foliis* (Mich. I p. 365).

Hyphomyceteæ.

Ramularia variabilis *Fuck.* (489). *In foliis languidis* (Mich. I p. 266).

Verbascum

Pyrenomyceteæ.

Didymosphæria brunneola *Niessl.* (236). *In caulibus exsiccatis.*

Hyphomyceteæ.

Stilbum byssinum *Pers.* (526). *In foliis* (M. S. p. 189).

Scrofularia aquatica *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria Camilla *Sacc.* (248). *In foliis languidis* (F. V. II p. 312).

Scrofularia alata *Gilib.* (S. Ehrhartii *Stev.*)

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Ehrhartii *Sacc.* (369). *In foliis* (Mich. I p. 140).

Scrofularia nodosa *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora sordida *Berck. et B.* (155). *In foliis* (Mich. I p. 365).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Scrofulariæ *Sacc.* (376). *In pag. sup foliorum* (Mich. I p. 159).

Scrofularia canina *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe canina *Sacc.* (229). *In caulibus crassioribus* (Mich. II p. 531).
Diaporthe Tulasnei *Nke.* (229) *In caulibus* (Mich. I p. 390).

Melanconieæ.

Pestalozzia funerea *Desm.* (459) *var.* discolor. *In foliis emortuis* (Mich. I p. 478).

Scrofularia

Hypodermeæ.

Uromyces (*Æcidium*) Scrofulariæ (*DC.*) *Wint.* (133) *In foliis* (Mich. I p. 11).

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria modesta *Karst.* (246) *In caulibus.*
Ophiobulus porphyrogonus *Sacc.* (277) *In caulibus exsiccatis.*

Antirrhinum majus *L.*

Hypodermeæ.

Chætostroma hysterioides *Sacc.* (541) *In caule decorticato* (Mich. II p. 174).

Lynaria Cymbalaria *Mill.*

Sphæropsideæ.

Septoria Cymbalariæ *Sacc. et Speg.* (435) *In foliis* (Mich. I p. 190).

Gratiola officinalis *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Gratiolæ *Sacc. et Speg.* (430) *In foliis* (Mich. I p. 185).

Digitalis ambigua *Murr.* (*D.* grandiflora *All.*).

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria modesta *Awd.* (246). *In caulibus putrescentibus* (Mich. I. p. 396).

Veronica Chamædrys *L.*

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicola *Sacc.* (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).

Veronica urticæfolia. *Jacq.*

Hypodermeæ.

Puccinia Veronicæ *DC.* (136) *In foliis* (M. S. p. 208).

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria carpogena *Sacc.* (248) *In capsulis exsiccatis* (F. V. II p. 313).
Ovularia Veronicæ *Sacc.* (478) *In foliis* (Mich. II p. 547).

Veronica arvensis *L.*

Hyphomyceteæ.

Ovularia Veronicæ *Sacc.* (478) *In foliis* (Mich. II p. 547).

Veronica hederefolia *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora grisea *Ung.* (154) *In pag. inferiore.* (F. V. V. p. 172).

Rhinanthus major *Ehrh.*

Hypodermeæ.

Uromyces (*Æcidium*) Scrophulariæ *DC.* (133) *In foliis* (Mich. I p. 11).

Rhinanthus minor *Ehrh.*

Hypodermeæ.

Coleosporium Euphrasiæ *Wint.* (*C. Rhinanthacearum Lév.*) (147). *In foliis* (Mich. I p. 10).

Phycomyceteæ.

Peronospora densa *Rabh.* (152). *In caulibus ramis foliisque floralibus* (Mich. I p. 365).

Rhinanthus

Hypodermeæ.

Coleosporium Euphrasiæ *Wint.* (*C. Rhinanthacearum Lév.*) (147). *In foliis* (Mich. I p. 10).

Sphæropsideæ.

Phoma complanatum *Desm.* (381). *In caulibus emortuis.*

Hyphomyceteæ.

Fusarium incarnatum *Desm.* (539). *In foliis emortuis* (Mich. II p. 296).
Ramularia Coleosporii *Sacc.* (489) *Ad folia* (Mich. II p. 170).

Melampyrum arvense *L.*

Pyrenomyceteæ.

Apiosporium Melampyri *Sacc. In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 243).

Malampyrum pratense *L.*

Hypodermeæ.

Coleosporium Euphrasiæ *Vint.* (*C. Rinanthacearum Fr.*) (147) *In foliis caulibusque* (M. S. p. 76).

Melampyrum nemorosum *L.*

Hypodermeæ.

Coleosporium Euphrasiæ *Wint.* (*C. Rhinanthacearum Fr.* (147) *In foliis caulibusque.* p. (M. S. 76).

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella tormicoides *Sacc.* (195) *Ad caules putrescentes* (F. V. IV p. 1).
Lophiotrema (*Lophiostoma*) vagabundum *Sacc.* (299) *In caulibus* (Mich. II p. 447).

Melampyrum

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Desmazierii *Niessl.* (F. V. IV p. 12).
Leptosphæria Doliolum *Ces. et DNtrs.* (243) *In caulibus* (F. V. II p. 314).
Leptosphæria suffulta *Niessl.* (243) *In ramulis* (Mich. I p. 38).

Tecoma radicans *Juss.*

Pyrenomyceteæ.

Diaphorthe ophites *Sacc.* (733) *In ramis* (F. V. IV p. 13).
Leptosphæria carpophila *Sacc.* (249) *In capsulis putrescentibus* (F. V. II p. 313).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Tecomæ *Sacc. In ramulis nondum emortuis* (Mich. I p. 168).
Coniothyrium Fuckelii *Sacc.* (399) (Mich. I p. 207).
Hendersonia Tecomæ *Sacc. In ramis* (Mich. I p. 212).
Phoma Tecomæ *Sacc.* (384) *In sarmentis* (F. V. V p. 201).
Phyllosticta Tecomæ *Sacc.* (371) *In foliis* (Mich. I p. 148).

Melanconieæ.

Coryneum Tecomæ *Sacc.* (457) *In ramulis* (M. S. p. 190).

Catalpa bignonioides (Catalpa syringifolia *Sims.* Bignomia Catalpa *L.*)

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe inquilina *Nke.* (227) *In caule languente* (Mich. I p. 388)
Diaporthe petiolorum *Sacc. et Sp.* (225) *In petiolis languidis.*
Diaporthe spissa *Sacc. et Speg.* (233) *In ramulis junioribus* (Mich. I p. 385).
Ecnosphæria Caput-Medusæ *Sacc. et Speg. In ramulis putrescentibus* (Mich. I p. 405).
Hysterographium Fraxini *De Not.* (309) *In ramis.*
Lophiosphæra (*Lophiostoma*) Anaxea *Sacc.* (205) *In cortice* (Mich. I p. 468).

Pleospora Spegazziniana *Sacc.* (270) *In ramulis emortuis.*
Thyridium pulchellum *Sacc. et Speg.* (275) *In ligno putrescente* (Mich. I p. 249).

Discomyceteæ.

Helotium Cacaliæ *Fr.* (331) *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 427).

Sphæropsideæ.

Chætomella brachyspora *Sacc. et Speg.* (400) *In cortice duriore* (Mich. I p. 260).
Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398) *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Diplodia Catalpæ *Speg.* (404) *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 486).
Phyllosticta Bignoniæ *West.* (367) *In foliis* (Mich. I p. 137).
Septoria Catalpæ *Sacc.* (427) *In capsulis* (Mich. I. p. 179).

Paulownia imperialis *Sieb. et Zucc.*

Discomyceteæ.

Cryptodiscus atrovirens *Cda.* (352) *In ligno indurato* (Mich. I p. 254).

Sphæropsideæ.

Diplodia imperialis *Sacc.* (404) *In ramis decorticatis.*
Phyllosticta Paulowniæ *Sacc.* (371) *In foliis* (Mich. I p. 148).
Rhabdospora (*Septoria*) imperialis *Sacc.* (438) *In ramulis* (Mich. I p. 174).

Labiatæ

Mentha sylvestris *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Menthæ *Pers. em Tul.* (140) *In foliis* (M. S. p. 82).

Hyphomyceteæ.

Ramularia Menthæ *Sacc.* (489) *In foliis* (Mich. II p. 549).

Mentha aquatica *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Menthæ *Fuck.* (140) *In foliis* (M. S. p. 82).

Mentha arvensis *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Menthæ *Fuck.* (140) *In foliis* (M. S. p. 82).

Mentha

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Tulasnei *Nke.* (229) *In caulibus durioribus emortuis* (M. S. p. 142).

Discomyceteæ.

Mollisia (*Pyrenopeziza*) pusilla *Sacc. et Speg.* (337) *In caule emortuo* (Mich. I. p. 423).

Satureja montana *L.*

Sphæropsideæ.

Phoma montana *Speg.* (380) *In ramis emortuis* (Mich. I. p. 482).

Micromeria Juliana *Benth.*

Pyrenomyceteæ.

Pleospora media *Niessl.* (269) *In caulibus* (Mich. I p. 48).

Calamintha parviflora *Lam.* (*C.* Nepeta *H.* et *L.*).

Hypodermeæ.

Puccinia Menthæ *Wint.* (140) (*P. Clinopodii DC.*) *In foliis* (M. S. p. 82).

Calamintha grandiflora *Much.*

Hypodermeæ.

Puccinia Menthæ *Wint.* (*P. Clinopodii DC.*) (140) *In foliis* (M. S. p. 82).

Calamintha

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Tulasnei *Nke.* (229) *In caulibus durioribus emortuis* (M. S. p. 142).

Pleospora vulgaris *Niessl.* (269) *In caule* (Mich. I p 48).

Salvia verticillata *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia obtusa *Schroet.* (140) *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 245).

Salvia glutinosa *L.*

Hymenomyceteæ.

Pistillaria micans *Pers.* (119) *In caule putre* (F. V. V p. 165).

Hypodermeæ.

Puccinia verrucosa var. pallida (*P. Salviæ glutinosæ Ces.*) (Mich. I p. 9).

Pyrenomyceteæ.

Antostomella Tomicoides *Sacc.* (195) *Ad caules putrescentes* (F. V. IV p. 1).

Calonectria ochraceo-pallida *Sacc.* (288) *In caulibus putrescentibus* (F. V. IV p. 23).

Didymosphæria Epidermidis *Fuck.* (236) (F. V. IV 323).

Leptosphæria Doliolum *Ces. et DNtrs.* (243) *In caulibus* (F. V. II p. 314).

Lophiostoma intermedium *Sacc.* (302) *In caulibus putridis.*

Lophiotrema (*Lophiostoma*) vagabundum *Sacc.* (299) *In caulibus* (Mich. I p. 447).

Discomyceteæ.

Stictis Saccardoi *Rehm.* (354). *In caulibus* (F. V. V p. 184.

Sphæropsideæ.

Leptothyrium fœdans *Sacc.* (442). *In foliis.*

Hyphomyceteæ.

Stigmella Montellica *Sacc.* (502). *In foliis petiolisque.*

Salvia pratensis *L.*

Pyrenomyceteæ.

Didymosphæria brunneola *Niessl.* (236). *In caulibus exsiccatis.*
Didymosphæria conoidea *Niessl.* (236). *In caulibus exsiccatis.*
Lophiostoma insidiosum *Ces. et DNtrs.* (302). (Mich. I p. 447).

Hyphomyceteæ.

Ovularia (*Ramularia*). ovata *Fuck.* (479). *In pag. inferiore* (Mich. I p. 266).

Rosmarinus officinalis *L.*

Sphæropsideæ.

Phoma Rosmarini *Speg.* (384). *In ramulis emortuis* (Mich I p. 481).

Nepeta Glechoma *Benth.* (Glechoma hederacea *L.*)

Hypodermeæ.

Puccinia verrucosa *Link.* (*P. Glechomæ D. C.*) (136). *In foliis* (M. S. p. 81).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Glechomæ. *Sacc.* (373). *In foliis* (Mich. I p. 151).

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicola *Sacc.* (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich. I p. 263).
Ramularia calcea *Desm.* (488). *In foliis* (Mich. I p. 266).

Brunella vulgaris *L.*

Sphæropsideæ

Phoma denigrata *Desm. In caule foliisque putridis* (F. V. V p. 202).

Melittis Melissophyllum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Lophiotrema (*Lophiostoma*) vagabundum *Sacc.* (288). *In caulibus* (Mich. I p. 447).

Sphæropsideæ.

Septoria Melittidis *Sacc. et Speg.* (428). *In foliis* (Mich. I p. 182).

Betonica officinalis *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Betonicæ *DC.* (136) *In foliis* (Mich. II p. 530).

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria agnita *Ces. et De Not.* (246) *In caulibus exsiccatis.*

Stachys recta *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Stachydis *DC.* (136) *In foliis, caulibus, calycibus* (F. V. p. 169).

Stachys palustris *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora Stachydis *Thüm.* (155) *In foliis* (Mich. I p. 542).

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe Galeopsidis *DC.* (164) *In foliis.*

Galeopsis Tetrahit *L.* (*G.* versicolor *Curt.*)

Pyrenomyceteæ.

Sphærella umbrosa *Sacc.* (211) *In foliis nondum emortuis* (Mich. I p. 378).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Galeopsidis *Sacc.* (379) *In foliis* (Mich. I p. 150).

Galeopsis grandiflora

Discomyceteæ.

Mollisia (*Nipetera*) brachyspora *Sacc.* (355) *In caule putrescente* (F. V. IV p. 32).

Galeopsis

Pyrenomyceteæ.

Phomatospora Berkéleyi *Sacc.* (105) *In caulibus putrescentibus.*
Erysiphe Galeopsidis *DC.* (164) *In foliis.*

Lamium Orvala

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Tulasnei *Nke.* (229) *In caulibus* (Mich. I. 390).

Discomycetæ.

Stictis minima *Sacc. et Speg.* (253) *In caule putrescente.* (Mich. I p. 421).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Lamii *Sacc.* (369) *In foliis* (Mich. I p. 142).
Septoria heterochroa *Desm. In foliis languidis* (F. V. V p. 206).

Lamium Galeobdolon *Crtz.* (Galeobdolon luteum *Huds*).

Discomyceteæ.

Helotidium (*Helotium*) nanum *Sacc.* (333) *In caule* (F. V. IV p. 36).
Stictis radiata *Pers.* (354) *In ramis dejectis et in caulibus emortuis.* (M. S. p. 156).

Lamium purpureum *L.*

Phycomyceteæ.

Peronospora Lamii *Ar. Br.* (155). *In foliis vivis* (F. V. V p. 172).

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe Guleopsidis *D. C.* (164). *In foliis.*

Lamium album *L.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta Lamiorum *Sacc.* (416). *In foliis* (Mich. I p. 170).
Phillosticta Lamii *Sacc.* (369). *In foliis* (Mich. I p. 142).

Lamium

Sphæropsideæ.

Depazea vagans *Fr. In foliis* (M. S. p. 192).
Leptostroma hypodermoides *Sacc.* (443). *In caule* (Mich. II p. 282).
Phoma multipunctata *Sacc.* (386). *In caulibus emortuis* (Mich. II p. 275).

Septoria Lamii (428). (Mich. I p. 180).

Ballota nigra *L.*

Pyrenomyceteæ.

Ophiobolus pellitus *Sacc.* (278). *In caulibus exsiccatis.*
Ophiobolus (*Rhaphidophora*) ulnosporus *Sacc.* (277) *In caule putrescente* (Mich. I p. 243).
Pleospora media *Niessl.* (269). *In caulibus emortuis.*

Sphæropsideæ.

Depazea balloticola *Fr. In foliis* (M. S. p. 192).

Teucrium Chamaedrys *L.*

Hyphomyceteæ.

Puccinia annularis *Wint.* (*P. Chamædrys Ces*). (135). *In foliis* (Mich I p. 9).

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria maculans *Ces. et DNtrs.* (245). *In caulibus emortuis.*

Sphæropsideæ.

Phillosticta Teucri *Sacc. et Speg.* (369). *In foliis* (Mich. I p. 144).
Septoria Teucri *Sacc*, (430). *In foliis* (Mich. I p. 184).

Hyphomyceteæ.

Ramularia microspora *Thm.* (488). *In hypophillo* (Mich. I p. 475).

Ajuga reptans *L.*

Sphæropsideæ.

Phillosticta Ajugæ *Sacc. et Speg.* (372). *In foliis* (Mich. I p. 150).

Hyphomyceteæ.

Illosporium maculicola *Sacc.* (534). *In maculis arescentibus foliorum* (Mich, I p. 263).
Ramularia Ajugæ *Sacc.* (488) *In foliis* (Mich. I p. 266).

Labiatæ variæ.

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe lamprocarpa *Lév.* (164) *In foliis.*
Lophiostoma intermedium *Sacc.* (302) *In caulibus putridis.*
Ophiobolus (*Rhaphidophora*) pellitus *Fuck.* (178) *In caule* (M. S. p. 210).

Discomyceteæ.

Dinemasporium strigosum *Sacc.* *In caulibus* (Mich. II p. 281).
Helotium scutula *Karst.* (332) *In caule putrescente labiatarum majorum* (F. V. V p. 37).

Hyphomyceteæ.

Dendryphium curtum *B. et Br.* (517) var. ramosius *In lignis putridis ramisque* (Mich. II p. 291).

Verbenaceæ.

Verbena officinalis *L.*

Pyrenomyceteæ.

Didymella (*Didymosphœria*) exigua *Niessl.* (216) *In caulibus* (Mich. I p. 376).

Sphæropsideæ.

Rabdospora verbenicola *Sacc.* (438). *In caulibus et ramis.*
Septoria Verbenæ *Rob. et Desm.* (429) *In foliis* (Mich. I p. 182).

Globulariaceæ.

Globularie cordifolia *L.*

Pyrenomyceteæ.

Melanomma dubiosum *Sacc.* (254) *In trunculis humiferis putrescentibus* (Mich. I p. 403).

Globularia vulgaris *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia grisea *Wint.* (135) *In foliis.*

Sphæropsideæ.

Septoria Globulariæ *Sacc.* (429) *In foliis* (Mich I p. 183)

Primulaceæ.

Primula officinalis *Iacq.*

Hyphomyceteæ.

Ramularia Primulæ *Thüm.* (489) *In foliis.*

Primula integrifolia *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Primulæ integrifoliæ *Niessl.* (133) *In foliis* (F. V. V p. 170).

Soldanella alpina *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia (*Æcidiolum*) Soldanellæ *Fuck.* (140) *In foliis languidis* (Mich. II p. 157).

Sphæropsideæ.

Septoria Soldanellæ *Speg.* (430) *In foliis* (Mich. II p. 167).

Cyclamen europæum *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Cyclaminis *Dur. et Mtgn.* (433) *In foliis* (Mich. I p. 189).

Lysimachia vulgaris *L.*

Hypodermeæ.

Septoria Lysimachiæ *West.* (431) *In foliis* (M. S. p. 197).

Discomyceteæ.

Helotium scutula *Karst.* (332) *In caule putrescente* (F. V. | IV p. 37).

Lysimachia nummularia *L.*

Sphæropsideæ.

Coniosporium capnoidiodes *Sacc.* (497) *In foliis nondum emortuis* (Mich. II p. 557).

Plumbagineæ.

Statice Limonium *L.*

Hypodermeæ.

Æcidium statices *Rudolph.* (149) *In foliis.*

Sphæropsideæ.

Hendersonia martialis *Speg.* (418) *Ad caules emortuos* (Mich. I p. 484).

Polygonaceæ.

Polygonum Convolvulus *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Polygoni *Alb. et Schw.* (147) *In foliis* (M. S. p. 83).

Polygonum Bistorta *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Bistortæ *DC.* (138) *In foliis.*

Sphæropsideæ.

Septoria Polygonorum *Desm.* (429) *In foliis* (Mich. I p. 183).

Hyphomyceteæ.

Bostrichonema alpestre *Ces. In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 543).

Polygonum viviparum *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Bistortæ *Wint.* (*P. Polygoni vivipari Karst.*) *In foliis* (Mich. II p. 156).

Polygonum amphibium *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Polygoni Amphibii *Fuck.* (137) *In foliis* (F. V. V p. 170).

Sphæropsideæ.

Septoria Polygonorum *Desm.* (429) *In foliis* (F. V. V p. 205).

Polygonum Persicaria *L.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta Polygoni *Rabh. In foliis* (M. S. p. 194).
Phyllosticta Polygonorum *Sacc. In foliis* (Mich. I p. 141).

Polygonum Hydropiper *L.*

Hypodermeæ.

Ustilago Hydropiperis *Wint.* (*U. Candollei Tul.*) (128) *In fructibus immaturis* (M. S. p. 73).
Ustilago utriculosa *Tul. In ovariis* (Mich. I p. 7).

Polygonnm aviculare *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Polygoni avicularis *Fuck. In foliis caulibusque* (M. S. p. 86).

Rumex crispus *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Rumicis *Fuck.* (132) *In foliis* (M. S. p. 87).

Rumex Friesii *Gr. et Godr.* (Rumex obtusifolius *D.C.*)

Hypodermeæ.

Uromyces Rumicum *Fuck.* (132) *In foliis* (M. S. 37).
Ustilago Parlatorei *Fisch. In caule et petiolis* (Mich. II p. 155).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe maculosa *Sacc. et Speg.* (234) *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 383).

Hyphomyceteæ.

Ovularia (*Ramularia*) obovata *Fuck.* (479). *In foliis languidis* (F. V. V p. 187).

Rumex Acetosa *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Rumicis *Lasch.* (138) *In foliis* (F. V. V p. 169).
Uromyces Rumicum *Fuck.* (132) *In foliis* (M. S. p. 87).

Phycomyceteæ.

Peronospora Rumicis *Cda.* (155) *In paniculis caulibusque* (F. V. V p. 172).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Acetosæ *Sacc.* (382) *In foliis* (Mich. I p. 151).
Phyllosticta discors *Sacc. et Speg.* (374) *In foliis* (Mich. I p. 154).

Hyphomyceteæ.

Ramularia pratensis *Sacc.* (489) *In foliis* (Mich. II 550).

Rumex

Puccinia Magnusiana *Kœnicke* (*Æcidium Rumicis Schlechd*) (142) *In foliis.*

Amarantaceæ.

Amarantus Blitum *L.*

Phycomyceteæ.

Cystopus Bliti *de Bary* (156) *In foliis* (M. S. p. 89).

Amarantus patulus *Bert,*

Phycomyceteæ.

Cystopus Bliti *de Bary* (156). *In foliis.*

Sphæropsideæ.

Vermicularia Dematium *Fr.* (291) *In caulibus* (M. S. p. 191).

Gomphrena globosa *L.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Gomphrenæ *Sacc. et Speg.* (372). *In foliis* (Mich. I p. 151).

Phytolaccaceæ.

Phytolacca decandra *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sphærella Circe *Sacc.* (212). *In foliis languidis* (F. V. II p. 301).

Hyphomyceteæ.

Ciliciopodium sanguineum *Corda. In caulibus putridis* (Mich. II p. 562).
Fusarium roseum *Linck.* (537) (Mich. II p. 294).

Chenopodiaceæ.

Atriplex

Pyrenomyceteæ.

Pleospora oligomera *Sacc. et Speg.* (268). *In caulibus putrescentibus.*
Pyrenophora calvescens *Sacc.* (271) *In caulibus.*

Sphæropsideæ.

Septoria Atriplicis *Sacc. In foliis* (Mich. I p. 260).

Beta vulgaris *L.* (B. cicla *L.*)

Pyrenomyceteæ.

Giberella Saubinetii (*Botryosphæria pulicaris DNtrs.*) (189). *In foliis* (F. V. IV p. 5).
Pleospora oligomera *Sacc. et Speg. In caulibus putrescentibus.*

Sphæropsideæ.

Depazea Beticola *DC. In foliis* (M. S. 193).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Beticola *Sacc.* (519). *In foliis* (F. V. V p. 189).

Chenopodium polyspermum *L.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Chenopodii *West.* (372). *In foliis* (Mich, I p. 150).

Chenopodium album *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Chenopodii *West.* (430). *In foliis* (M. S. p. 196).

Chenopodium

Phycomyceteæ.

Peronospora effusa *de Bary.* (154). *In foliis* (M. S. p. 88).

Pyrenomyceteæ.

Pyrenophora calvescens *Sacc.* (271). *In caulibus.*

Sphæropsideæ.

Septoria Atriplicis *Sacc. In foliis* (Mich. I p. 190).
Sphæropsis longissima *Fr.* (381). *In caulibus* (M. S, p. 203.)

Salsola Kali *L.*

Pyrenomyceteæ.

Pleospora Salsolæ *Fuck.* (269). *In caulibus emortuis putrescentibus* (Mich. I p. 462).

Schoberia maritima *Mey.*

Hypodermeæ.

Uromyces Chenopodii *Thm.* (134). *In caulibus* (Mich. I 454).

Urticaceæ.

Urtica urens *L.*

Hypodermeæ.

Æcidium Urticæ *DC.* *In foliis* (M. S. p. 85).

Sphæropsideæ.

Septoria Urticæ *Desm.* (432). *In foliis* (Mich. I p. 188).

Urtica dioica *L.*

Hypodermeæ.

Æcidium Urticæ *Schum* (143). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Tulasnei *Nke.* (229). *In caulibus* (Mich. I. p. 390).
Didymella europyrena *Sacc.* (216). *In caulibus* (Mich. II p. 161).
Didymella (*Sphærella*) superflua *Fuck.* (217). *In caulibus emortuis* (M. S. p, 96).
Ophiobolus (*Rhaphidophora*) Urticæ *Rabh.* (277). *In caulibus* (Mich. I p. 542).

Discomyceteæ.

Calloria fusarioides *Tul.* (347). *In caulibus emortuis.*
Helotium herbarum *Fr.* (331). *In caulibus putrescentibus* (Mich. I p. 141).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Urticæ *Sacc.* (369) *In foliis* (Mich. I p. 141).

Hyphomyceteæ.

Ramularia Urticæ *Ces.* (489) (M. S. p. 186).
Volutella gilva *Sacc.* (535) *In caule* (Mich. II p. 298).

Urtica

Pyrenomyceteæ.

Didymosphæria conoidea *Niessl.* (236) *In caulibus exsiccatis.*
Leptosphæria acuta *Karst.* (246) *In caulibus emortuis.*
Leptosphæria conoidea *De Not.* (243) *In caulibus.*
Leptosphæria Doliolum *Ces. et DNtrs.* (243). *In caulibus herbaceis emortuis* (M. S. p. 103 F. V. II p. 314).
Lophiostoma caulinum *Ces. et de Not.* (301) *In caulibus exsiccatis.*
Ophiobolus porphyrogonus *Sacc.* (277) *In caulibus exsiccatis.*
Ophiobolus ulnosporus *Sacc.* (277) *In caulibus putrescentibus.*

Dyscomyceteæ.

Lachnella sulfurea *Sacc.* (327). *In caulibus.*

Sphæropsideæ.

Depazea vagans *Fr. In foliis* (M. S. p. 192).
Phoma herbarum *West.* (380). *In caulibus.*

Parietaria officinalis *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphæria Parietariæ *Sacc.* (244) *In caule putrescente.* (M. S. p. 106).
Ophiobolus vulgaris *Sacc.* (277) *In caulibus.*

Sphæropsideæ.

Coniothyrium Parietariæ *Sacc, et Speg.* (398) *In radicibus emortuis* (Mich. I p. 204).

Hyphomyceteæ.

Ramularia Parietariæ *Pass.* (489) *In foliis* (Mich. I p. 266).

Cannabis sativa *L.*

Pyrenomyceteæ.

Gibberella Saubinetii *Sacc.* (*Botryosphæria dispersa DNtrs.*) (289) *In caulibus putrescentibus* (M. S. p. 117).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Cannabis *Speg.* (370) *In foliis vivis vel languidis* (Mich. II p. 277).
Septoria cannabis *Sacc.* (432) *In foliis nondum emortuis* (Mich. II p. 279).

Humulus Lupulus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Ceriospora Dubyi *Niessl.* (262) *In sarmentis* (Mich. I p. 36).
Diaporthe sarmenticia *Sacc.* (235) *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 386).
Didymella superflua *Sacc.* (217) *In caulibus emortuis.*
Hypoderma commune *Duby* (310) *In caulibus.*
Leptosphæria Doliolum *Ces. et DNtrs.* (243) *In caulibus* (F. V. II p. 314).
Leptosphæria dumetorum *Niessl.* (244) *In caulibus exsiccatis.*
Leptosphæria maculans *Ces. et DNtrs.* (245) *In caulibus* (F. V. II p. 316).
Sphærotheca Castanei *Fuck.* (163) *In foliis* (M. S. p. 90).

Discomyceteæ.

Ciboria bolaris *Fuck.* (345) *In caule* (Mich. I p. 67).
Helotium (*Peziza*) Humuli *Lasch.* (330) *In caulibus* (M. S. p. 211).
Mollisia cæspiticia *Karst.* (335) *In caulibus emortuis.*
Mollisia (*Niptera*) sarmentorum *Sacc.* (335) *In sarmentis* (F. V. IV p. 31).
Stictis Saccardoi *Rehm.* (354) *In caulibus* (Mich. I p. 61).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Humuli *Sacc. et Speg.* (370) *In foliis languidis* (Mich. I p. 144).
Septoria Humuli *West.* (432) *In foliis* (Mich. I p. 188).

Ulmus campestris *L.*

Hymenomyceteæ.

Cyphella albo-violascens *Fr.* (109) *Ad ramulos.*
Polyporus hyspidus *Fr.* (99) *Ad caudices* (M. S. p. 51).
Polyporus squamosus *Fr.* (97) *Ad truncos* (M. S. p. 48).

Hypodermeæ.

Acalyptospora nervisequia *Desm.* (*Puccinia Ulmi DC.*). *In pag. inf. foliorum viventium* (F. V. V 170).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphæria umbrina *De Not.* (237) *In cortice crassiore.*
Anthostoma gastrinum *Sacc.* (197) *In cortice ramorum* (M. S. p. 143).
Antosthoma urophorum *Sacc.* (196) *In ligno putrescente decorticato.*
Chætosphæria phæostroma *Fuck.* (253) *In ramis.*
Cœlosphæria cupularis *Karst.* (172) *In ramis exsiccatis.*
Cryptosporella hypodermia *Sacc.* (207) *In ramis corticatis* (Mich. I p. 369).
Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183) *In cortice ramorum deiectorum* (Mich. I p. 22. M. S. p. 134).
Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183) (Mich. I p. 21).
Diaporthe Eres *Nke.* (224) (F. V. IV p. 12).
Dothidea tetraspora *B. et Br.* (294) *In ramis emortuis.*
Endothia gyrosa *Fuck.* (221) *Ad corticem duriorem et ad ligna denudata* (M. S. p. 146).
Eriosphæria raripila *Sacc.* *In disco rami putrescentis* (F. V. II p. 326).
Eutypa ludibunda *Sacc.* (180) *In ligno* (Mich. I. 151).
Eutypa lata *Tul.* (181) *In ligno et cortice.*
Eutypella stellulata *Sacc.* (179) *In ramis.*
Fenestella princeps *Tul.* (276) *In ramis corticatis.*
Gibberella Saubinetii *Sacc.* (*Botryosphæria pulicaris De Not.*) (289) *In ramis tenellis.*
Leptosphæria massariella *Sacc. et Speg.* (245) *In ramulis* (Mich. I p. 394).
Lophiotrema præmorsum *Sacc.* (298) *In ramis emortuis.*
Massaria fœdans *Fr.* (242) *In ramulis* (Mich. I p. 40).
Massaria Ulmi *Fuck.* (142) *In cortice ramulorum* (M. S. p. 110).
Melanomma Pulvis pyrius *Fuck.* *Sacc.* (253) *In ligno denudato* (M. S. p. 113. Mich. I p. 450).

Melanopsamma (*Eriosphæria*) pomiformis *Sacc.* (218) *In ligno* (Mich. I p. 33).

Nectria abscondita *Sacc. Sub epidermide ramorum emortuorum* (M. S. 123).

Nectria ditissima *Tul.* (283) *In cortice.*

Nectria Peziza *Fr.* (285) *In ligno carioso.*

Nectriella aurea *Sacc. et Speg.* (280) *In cortice duriore* (Mich. I p. 409).

Nummularia discreta *Tul.* (202). *In ramis crassioribus.*

Phyllachora Ulmi *Fuck.* (292) *In foliis* (M. S. p. 144).

Rosellinia thelena *Rabh.* (191) *In ramis corticatis putrescentibus* (F. V. II p. 328).

Robergea unica *Desm.* (312). *In ramulis emortuis.*

Sordaria lanuginosa *Sacc.* (189) *In caulibus ramisque putridis* (Mich. I p. 225)

Uncinula Bivonæ *Lév.* (163) *In foliis* (M. S. p. 209).

Valsa ambiens *Fr.* (177) *In cortice truncorum ramulorunque languentium* (M. S. 131).

Valsa ceratophora *Tul.* (175) (Mich. I p. 19).

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239) *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).

Zignoella (*Melanomma*) Pulviscula *Sacc.* (266) *In ligno denudato exarido* (M. S. p. 114).

Discomyceteæ.

Calloria vulgaris *Sacc.* (348) *In ramis sub cortice decedente* (Mich. I p. 63).

Habrostictis rubra *Fuck.* (352) *In ramis subcorticatis* (Mich. I p. 61).

Lachnella barbata *Fr.* (326) *In lignis putrescentibus* (Mich. I p. 66).

Sphæropsideæ.

Ascochyta ulmella *Sacc.* (415) *In foliis* (Mich. I p. 169).

Camarosporium (*Coniothyrium*) cruciatum *Fuck*, (423) *In ramis* (Mich. I p. 205).

Coniothyrium insitivum *Sacc.* (389) *In ramulis* (Mich. I p. 206).

Coryneum intermedium *Sacc.* (458) *In ramis.*

Cytosporina stellulata *Sacc.* (439) *In ramis.*

Diplodia melæna *Lév.* (406) *In ramis* (M. S. p. 201).

Diplodia tephrostoma *Lév.* (406) *In ramis putridis* (F. V. V. p. 208).

Phoma Eres *Sacc.* (384) *In ramis emortuis.*

Phyllosticta ulmicola *Sacc.* (376 *In foliis* (Mich. I p. 158)
Piggotia astroidea *B. et Br. In foliis* (Mich. I p. 203).
Phleospora (*Septoria*) Ulmi *Fr.* (437) *In foliis* (F. V. V p. 206).
Staurochæta minima *Sacc.* (390) *In ramis corticatis putrescentibus* (F. V. IV p. 41).

Hyphomyceteæ.

Ciliciopodium tuberculariodes *Sacc. In cortice* (Mich. II p. 562).
Fuckelina socia *Sacc.* (504) *In disco* (F. V. V 192).
Fusarium album *Sacc.* (538) *In cortice putrescente.*
Fusarium Sphæriæ *Fuck.* (538) *In ramis, in ostiolis peritheciorum Valsariæ insitivæ* (M. S. p. 188).
Isaria umbrina *Pers.* (527) *In truncis ad stromata juniora Hypoxyli coccinei.*
Sphæridium citrinum *Sacc.* (534) *In ligno putri.*
Sphæridium miniatum *Sacc.* (534) *In disco* (Mich. II p. 561).
Steganosporium compactum *Sacc.* (461) *In ramis emortuis* (Mich. II p. 542).
Uncigera Cordæ *Sacc. et Berl.* (484) *In foliis putrescentibus.*

Melanconieæ.

Coryneum compactum *B. et Br. In ramis emortuis.* (F. V. V p. 198).

Celtis australis *L.*

Hyphomyceteæ.

Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (Mich. I p. 21).
Diaporthe australis *Sacc. et Speg.* (227) *In ramis putrescentibus* (Mich. I p. 30).
Eatypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (239) (Mich. I p. 15).
Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239) *In ramis* (Mich. I p. 32).

Spæropsideæ.

Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398) *In ramis* (Mich. I p. 205).
Phyllosticta destruens *Desm.* (365) *In foliis* (Mich. I p. 134).
Septoria Celtidis *Sacc.* (427) *In foliis languidis* (F. V. V p. 204).

Hyphomyceteæ.

Gyroceras (*Torula*) Celtidis *Biv.* (499). *In pag. inf. foliorum* (M. S. p. 178).
Stachylidium extorre *Sacc.* (508). *In ligno putrescente.*

Morus alba *L.*

Pyrenomyceteæ.

Botriosphæria Bérengeriana *Sacc.* (207). (F. V. IV p. 4).
Colonectria varians *Sacc. In ramis putrescentibus corticatis* (Mich. I p. 52).
Criptovalsa extorris *Sacc. In ramis tandem decorticatis* (F. V. IV p. 17).
Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183). *In cortice ramorum dejectorum* (M S. p. 134).
Cryptovalsa Rabenhoristii *Sacc.* (183). (Mich. I p. 21).
Cucurbitaria Castaneæ *Sacc. var.* moricola (275). *In cortice.*
Diaporthe orientalis *Sacc. et Speg.* (225). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 391).
Eutypa (*Valsa*) ceratophora *Tul.* (182). (Mich. I p. 19)
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).
Gibberella moricola *Sacc.* (289). *In ramis corticatis.*
Massaria epileuca *Wint.* (242). *In ramis corticatis putrescentibus* (Mich. I p. 446).
Melanomma acutum *Sacc.* (254). *In ligno decorticato* (Mich. I p. 402).
Sphærella Mori *Fuck. In foliis* (M. S. p. 209).
Triblidium rhopalascum *Der.* (282). *In ligno indurato* (Mich. I p. 55).
Valsa heteracantha *Sacc. In ramis corticatis* (M. S. p. 129).

Discomyceteæ.

Calloria chrysocoma *Fr.* (346). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 429).
Triblidium hysterinum *Desf. In ligno indurato* (Mich. I p. 55).

Sphæropsideæ.

Camarosporium (*Hendersonia*) Mori *Sacc.* (123). *In ramis* (Mich. I p. 208).
Coniothyrium fœdans *Sacc.* (399). *In ramis corticatis.*
Diplodia Mori *Berk.* (407). *In ramis* (M. S. p. 201).
Phleospora (*Septoria*) Mori *Lév.* (437). *In foliis* (F. V. V p. 204).

Phleospora (*Septoria*) moricola *Pass.* (437). *In foliis* (Mich. I p. 175).

Phoma Mororum *Sacc.* (378). *In ramulis languidis.*

Morus nigra *L.*

Pyrenomycetæ.

Diatrypella verruciformis *Nke.* (184). *In ramis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 151).

Giberella (*Botryosphæria*) pulicaris *Ces. et DNtrs.* (289). *Subsp.* moricola. *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. II p. 5).

Sphæropsideæ.

Diplodia Mori *Berk.* (407). *In ramis* (M. S. p. 201).

Hyphomyceteæ.

Hymenula cinnabarina *Sacc.* (535). *In truncis decorticatis v. corticatis* (Mich. II p. 298).

Hymenula maior *Sacc.* (535). *In truncis denudat. decorticatisve.*

Torula Tuberculariæ *Nees.* (496). *Ad ramos* (M. S. p. 178).

Morus

Hymenomyceteæ.

Fomes (*Polyporus*) Gelsorum *Fr.* (92). (M. S. p. 52).

Polyporus hyspidus *Fr.* (99). *Ad truncos frequentissime* (M. S. p. 51).

Pyrenomyceteæ.

Eutypa scabrosa *Fuck.* (181). *In ligno.*

Gibberella (*Botryosphæria*) moricola *Ces. et DNtrs.* (288). *Ad ramulos* (M. S. p. 117).

Lophiostoma perversum *De Not.* (300). *In ramis.*

Broussonetia papyrifera *Vent.*

Hymenomyceteæ.

Auricularia Sambucina *Mart.* (111). *Ad truncos* (M. S. p. 65).

Hyphula filiformis *Fr.* (119). *In foliis* (Mich. I p. 437).

Pyrenomyceteæ.

Gibberella (*Botryosphæria*) moricola *Ces. et DNtrs.* (258). *Ad ramulos* (M. S. p. 117).

Chætosphæria fusca *Fuck.* (253). *In ramis corticatis decorticatisque* (F. V. IV p. 3).

Chætosphæria phæstroma *Fuck.* (253). *In ramis.*

Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183) *In cortice ramorum deiectorum* (M. S. 134).

Eutypa (*Valsa*) heteracantha *Sacc.* (182) *In ramis corticatis* M. S. p. 129).

Eutypa (*Valsa*) lata *Nke.* (180). *In truncis ramisque decorticatis rarius in ipso cortice* (M. S. p. 128).

Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).

Leptosphæria Coniothyrium *Sacc.* (F. V. II 317).

Melanomma Pulvis-pyrius *Sacc.* (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).

Thyridaria (*Cucurbitaria*) incrustans *Sacc.* (258). *Sub cortice ramorum* (M. S. p. 118) *et in ramis corticatis* (Mich. II p. 252).

Valsaria anserina *Sacc.* (240). *In ramis decorticatis* (F. V. IV p. 19).

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In cortice truncorum ramorumque* (M S. p. 148.)

Discomyceteæ.

Calloria vinosa *Fr.* (316) *In ramis decorticatis dejectis* (M. S. p. 161).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium anserinum *Sacc.* (399). *In ramis decorticatis.*

Coniothyrium incrustans *Sacc.* (398). *In ramis corticatis.*

Diplodia fibriseda *Sacc. In ligno denudato* (Mich. II p. 270).

Diplodia incrustans *Sacc.* (406). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 209).

Phoma Broussonetiæ *Sacc.* (385) *In ramis corticatis.*

Hyphomyceteæ.

Cladotrichum polysporum *Sacc.* (512). *In ramis et in ligno.*

Ficus Carica *L.*

Hypodermeæ.

Uredo Fici *Cast.* (150). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 438).

Pyrenomyceteæ.

Capnodium Footii *Bk. et Desm.* (170). *In foliis coriaceis* Mich. I p. 50).
Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183) (Mich. I p. 21).
Diaporthe cinerascens *Sacc.* (233). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 8).
Diatrypella verruciformis *Nke.* (184)). *In ramis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 151).
Eutypa lata *Tul.* (181). *In ligno et cortice.*
Gibberella (*Botryosphæria*) pulicaris *Ces. et DNtrs.* (289) *Subsp.* kaubinetii (F. V. IV p. 5)
Physalospora gregaria *Sacc. In ramis.*
Thyridium Rousselianum *Sacc. et Speg.* (275). *In ligno* (Mich. I p. 49).
Trematosphæria pertusella *Sacc.* (255). *In ligno denudato ramorum* (Mich. I p. 451).
Valsa coacta *Sacc. et Speg.* (175). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 20).
Valsaria anserina *Sacc.* (240). *In ramis decorticatis* (F. V. IV p. 19).
Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium anserinum *Sacc.* (399). *In ramis decorticatis.*
Diplodia sycina *Mntgn.* (407). *In ramis putridis* (F. V. V p. 209).
Phoma cinerascens *Sacc.* (385). *In ramis* (F. V. V p. 201).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Bolleana *Speg.* (521). *Ad folia viva vel languida* (Mich. I p. 475).
Cercospora sycina *Sacc. In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 556).
Closterosporium claviforme *Pr.* (499). *In ligno putri* (Mich. II p. 289).
Fusarium Urticearum *Cda.* (536). *In ramulis* (Mich. II p. 296).
Sporodesmium sycinum *Thuem.* (501). *In ramis corticatis* (Mich. p. 561).

Maclura aurantiaca *Nutt.*

Sphæropsideæ.

Diplodia Maclurae *Speg.* (407). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 484).

Platanaceæ.

Platanus orientalis *L.* (P. occidentalis *L.*).

Hymenomyceteæ.

Corticium incarnatum *Fr.* (114). *In cortice duriore* (Mich. I p. 240).

Pyrenomycetæ.

Eutypa (*Valsa*) lata *Nke.* (180). *In truncis ramisque decorticatis, rarius in ipso cortice* (M. S. p. 128).
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich.) I p. 15).
Gibberella pulicaris *Sacc.* (288). *In ramis corticatis.*
Laestadia cylindracea *Sacc. et Sp.* (204). *In foliis exaridis.*
Laestadia Veneta *Sacc. et Sp.* (204). *In foliis languidis* (Mich. I p. 369).
Massaria Platani *Ces.* (242) *In ramulis* (Mich. I p. 40).
Pleospora Bardanae *Niessl. var.* Platani *Sacc.* (269). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 49).
Pseudovalsa hapalocystis *Sacc.* (258). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 44).
Rosellinia Aquila *DNtrs.* (191). *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. II 327).
Tryblidium rhopalascum *Sacc.* (306). *In ligno indurato.*

Myxomyceteæ.

Arcyria incarnata *Pers.* (14). *In ligno putrido* (M. S. 171).
Badhamia hyalina *Berk.* (8). *Ad truncos* (F. V. IV 39).
Craterium leucocephalum *Pers.* (10). *In foliis putridis* (Mich. I p. 72).
Hymenula cinnabarina *Sacc.* (335). *In truncis decorticatis v. corticatis* (Mich. II p. 298).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium Platani *Sacc.* (399). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 206).

Diplodia ditior *Sacc.* (*D. paupercula B. et. Br.*) (406). *In ramis emortuis* (F. V. V. 208).

Discosia Artocreas *Fr.* (445). (Mich. I p. 201).

Hendersonia Desmazierii *Mtgn.* (419) *In ramis corticatis* (Mich. I p. 214).

Phyllosticta Platani *Sacc. et Speg.* (374). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 153).

Sclerotium mycetophagum *Sacc.* (543). *Ad truncos putrescentes in Coprino Digitali* (Mich. I p. 274).

Hyphomyceteæ.

Stigmina Visianica *Sacc.* (500). *In foliis deiectis.*

Melanconieæ.

Gleosporium nervisequum *Sacc.* (451). *In nervis foliorum languidorum* (Mich. I p. 262).

Gleosporium Platani *Ond.* (451). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 218).

Myxosporella miniata *Sacc.* (453). *In ramulis corticatis.*

Daphnaceæ.

Daphne Mezereum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Dothidea tetraspora *B. et Br.* (294). *In ramis emortuis.*

Marsonia Daphnes *Sacc. In foliis* (Mich. II p. 541).

Plowrightia (*Dothidea*) Mezerei *Fr.* (294). *In ramis* (M. S. p. 146).

Edgworthia chysantha *Lindl.*

Sphæropsideæ.

Diplodia Edgworthiæ *Sacc.* (405). *In ramis putrescentibus* (Mich. II 537).

Phoma Edgworthiae *Sacc.* (382). *In ramis putrescentisbu* (Mich. II p. 538).

Passerina annua *Wokst.*

Pyrenomyceteæ.

Marsonia andurnensis *Sacc. In caulibus languidis* (Mich. II p. 541).

Lauraceæ.

Laurus nobilis *L.*

Hymenomyceteæ.

Exobasidium Lauri *Geyler* (111). *Ad ramos.*

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella nobilis *Sacc.* (195). *In ramis putresscentibus.*
Circinotrichum maculiforme *Nees.* (506). *In foliis* (Mich. I p. 272).
Diaporthe nobilis *Sacc. et Speg.* (233) *In ramis corticatis* (Mich. I p. 386).
Didymosphæria socialis *Sacc.* (237). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 32).
Eutypa heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis* (F. V. IV. p. 15).
Hypoxylon Michelianum *DNtrs. Ad basim truncorum emortuorum* (F. V. V p. 183).
Lophidium nobile *Sbcc.* (302). *In ramis corticatis.*
Metasphæria (*Leptosphæria*) nobilis *Sacc.* (261) *In foliis* (F. V. II p. 312).
Microthyrium microscopicum *Desm.* (295). *In foliis* (Mich. I p. 381).
Nectria sanguinea *Fr.* (284). *In ramulis putrescentibus* (Mich. I 51).
Nectria laurina *Sacc.* (284). *In ramulis putrescentibus.*
Sphærostilbe coccophila *Tul. In cortice* (Mich. II 256).
Tricosphæria nobilis *Sacc. et Speg.* (206). *In fragmentis lignei s* (Mich. I p. 247).
Theicospora obducens *Fuck.* (273). *In lignis putridis.*
Valsaria Saccardiana *Speg.* (240). *In ligno putri* (Mich. I p. 393).
Venturia nobilis *Sacc.* (219). *In foliis emortuis* (F. V. V 174).

Discomyceteæ.

Staegia (*Naevia Cald.*) Lauri *Sacc.* (357). *In foliis* (M. S. 211).

Sphæropsideæ.

Ceuthospora Lauri *Grev.* (397). *In foliis emortuis* (Mich. II p. 263).
Diplodia laurina *Sacc.* (406). *In ramis putrescentibus* (F. V. V p. 209).
Discosia Artocreas *Fr.* (445). (Mich. I p. 201).
Ectostroma Lauri *Fr.* *In foliis dejectis* (F. V. V 210).
Hendersonia sarmentorum *West.* (418). (Mich. I p. 214).
Phoma Berkeley *Sacc.* (381). *In caulibus putrescentibus.*
Phyllosticta laurella *Sacc.* (375). *In foliis* (Mich. I p. 157).
Phyllosticta Lauri *West.* (366). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 135).

Hyphomyceteæ.

Acrocylindrium granulosum *Bon.* (482). *In ramulis foliisque* (F. V. V p. 194).
Chætopsis stachyobola *Corda.* (507). *In fol. putrescentibus.*
Himantia candida *Pers.* (545). *In foliis dejectis* (F, V. V p. 210).
Verticillium Candelabrum *Bon.* (481). *In foliis coacervatis* (F. V. V p. 194).

Melanconieæ.

Trullula olivascens *Sacc.* (453). *In ramis putridis.*

Camphora officinalis *N. v. E.*

Sphæropsideæ.

Discosia Artocreas *Fr. f.* Camphoræ. (445). *In foliis* (Mich. II p. 281).
Phyllosticta aromatophila *Sacc.* (366). *In foliis* (Mich. II p. 276).

Oreodaphne fœtens *Nees.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta Oreodaphnes *Sacc.* (412). *In foliis languidis* (Mich. II p. 538).

Cinnamomum dulce *Nees.*

Sphæropsideæ.

Phoma Cinnamoni *Sacc.* (379). *In foliis semi-exsiccatis* (Mich. II p. 274).
Vermicularia ambigua *Sacc.* (392). *In foliorum partibus arescentibus* (Mich. II p. 271).

Eleagnaceæ.

Hipophaë rhamnoides *L.*

Pyrenomyceteæ.

Melanomma alpinum *Speg.* (254). *Ad ramulus emortuos* (Mich. I p. 460).
Phomatospora Berkeleyi *Sacc.* (205). *In ramulis* (F. V. II p. 396).

Discomyceteæ.

Pseudopeziza (*Trochila*) perexigua *Speg.* (256). *Ad folia dejecta putrescentia* (Mich. II p. 261).

Elæagnus reflexus

Pyrenomyceteæ.

Capnodium Footii *Berk. et Desm.* (170). *In foliis.*

Sphæropsideæ.

Phoma Elæagni *Sacc.* (379). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 254).
Septoria argyrea *Sacc.* (427).

Santalaceæ.

Thesium intermedium *Schrad.* (Thesium Linophyllum *L.*)

Hypodermeæ.

Puccinia Thesii Chaill. em. *Fuck.* (139). *In foliis* (M. S. p. 82).

Aristolochiaceæ.

Asarum europæum *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Asari *Sacc.* (428). *In foliis* (Mich. I p. 182).

Aristolochia pallida *W.*

Hypodermeæ.

Puccinia Aristolochiarum *Cda.* (139). *In foliis* (Mich. I p. 9).

Aristolochia rotunda *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Aristolochiarum *Cda.* (139). *In foliis* (F. V. V p. 168).

Aristolochia Clematitis *L.*

Hypodermeæ.

Aecidium Aristolochiæ *Rabh.* (139). *In foliis* (Mich. I p. 242).

Pyrenomyceteæ.

Septoria Aristolochiæ *Sacc.* (434). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 191).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Aristolochiæ *Sacc.* (413). *In foliis* (Mich. I p. 165).
Sacidium Spegazzinianum *Sacc.* (444). *In foliis languidis.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora olivascens *Sacc.* (518). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 268).

Aristolochia

Hypodermeæ.

Puccinia Aristolochiarum *Cda.* (139). *In foliis* (Mich. I p. 9).

Euphorbiaceæ.

Euphorbia Chamæsyce *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces scutellatus *Sacc.* (132). *In foliis* (M. S. p. 87).
Uromyces proemines *Lév.* (132). *In foliis.*

Euphorbia palustris *L.*

Hypodermeæ.

Æcidium Euphorbiæ *Gm.* (149) *In foliis.*

Hyphomyceteæ.

Cladosporium æcidiicola *Thm.* (511) *Parasitans ad folia in Aecidio Euphorbiae* (Mich. I p. 476).

Euphorbia dulcis *L.*

Hypodermeæ.

Aecidiolum exanthematicum *Ung.* (135). *In foliis* (Mich. I p. 11).
Aecidium Euphorbiæ *Gm.* (149). *In foliis.*
Melampsora Helioscopiæ *Wint.* (147). (M. *Euphorbiæ Cast.*) (M. S. p. 78).
Uromyces excavatus *Magn.* (132). *In foliis.*
Uromyces scutellatus *Lév.* (132). (Mich. I p. 8).

Pyrenomyceteæ.

Gnomoniella (*Gnomonia*) devexa *Awd.* (204). *In caulibus* (Mich. I. p. 28).

Euphorbia spinosa *L.*

Melanconieæ.

Pestalozzia microsora *Sacc.* *In caule* (Mich. II p. 284).

Euphorbia helioscopia *L.*

Hypodermeæ.

Melampsora Helioscopiæ *Wint.* (*M. Euphorbiae Cast.*) (147). *In foliis* (M. S. p. 78).

Euphorbia Peplus *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces scutellatus *Sacc.* (132).
Melampsora Helioscopiæ *Wint.* (*Melampsora Euphorbiae Cast.*) (147). *In foliis* (M. S. p. 78).

Euphorbia Gerardiana *Jacq.* (E. Seguieri *Vill.*)

Hypodermeæ.

Uromyces scutellatus *Sacc.* (132). *In foliis* (M. S. p. 87).

Euphorbia Cyparissias *L.*

Hypodermeæ.

Aecidium Cyparissiæ *DC.* (135). *In foliis* (Mich. I p. 242)
Aecidiolum exanthematicum *Ung.* *In foliis* (Mich. I p. 11).
Melampsora Helioscopiæ (147). *In foliis.*
Uromyces excavatus *Magn.* (132). *In foliis.*
Uromyces scutellatus *Lév.* (132). *In foliis* (F. V. V p. 171).
Uromyces tuberculatus *Fuck* (132). *In foliis* (Mich. I p. 8).

Phycomyceteæ.

Peronospora Cyparissiæ *De Bary* (155). *In foliis* (Mich. I p. 454).

Pyrenomyceteæ.

Gnomonia tetraspora *Wint.* (217). *In caule putrescente* (Mich. I p. 382)
Leptosphæria Euphorbiæ *Niessl.* (244). *In caule putrescente* (Mich. I p. 397).
Physalospora minutula *Sacc. et Speg.* (205). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 370).

Sphæropsideæ

Phoma cyclospora *Sacc.* (386). *In caulibus emortuis.*

Euphorbia amygdaloides *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Euphorbiæ *Cooke.* (228). (F. V. IV p. 12).
Lophiostoma insidiosum *Ces. et DNtrs.* (302). (Mich. I p. 447).

Euphorbia platyphyllos *L.*

Hypodermeæ.

Melampsora Helioscopiæ *Wint.* (147) *In foliis.*

Euphorbia virgata *W. et Kit.*

Hypodermeæ.

Uromyces scutellatus *Lév.* (132). *In foliis.*

Euphorbia Cactus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Dothiorella Euphorbii *Sacc.* (392). *In caulibus putrescentibus.*

Euphorbia

Pyrenomyceteæ.

Pleospora platyspora *Sacc.* (269). *In caule emortuo* (Mich. II p. 251).

Mercurialis perennis *L.*

Pyrenomyceteæ.

Capnodium Footii *Berk. et Desm.* (170). *In foliis.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora Mercurialis *Pass.* (519). *Ad folia viva vel languida* (Mich. I p. 476).

Ricinus communis *L.*

Hyphomyceteæ.

Fusisporium Ricini *Béreng.* (539). *In caulibus* (M. S. p. 189).
Scherotium durum *Pers.* (543). *In caulibus putrescentibus.*

Buxus sempervirens *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Buxi *DC. em Fuck.* (135). *In foliis* (M. S. p. 83).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe retecta *Fuck. et Nke.* (233). *In ramis* (M. S. 211).
Ditopella Vizeana *Sacc. et Speg.* (206). *In ramulis* (Mich. I p 248).
Fracchiæa heterogenea *Sacc.* (173). *In ramis corticatis decorticatisque exsiccatis* (M. S. p. 115).
Hypocrea rufa *Fr.* (286). *In ramis* (F. V. IV p. 24).
Hyponectria Buxi *Sacc.* (281). *In foliis emortuis.*
Metasphæria (*Leptosphæria*) papulosa *Sacc.* (261). *In foliis aridis* (F. V. II. p. 813).
Microthyrium microscopicum *Desm.* (*Sphaerella Buxi Fuck.*) (295). *In foliis ramulisque iunioribus dejectis* (M. S. p. 93).
Nectria Desmazieri *DNtrs.* (284). *In ramis.*
Nectriella Rousseliana *Sacc.* (281). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 51).

Myxomyceteæ.

Lamproderma nigrescens *Sacc.* (12). *In foliis dejectis* (Mich. II p. 262).
Physarum didermoides *Rost.* (10). *In ramulis, foliis, fustulis.*

Sphæropsideæ.

Arcospora Rousseliana *Fuck.* *In foliis* (M. S. p. 209).
Ascochyta buxina *Sacc.* (415). *In foliis.*
Ascochyta limbalis *Sacc.* (411). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 161).
Diplodia buxella *Sacc.* (406). *In ramis* (Mich. II p. 266).
Diplodia Buxi *Fr.* (409). *In foliis dejectis putribus* (F. V. V p. 209)

Phoma Candollei *Sacc.* (379). *In foliis dejectis* (Mich. II p. 274).
Phoma Mirbelii *Sacc.* (379). *In foliis* (Mich. II p. 274).
Phoma phacidioides *Sacc.* (379), *In foliis emortuis* (Mich. II p. 274).
Phoma stitica *B. et Br.* (384). *In ramis putrescentibus* (F. V. V p. 200).
Phyllosticta buxina *Sacc.* (367). *In foliis.* (Mich. I p. 137).

Melanconieæ.

Pestalozzia funerea *Desm. var.* discolor. (459). *In foliis emortuis* (Mich. I p. 478).

Hyphomyceteæ.

Fusarium roseum *Link.* (537). *In foliis.*
Helminthosporium hormiscioides *Sacc.* (513). *In ramis putrescentibus.*
Microthyrium microscopicum *Desm.* (295). *In foliis emortuis* (Mich. I p. 381).
Trinacrium subtile *Ricss.* (469). *Ad folia* (Mich. II p. 553).
Tubercularia versicolor *Sacc.* (532). *In ramis dejectis* (F. V. V p. 197).
Verticillium Buxi *Sacc.* (482). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II. p. 553). (Mich. II p. 288).
Volutella Buxi *Berk.* (535). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 299).

Buxus balerica *Lam.*

Hyphomyceteæ.

Fusarium roseum *Link.* (537). *In foliis* (Mich. II p. 294).
Volutella Buxi *Berk.* (535). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 299).

Ceratophylleæ.

Ceratophyllum

Hyphomyceteæ.

Leptomitus Ceratophylli *Ag.* (M. S. 175).

Juglandaceæ.

Juglans regia *L.*

Hymenomyceteæ.

Corticium roseum *Pers.* (114). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 6).
Fomes (*Polyporus*) fomentarius *Fr.* (92). *Ad truncos* (M. S. p. 52).
Lenzites variegata *Fr.* (62) *In truncis.*
Pleurotus (*Agaricus*) lignicola *Sacc.* (49). *In trunco dejecto* (M. S. p. 21).
Polyporus fraxineus *Fr.* (99). *Ad truncos* (M. S. p. 52).
Polyporus hyspidus *Fr.* (99). *Ad caudices raro* (M. S. p. 51).
Stereum accrinum *Fr.* (112). *In cortice* (M, S. p. 63).

Pyrenomyceteæ.

Botryosphæria Bérengeriana *Sacc.* (207). *In cortice, sub epidermide et raro supra epidermide ramorum truncorunque tabescentium.* (F. V. IV p. 4).
Ceratostoma graphioides *Sacc.* (187). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 246).
Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183). (Mich. I p. 22).
Diaporthe juglandina *Nke.* (231) (F. V. IV p. 12).
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).
Giberella pulicaris *Sacc.* (288), *In ramis corticatis.*
Gnomonia leptostyla *Ces. et D. Ntrs.* (218). *In foliis petrescentibus* (Mich. I p. 28).
Hysterium pulicare *Pers.* (306). *In cortice duriore.*
Lophiostoma macrostomum *D. Ntrs.* (301). *In cortice duriore.*
Melanconis Carthusiana *Tul. In ramis* (F. V. IV 20).
Melanopsamma (*Eriosphaeria*) pomiformis *Sacc.* (218). *In ligno* (Mich. I p. 33).
Nectria punicea *Fr. In ramis emortuis* (Mich. II p. 255).
Nectria sanguinea *Fr.* (284). *In ligno et cortice udo.*
Rosellinia pulveraceæ *Fuck.* (192). *In ligno* (F. V. II p. 329).
Sphæria Veronensis *Mass. Ad truncos emorcidos* (M. S. p. 99).
Teichospora trabicola *Fuck.* (272). *In lignis.*
Thyridaria incrustans *Sacc. In ramis corticatis* (F. V. IV p. 14).
Thyronectria patavina *Sacc.* (289). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 23).
Valsaria rubricosa *Sacc.* (230). *In cortice.*

Sphæropsideæ.

Coniothyrium incrustans *Sacc.* (398). *In ramis corticatis.*
Cytispora juglandina *Sacc.* (396). *In cortice ramorun* (Mich. II p. 264).
Cytisporina heteracantha *Sacc.* (440). *In ramis.*
Cytisporina (*Cytispora*) juglandicola, *Sacc.* (439). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 263).
Diplodia fibriseda *Sacc.* *In ligno denudato* (Mich. II p, 270).
Diplodia Juglandis *Fr.* (406). *In ramis* (M. S. p. 201).
Phoma juglandina *Sacc.* (385). *In ramulis corticatis.*
Phyllosticta (*Depazea*) Juglandina *Sacc.* (374). *In foliis* (Mich. I p. 155).
Phyllosticta Juglandis *Sacc.* (366). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 155).

Hyphomyceteæ.

Aspergillus ochraceo-ruber *Sacc.* (472). *In ligno putrescente.*
Helicotrichum (*Helicosporium*) obscurum *Corda.* (507). *In ramis dejectis putrescentibus* (M. S. p. 179).
Hypoderma roseum *Fr.* (475). *In ligno putrescente.*
Microstroma leucosporum *Niessl.* (479). *In pag. inf. foliorum languidorum* (Mich. II p. 543).
Ozonium lignorum *Fic.* (545). *In ligno putrescente* (Mich. II p. 300).

Melanconieæ.

Marsonia (*Glœsporium*) Juglandis *Mtgn.* (456). *In foliis* (F. V. V p. 202).
Melanconium juglandinum *Kunze.* (455). *In ramis.*

Salicaceæ.

Salix babilonica *L.*

Hymenomyceteæ.

Polyporus popalinus *Fr.* (99). *Ad truncos.*

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella limitata *Sacc.* (195). *In caulibus ramulisque tenuioribus* (F. V. IV p. 2).
Diaporthe forabilis *Nke.* (226). *In ramis dejectis putrescentibus* (M. S. p. 141).
Didymosphæria Epidermidis *Fuck.* (236), (F, V. II p. 323).
Eriosphæria exigua *Sacc.* (220). *Supra epidermidem ramulorum putrescentium* (F. Vi II p. 324).
Eutypa heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis* (F. V. IV p. 15).
Fenestella (*Thyridium*) vestita *Fuck.* (276), *In ramis putrescentibus* (F. V. IV p. 14).
Nectria squamuligera *Sacc.* (285). *In ramulis* (F. V, IV p. 22).
Valsa translucens *D. Ntrs.* (178). *In ramulis* (M. S. p. 134).

Sphæropsideæ.

Cytosporina heteracantha *Sacc.* (440). *In ramis*,

Hyphomyceteæ.

Dactylium macrosporum *Fr.* (485). *In cortice putrescente* (F. V. V p. 196).
Sporoschisma mirabile *Berk.* (516). *In truncis decorticatis putribus.* (F. V, V p, 191).
Tubercularia pusilla *Sacc.* (532). *In ramis.*

Salix alba *L.* (S. vitellina *L.*)

Pyrenomyceteæ.

Acanthostigma revocatum (*Lasiosphæria perpusilla*) *Sacc.* (265). *In ligno denudato* (F. V. II p. 327).
Anthostomella intermedia *Sacc.* (195). *In ramis putrescentibus.*
Botryosphæria Bérengeriana *D. Ntrs.* (207). (F. V. IV p. 4).
Cryptosphæria (*Valsa*) millepunctata *Nke.* (182). *In cortice ramorum* (M. S. p. 127).
Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183). (Mich. I p. 22).
Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183). (Mich. I p. 21).
Cucurbitaria salicina *Fuck.* (275). *In ramis* (M. S p. 120).
Diaporthe salicella *Sacc. In ramis emortuis* (M. S. p. 135).
Eutypa (*Valsa*) heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis corticatis* (M. S. p. 129).

Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).
Hypoxylon rubiginosum *Fr.* (200). (F. V. IV p. 22).
Hypoxylon semiimmersum *Nits.* (201). *In lignis emortuis.*
Leptosphæria Coniothyrium *Sacc.* (244). (F. V. II p. 317).
Leptosphæria vagabunda (*Sphæria fuscella*) *Berk. et Br.* (245). (M. S. p. 98).
Melanopsamma Petrucciana *Sacc.* (218). *In cortice.*
Nectria coccinea *Fr.* (283). *Ad cortices ramorum* (M. S. p. 123).
Rosellinia malocotrichia *Niessl.* (193). *In pag. inf. corticis durioris* (F. V. II p. 328),
Valsa salicina *Fr.* (178). *In ramis.*
Valsa traslucens *D. Ntrs.* (178). *In ramulis.*
Valsa verrucula *Nke.* (175). *In ramulis* (F. V. IV p. 16).
Venturia chlorospora *Karst.* (219). (Mich. I p. 382).

Discomyceteæ.

Fusarium Salicis *Fuck.* (537). *In ramulis et ostiolis Valsæ salicinae* (M. S. p. 188).

Sphæropsideæ.

Diplodia salicella *Sacc.* (409). *In foliis putrescentibus* (Mich. II p. 270).
Hendersonia sarmentorum *West.* (418). (Mich. I p. 214).

Hyphomyceteæ.

Fusidium carneolum *Sacc.* (469). *In ramulis exsiccatis.*
Ramularia rosea *Sacc.* (486). *In pag. inf, foliorum* (Mich. II p. 550).

Salix fragilis *L.*

Pyrenomyceteæ.

Laphiotrema littorale *Speg. In ligno decorticato* (Mich. I p. 466).
Valsa salicina *Fr.* (178). *In ramis.*
Valsa translucens *D. Ntrs.* (178). *In ramulis.*

Discomyceteæ.

Ocellaria (*Propolis*) parvula *Speg.* (352). *Ad ramulos languidos v. emortuos* (Mich. II p. 165).

Salix cinerea *L.*

Hypodermeæ.

Melampsora Salicis Capreæ *Wint.* (*M. salicina Lév.*) (146). *In foliis* (M. S. p. 77).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe valicella *Sacc.* (223). *In ramis.*
Valsa Anerswaldi *Nits.* (178). *In ramis.*

Sphæropsideæ.

Septoria salicicola *Sacc.* (424). *In foliis* (Mich. I p. 171).

Salix Caprea *L.*

Hypodermeæ.

Melampsora Salicis Capreæ *Wint.* (*M. salicina Lév.*) (146). *In foliis* M. S. p. 77).

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe Spina *Fuck.* (234). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 384).
Linospora Capreæ *Fuck.* (278). *In foliis putrescentibus* (M. S. p. 101).
Valsa Schweinizii *Nke.* (176). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 20).

Discomyceteæ.

Pseudopeziza (*Trochila*) Populorum *Desm.* (356). *In foliis dejectis putrescentibus* (Mich. I p. 470).

Salix nigricans *Sm.*

Pyrenomyceteæ.

Sphærella salicicola *Fuck.* (209). *In foliis* (M. S. p. 95).

Discomyceteæ.

Rhytisma salicinum *Fr.* (359). *In foliis* (M. S. p. 160).

Salix purpurea *L.*

Pyrenomyceteæ.

Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183). (Mich. I p. 22).
Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (245). (F. V. II p. 318).
Rosellinia ligniaria *Nke.* (193). *In cortice duriore v. ligno denudato putre* (F. V. II p. 328).
Uncinula adunca *Lév.* (163). *In foliis* (M. S. p. 91).
Valsa translucens *DNtrs.* (178). *In ramulis.*

Discomyceteæ.

Rhytisma salicinum *Fr.* (359). *In foliis* (M. S. p. 166).
Sacidium Venetum *Speg.* (444). *Ad folia viva* (Mich. I p. 487).

Salix triandra

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe salicella *Sacc.* (223). *In ramis.*
Sphærella salicicola *Fuck.* (209). *In foliis.*
Valsa salicina *Fr.* (178). *In ramis.*

Salix

Hymenomycteæ.

Collybia (*Agaricus*) velutipes *Curt.* (44). *Ad truncos* (M. S. p. 18).
Exidia recisa *Fr.* (120) *In ramulis corticatis* (F. V. V p. 166).
Pleurotus applicatus *Batsch.* (51).
Polyporus fumosus *Fr.* (98). (M. S. p. 50).
Polyporus picipes *Fr.* (97). *Ad truncos* (M. S. 49).
Polyporus salignus *Fr.* (96). *Ad basim truncorum* (M. S. p. 49).
Polyporus sanguinolentus *Fr* (94). *In trunculis* (F. V. V p. 164).
Solenia anomala *Fuck.* (86). *In ramis dejectis* (Mich. II p. 244).
Stereum Boltonii *Sacc.* (112). *In truncis emortuis* (Mich. I p. 239).
Trametes hispida *Bagl.* (91). *Ad truncos languentes.*
Trametes rubescens *Fr.* (91). *In truncis* (Mich. I p. 436).
Trametes suaveolens *Fr.* (91). *Ad basim truncorum.*

Pyrenomyceteæ.

Amphisphæria foeda *DNtrs.* (238). *In palis cariosis* (M. S. p. 112).

Amphisphæria papillata *DNtrs.* (238). *In ligno carioso* (M. S. p. 112).

Amphisphæria umbrina *DNtrs.* (237). *In cortice duriore* (M. S. p. 111).

Apiosporium Salicis *Kze.* (167).

Botryosphæria Bérengeriana *DNtrs.* (207). *In cortice* (Mich. I p. 116).

Calosphaeria minima *Tul.* (174). *In ramis.*

Capnodium salicinum *Tul.* (169). *In foliis.*

Chilonectria cucurbitula *Sacc.* (281). *In ramis corticatis emortuis.*

Cryptosphæria ocellata *Sacc.* (183). *In ramis.*

Diatrype bullata *Fr.* (184). *In ramis emortuis.*

Diatrypella verruciformis *Nits.* (184). *In ramis.*

Didymosphæria Epidermidis *Fuck.* (236). *In ramis corticatis.*

Eutypa flavo-virens *Tul.* (181). *In cortice atque in ligno.*

Eutypa lævata *Sacc.* (181). *In ramis et in ligno.*

Eutypa lata *Tul.* (181). *In ligno et cortice.*

Fenestella princeps *Tul.* (276). *In ramis corticatis.*

Gibberella pulicaris *Sacc.* (288). *In ramis corticatis.*

Glonium lineare *De Not.* (305). *In ligno vetusto.*

Hypoderma virgultorum *DC.* (310). *In sarmentis emortuis.*

Hypoxylon effusum *Nits.* (201). *In ramis corticatis.*

Hypoxylon multiforme *Fr.* (200). *In ligno putre* (F. V. V p. 184).

Hypoxylon serpens *Fr.* (201). *In ligno putrescente.*

Hysterographium elogatum *Corda.* (309). *In ligno.*

Hysterographium Megalographa *Anzi* (309). *In ligno v. cortice duriore* (Mich. I p. 57).

Lophidium compressum. *Sacc.* (302). *In ligno.*

Lophiostoma excipuliforme *Ces. et DNtrs.* (301). *In cortice duriore* (Mich. I p. 43).

Lophiostoma macrostomoides *De Not.* (300). *In periderma.*

Lophiostoma macrostomum *De Not.* (301). *In cortice.*

Lophiotrema duplex *Sacc.* (298). *In lignis ramisque.*

Lophiotrema (*Lophiostoma*) Nucula *Fuck.* (298). *In cortice duriore* (Mich. I p. 468).

Melomastia Friesii *Nits.* (266). *In ramis truncisque decorticatis.*

Ostropa cinerea *Fr.* (312). *In ramis exsiccatis.*

Physalospora gregaria *Sacc.* (205). *In ramis corticatis.*

Trematosphæria pertusa *Fuck.* (255). *In lignis exsiccatis.*

Valsa salicina *Fr.* (178). *In ramis* (M. S. 132).

Xylaria fragilis *Sacc.* (199). *Sub cortice.*

Discomyceteæ.

Coniosporium phæospermum *Sacc.* (497). *In lignis putridis* (Mich. II p. 292).

Helotium salicellum *Fuck. In ramulis putrescentibus* (M. S. p. 165).
Propolis faginea *Karst.* (352). *In ramulis* (Mich. I p. 421).

Myxomyceteæ.

Badhamia inaurata *Curr.* (8). *In muscis* (Mich. I p. 545).

Sphæropsideæ.

Asteroma Salicis *Rob. et Desm.* (390). *In foliis deiectis.*
Aposphæria (*Phoma*) Pulviscula *Sacc.* (387). *In ligno udo* (Mich. I p. 259).
Cytospora flavo-virens *Sacc.* (396). *In cortice et ligno.*
Cytospora fugax *Fr.* (396). *In ramis.*
Cytospora Salicis *Rab.* (396). *In ramis.*
Cytospora Schweinitzii *Sacc.* (396). *In ramis.*
Cytospora translucens *Sacc.* (396). *In ramis.*
Discella carbonacea *B. et Br.* (447). *In ramis corticatis.*
Dothiorella gregaria *Sacc.* (392). *In ramis corticatis.*
Rhabdospora (*Septoria*) diaporthoides *Sacc.* (438). *In ramis* (Mich. II p. 278).
Sphæronema Spinella *Fr.* (388). *In ramis.*

Hyphomyceteæ.

Arthrobotrym atrum *Berk. et Br.* (530). *In ramulis putrescentibus* (M. S. p. 181).
Aspergillus flavus *Link.*, (472). *Ad truncos* (M. S. p. 184).
Botrytis geniculata *Corda* (476). *In ramis.*
Circinotricum maculiforme *Nees.* (506). *In ramis putrescentibus* (Mich. I p. 272).
Coniothecium applanatum *Sacc.* (502). *In ligno putri.* (Mich. II p. 173).
Cylindrium heteronemum *Sacc.* (469). *In disco truncorum putrescentium.*
Dendryphium toruloides *Sacc.* (517). *In ramis* (F. V. V p. 191).
Fumago vagans *Pers.* (523). *In foliis* (M. S. p. 108).
Haplaria grisea *Link.* (474). *In cortice putrescente* (Mich. II p. 544).
Helicomyces roseus *Link.* (469). *In ramis lignisque* (Mich. II p. 287).
Helicotrichum obscurum *Sacc.* (507). *In ramis putrescentibus.*
Isaria clavata *Ditm.* (526). *In cortice putri* (Mich. II p. 299).
Septonema atrum *Sacc.* (499). *In ligno putri* (Mich. II p. 559).
Tubercularia vulgaris *Pers.* (532). *In ramis.*

Melanconieæ.

Pestalozzia truncatula *Fuck.* (460). *In ligno ramisque.*

Populus alba *L.*

Hymenomyceteæ.

Polyporus populinus *Fr.* (99). *Ad truncos.*

Pyrenomyceteæ.

Cryptosphæria populina *Sacc.* (182). *In ramis emortuis.*
Hypocopra phyllogena. *Sacc.* (190). *In pag. inf. foliorum putrescentium.*
Leptosphæria Aegira *Sacc. et Speg.* (247). *In foliis languidis* (Mich. I p. 37).
Leptosphæria Alcides *Sacc.* (248). *In pag. sup. foliorum* (F. V. V p. 176).
Sordaria fermenti *Wint. In pag. inf. foliorum putrium* (Mich. I p. 273).
Sphærella crassa *Awd.* (209). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 35).

Tuberaceæ.

Tuber brumale *Vitt.* (360). *Ad terram, præcipue inter radices* (Mich. II p. 534).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Alcides *Sacc.* (366). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 135).
Phyllosticta populea *Sacc.* (366). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 135).

Melanconieæ.

Gloeosporium Populi albæ *Desm.* (452). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 219).

Populus canescens *Sm.*

Pyrenomyceteæ.

Valsa nivea *Fr.* v. tetraspora (178). *In ramulis* (Mich. II p. 254).

Populus tremula *L.*

Hymenomyceteæ.

Panus conchatus *Fr.* (62). *Ad truncos.*

Hypodermeæ.

Melampsora populina *Wint.* (*M. Tremulae Tul.*) (146). *In pag. inf. foliorum* (F. V. *V* p. 168).

Pyrenomyceteæ.

Cryptosporella Veneta *Sacc.* (207). *In ramis* (Mich. I p. 31).
Didymosphæria socialis *Sacc.* (F. V. II p. 324).
Sphærella macularis *Fuck.* (209). *In foliis* (M. S. p. 95).

Discomyceteæ.

Tympanis (*Cenangium*) populina *Fuck.* (344). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. II p. 260).

Sphæropsideæ.

Depazea tremulicola *DC. In foliis* (M. S. p. 193).
Discosia Julia *Speg.* (445). *Ad folia* (Mich. II p. 281).
Sphæronema polymorphum *var.* affine *Sacc.* (388). *In ramis corticatis.*

Hyphomyceteæ.

Cladosporium Asteroma *Fuck.* (511). *In pag. sup. foliorum languentium* (Mich. I p. 271).

Melanconieæ.

Coryneum intermedium *Sacc.* (458). *In ramis,*

Populus nigra *L.* (P. pyramidalis *Raz.* P. pubescens *Parl.* P. italica *Doroi.*)

Hymenomyceteæ.

Polyporus castaneus *Fr.* (99). *Ad caudices* (M. S. p. 52).

Hypodermeæ.

Melampsora populina *Lév.* (146). (M. S. 77).

Pyrenomyceteæ.

Cryptosphæria (*Valsa*) millepunctata *Nke.* (182). *In cortice ramorum* (M. S. p. 127).
Cryptosphæria populina *Sacc.* (182). *In ramis.*
Eurotium repens *DBy.* (166). *In foliis putrescentibus* (F. V. V p 173).
Eutypa (*Valsa*) ancirina *Sacc.* (182). *In cortice* (Mich. I p. 18).
Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).
Hypoxylon luridum *Nke.* *In ramis corticatis* (Mich. I p. 24).
Lophiostoma Balsamianum *DNtrs.* (301). *Ad cortices duriores* (M. S. p. 110)
Sphærella Populi *Awd.* (209). *In foliis languidis* (F. V. *V* p. 175).
Teicospora patellarioides *Sacc.* (273). *In ligno decorticato dealbato* (Mich. I p. 47).
Trematosphæria (*Caryospora*) callicarpa *Nke.* (255). *In cortice duriore* (Mich. I p. 151).
Uncinula adunca *Lév.* (163). *In foliis* (M. S. p. 91).
Valsa nivea *Fr.* (178). *In ramulis* (M. S. p. 134).
Valsa sordida *Nke.* (177). *In ramis* (M. S. p. 132).
Zignoella (*Melanomma*) pulviscula *Sacc.* (266). *In cortice duriore* (Mich. I p. 450).

Dyscomiceteæ.

Ascomyces aureus *Magn.* (359). *In pag. inf. foliorum vigentium* (Mich. I p. 62).
Helotium immutabile *Fuck.* (330). *In foliis putrescentibus* (F. V. IV p. 37).
Pseudopexiza (*Trochila*) populorum *Desm.* (356). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 119).

Sphæropsideæ.

Ascochyta populina *Sacc.* (415). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 168).
Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Cytispora nivea *Hoffm.* (306). *In ramis* (Mich. II p. 264).
Diplodia populina *Fuck.* (407). *In ramis* (M. S. p. 202).
Discosia Artocreas *Fr.* (445). (Mich. I p. 201).
Graphium penicilloides *Corda* (529). *In ramis putrescentibus.*
Hendersonia Alcides *Sacc.* (420). *In foliis* (Mich. I p. 215).
Hendersonia sarmentorum *West.* (418). (Mich. I p. 214).
Leptothyrium Populi *Fuck.* (442). *In foliis* (Mich. II p. 283).
Phyllosticta (*Depazea*) populina *Sacc.* (374). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p 155).

Hyphomyceteæ.

Dicoccum inquinans *Sacc.* (498). *In libro* (Mich. I p. 264).
Fusarium pallens *Nees.* (537). *In cortice putrescente ramorum* (F. V. V p. 197).
Hadotrichum (?) Populi *Sacc*, (449). *In foliis nondum emortuis* (Mich. I p. 264).
Oospora rhodochlora *Sacc.* (468). *In ramis corticatis.*
Torula rosea *Pr.* *In ramis corticatis* (F. V. V p. 190).

Melanconieæ.

Marsonia (*Glœosporium*) Populi *Mtgn. et Desm.* (456). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 220).
Trullula olivascens *Sacc.* (453). *In ramis putridis.*

Populus angulata *Ait.*

Hypodermeæ.

Melampsora populina *Lév.* (146). (M. S. p. 77).

Pyrenomyceteæ.

Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183) (Mich. I p. 21).

Sphæropsideæ.

Cytispora nivea *Hoffm.* (396). *In ramis* (Mich. II p. 264).

Populus

Hymenomyceteæ.

Corticium polygonium *Pers.* (114). *Supra corticem.*
Fomes fulvus *Fr.* (93). *Ad basin truncorum.*
Lenzites variegata *Fr.* (62). *Ad truncos.*
Pholiota (*Agaricus*) Aegerita *Fr.* (69). (M. S. p. 27).
Pholiota (*Agaricus*) destruens *Brond.* (69). (M. S. p. 27).
Pholiota (*Agaricus*) pudica *Bull.* (68). *Ad truncos* (M. S. p. 27).
Pleurotus (*Agaricus*) ostreatus *Jacq.* (50). *Ad truncos excisos* (M. S. p. 22).
Polyporus fumosus *Fr.* (98). *Ad bases truncorum* (M. S. p. 50).
Polyporus molluscus *Fr.* (94). *In asseribus putrescentibus* (M. S. p. 54).
Polyporus picipes *Fr.* (97). *Ad truncos et palos* (M. S. p. 49)
Polyporus sanguinolentus *Fr.* (94). *Ad truncos.*
Polyporus subspadiceus *Fr.* (94). *In truncis putridis* (Mich. I p. 539).
Polyporus vaporarius *Fr.* (94). *In trunco* (Mich. I p. 540).
Typhula filiformis *Fr.* (119). *In foliis putridis* (Mich. I p. 437).
Typhula gyrans *Fr.* (119). *In foliis dejectis* (M. S. p. 68).

Phalloideæ.

Mutinus caninus *Str.* (127). *Ad truncos putrescentes* (M. S. p. 70).

Phycomyceteæ.

Protomyces xylogenus *Sacc.* *In ligno* (Mich. I p. 14).

Pyrenomyceteæ.

Botriosphæria Berengeriana *De Not.* (207). *In ligno denudato.*
Diatrype bullata *Fr.* (184). *In cortice* (M. S. p. 150).
Diatrypella verruciformis *Nke.* (184). *In ramis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 151).
Eutypella Acharii *Tul.* (180). *In ramis decorticatis.*
Hysterium pulicare *Pers.* (306). (Mich. I p. 55).
Hypoxylon rubiginosum *Fr.* (200). *In ramis emortuis.*
Hypoxylon serpens *Fr.* (201). *In ligno putri.*
Hypoxylon udum *Fr.* (201). *In lignis aridis.*
Hysterographium elongatum *Corda.* (309). *In ligno nudo.*

Lophiostoma excipuliforme *Ces. et DNtrs.* (301). *In cortice duriore* (Mich. I p. 43).
Lophiostoma macrostomoides *DNtrs.* (300). *In cortice* (Mich. I p. 468).
Lophiostoma macrostomum *De. Not.* (301). *In cortice.*
Lophiostoma perversum *De. Not.* (300). *In ramis.*
Nectria Mantuana *Sacc.* (285). *In ligno decorticato* (Mich. I p. 52).
Nectria Peziza *Fr.* (285). *In ligno et cortice.*
Nummularia repandoides *Fuck.* (202). *In cortice duriore.*
Rosellinia amphisphærioides *Sacc. et Speg.* (192). *In cortice duriore* (Mich. I p. 352).
Rosellinia pulveracea *Fuck.* (192). *In lignis.*
Rosellinia sordaria *Rehm.* (193). *In ligno.*
Schizostoma vicinum *Sacc.* (296). *In cortice.*
Sillia ferruginea *Karst.* (279). *In ramis corticatis emortuis.*
Teicospora obducens *Fuck.* (273). *In lignis putridis.*
Valsa ambiens *Fr.* (177). *In ramis corticatis.*
Xylaria corniformis *Fr.* (198). *In truncis emortuis prostratis.*

Tuberaceæ.

Tuber brumale *Vitt.* (360). *Circa radices* (Mich. I p. 470).
Tuber rufum *Pico* (360). *Inter radices* (Mich I p. 470),

Discomyceteæ.

Helotium (*Peziza*) ceracellum *Fr.* (337). *In ligno putrescente* (F. V. IV p. 34).
Mollisia ligni *Karst.* (337). *In lignis ramisque denudatis.*
Mollisia (*Tapesia*) variicolor *Fuck.* (337). *Ad lignum* (Mich. I p. 65).

Myxomyceteæ.

Badhamia macrocarpa *Rost.* (8). *In cortice* (F. V. IV p. 39).
Perichæna corticalis *Rost.* (14). *In cortice.*

Sphæropsideæ.

Cytospora Acharii *Sacc.* (396). *In ramis majoribus decorticatis.*
Cytospora chrysosperma *Fr.* (396). *In ramis.*
Cytospora nivea *Hoffm.* (396). *In ramis.*
Diplodia mutila *Mont.* (407). *In ramis.*
Diplodia populina *Fuck.* (407). *In ramis.*
Phoma putator *Sacc.* (385). *In ramis corticatis.*
Septoria Populi *Desm.* (216). *In foliis* (Mich. I p. 171).

Hyphomyceteæ.

Coccospora aurantiaca *Wallr.* (466). *In lignis putridis.*
Fusarium pallens *Nees.* (537). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 295).
Isaria epiphylla *Pers.* (526). *In foliis.*
Tricholeconium fuscum *Corda.* (506). *In ligno.*
Trichotecium roseum *Fr.* (484). *In ramis dejectis udis* (M. S. p. 186).
Tubercularia nigricans *Lk.* (532). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 197).
Tubercularia vulgaris (532). *Ad ramos.*

Melanconieæ.

Pestalozzia truncatula *Fuck.* (460).

Betulaceæ.

Alnus glutinosa *Gærtn.*

Hymenomyceteæ.

Polyporus radiatus *Fr.* (99). *In trunco putrescente* (Mich. I p. 244).

Phycomyceteæ.

Schinzia Alni *Woron.* *In radicibus* (Mich. I p. 13).

Pyrenomyceteæ.

Botriosphæria Bèrengeriana *DNtrs.* (207). (F. V. IV p. 4).
Calosphæria tædiosa *Sacc.* (173). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 368).
Capnodium Cesatii *Mtgn.* (170). *In foliis ramulisque* (F. V. V p. 176).
Coronophora gregaria *Fuck.* (174). (F. V. IV p. 21).
Cryptospora suffusa *Tul.* *In ramis emortuis* (M. S. p. 126).
Diaporthe alnea *Fuck.* *In ramis* (M. S. p. 211).
Ditopella fusispora *DNtrs.* *In ramulis* (Mich. I p. 31).
Eutypa heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis* (F. V. IV p 15).
Eutypella alnifraga *Sacc.* (179). *In ramis* (Mich. II p. 532).
Fenestella Princeps *Sacc.* *In ramis emortuis* (F. V. IV p. 13).
Fenestella tetratrupha *Sacc.* (276). *In ramis.*

Gnomoniella tubiformis *Auersw.* (203). *In foliis.* (M. S. p. 100).
Hypoxylon fuscum *Fr.* (200). *In truncis et ramis* (M. S. p. 152).
Hypoxylon rubiginosum *Fr.* (200). (F. V. IV p. 21).
Hypoxylon serpens *Fr.* (201). *In ligno denudato rarius supra corticem* (M. S. p. 152).
Leptosphæria Coniothyrium *Sacc.* (244). (F. V. II p, 317).
Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (245). (F. V. II p. 318).
Lophiostoma acutum *Sacc. In ramulo dejecto putrescente* (M. S. p. 110).
Microsphæria penicillata *Lév.* (164)) *In foliis* (M. S. p. 91).
Melanconis Alni *Tul.* (221). *In ramis corticatis.*
Melanconis (*Diaporthe*) thelebola *Sacc.* (221). (F. V. IV p. 12).
Melanomma Pulvis-pyrius *Sacc.* (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).
Rosellinia Aquila *DNtrs.* (191). *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. II p. 327).
Rosellinia ligniaria *Nke.* (193). *In cortice duriore v. ligno denudato putre* (F. V. II p. 328).
Rosellinia sylvana *xacc.* (193). *In ligno putre.* (F. V. II p, 329).
Sphærella Alni *Sacc.* (210). *In foliis adhuc vivis* (Mich. I p. 245).
Valsa ceratophora *Tul.* (175). (Mich. I p. 19).
Valsa stenoepora *Tul. In ramis languidis* (F. V. V p. 179).
Zignoella (*Melanomma*) pulviscula *Sacc.* (266). *In ligno denudato* (Mich. I p. 450).

Discomyceteæ.

Exoascus Tosquinetii *Sacc.* (359). *In foliorum vivorum pag. sup.* (Mich. I p. 433).
Tapesia prunicola *Fuck.* f. Almi. *In ramis* (Mich. II p. 536).

Sphæropsideæ.

Diplodia Alni *Fuck.* (407). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 225).
Leptothyrium alneum *Sacc.* (442). *In foliis* (Mich. I p. 202).
Phoma alnea *Sacc.* (385). *In ramis emortuis,*
Pyrenochæta nobilis *DNtrs.* * lignicola (391). *In ramis decorticatis* (Mich. I p. 276)
Septoria Alni *Sacc.* (426). *In foliis languidis* (Mich. I p. 177).
Septoria alnigena *Sacc.* (427). *In pag. sup. foliorum vigentium* (Mich. I p. 179).

Hyphomyceteæ.

Echinobotryum læve *Sacc.* (497). *In truncis decorticatis putrescentibus.*

Helminthosporium obclavatum *Sacc.* (513). *In ligo putri.*
Helminthosporium obovatum *Berk.* (515). *In ramis emortuis* (M. S. p. 180).
Passalora bacilligera *Fr.* (510). *In foliis* (F. V. V p. 187).

Melanconieæ.

Cryptosporium Neesii (454). *In ramis emortuis.*
Glæosporium cylindrospermum *Sacc.* (451). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 220).
Melanconium sphæroideum *Link.* (456).
Stilbospora thelebola *Sacc.* (457). *In ramulis* (Mich. II p. 542).

Alnus incana *W.*

Pyrenomyceteæ.

Calosphæria tædiosa *Sacc.* (173). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 386).
Cryptospora suffusa *Tul.* (279). *In ramis emortuis.*
Eutypella alnifraga *Sacc.* (179). *In ramis* (Mich. II p. 532).

Dyscomyceteæ.

Karschia (*Patellaria*) nigerrima *Sacc.* (350). *In ramis corticatis putrescentibus* (F. V. IV p. 29)
Mollisia (*Niptera* stictella *Sacc. et Speg.* (235). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 426).

Melanconieæ.

Glœosporium alneum *West.* (451). *In pag. inf. foliorum languidorum* (Mich. II p. 563).

Alnus viridis *DC.*

Pyrenomyceteæ.

Fracchianea heterogenea *Sacc.* (173). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 455).
Massaria alpina *Sacc. et Speg.* (213). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. I p. 440).

Alnus

Hymenomyceteæ.

Clitocybe sandicina *Fr.* (Mich. II p. 243).
Clitocybe viridis *With.* (40), (Mich. II p. 243).
Leptonia euchroa *Fr.* (67). *Ad truncos putrescentes.*
Polyporus cuticularis *Fr.* (98). *Ad radices* (M. S. p. 51).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphæria umbrina *De. Not.* (237). *In cortice crassiore.*
Anthostoma melanotes *Sacc.* (196). *In ramis decorticatis.*
Ceratostomella rostrata *Sacc.* (203). *In ligno udo carioso.*
Chætosphæria fusca *Fuck.* (235). *In ramis corticatis decorticatisque* (F. V. IV p, 3),
Daldinia concentrica *Ces e. DNtrs.* (201). *In truncis,*
Diatrype disciformis *Fr,* (184), *In ramis corticatis.*
Diatrypella aspera *Nits.* (185). *In ramis.*
Diatrypella verruciformis *Nits.* (184). *In ramis.*
Dothidea Sambuci *Fr.* (294). *In ramis exsiccatis.*
Endothia gyrosa *Fuck.* (222). *In cortice et in ligno.*
Gnomomia setacea *De. Not.* (217). *In pag. inf. foliorum.*
Hypoxylon fuscum *Fr.* (200). *In cortice.*
Hypoxylon multiforme *Fr.* (200). *In ligno putre* (F. V. V p. 184).
Hypoxylon rubiginosum *Fr.* (200). (F. V. IV p. 22).
Hypoxylon unitum *Nits.* (201). *In ligno et cortice.*
Hysterium pulicare *Pers.* (306). *In cortice duriore.*
Lasiosphæria ovina *Ces. et DNtrs.* (264). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 45).
Lophiotrema auctum *Sacc.* (300). *In ramulis putrescentibus.*
Melanomma Pulvis-pyrius *Sacc.* (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).
Melomastia Friesii *Nits.* (266). *In ramis denudatis.*
Phyllactinia suffulta *Sacc.* (163). *In foliis vivis.*
Physalospora gregaria *Sacc.* (205), *In ramis corticatis.*
Rosellinia pulveracea *Fuck.* (192). *In ligno* (F. V. II p. 329).
Trematosphæria pertusa *Fuck.* (255), *In lignis exsiccatis.*
Valsa ambiens *Fr.* (177). *In ramis corticatis.*

Myxomyceteæ.

Badhamia hyalina *Berk.* (536). *Ad truncos.* (F. V. IV. p. 39).
Trichia Jackii *Rost.* (16). *In truncis* (F. V. IV p. 40).

Sphæropsideæ.

Dendrophoma Pulvis-pyrius *Sacc.* (388). *In ligno et cortice.*

Hyphomyceteæ.

Acrothecium obovatum *Cooke.* (516). *In ramis* (Mich. II p. 555).
Cladotrichum polysporum *Sacc.* (512). *In ramis et ligno.*
Rhinotrichum chrysospermum *Sacc.* (478). *In ligno.*

Betula alba *L.* (B. pendula *Rth).*

Hymenomyceteæ.

Lenzites betulina *Fr.* (62). *Ad truncos.*
Trogia crispa *Fr.* (63). *Ad truncos.*

Hypodermeæ.

Melampsora betulina *Wint.* (*M. Betulæ Desm.*) (146). *Ad folia viva* (Mich. I p. 454).

Pyrenomyceteæ.

Calosphæria ciliatula *Karst.* (173). *In cortice.*
Coronophora gregaria *Fuck.* (174). *In ramis corticatis.*
Daldinia concentrica *Ces. et De Not.* (201). *In truncis.*
Euchnoa lanata *Fuck.* (172). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 255).
Fenestella vestita *Sacc.* (276). *In ramis corticatis emortuis.*
Gnomoniella tubiformis *Sacc.* (203). *In foliis.*
Hypoxylon atropurpureum *Fr.* (200). *In lignis putridis.*
Massaria eburnea *Sacc.* (260). *In ramis corticatis.*
Microsphæra Friesii *Lév.* (164). *In foliis.*
Nectria sanguinea *Fr.* (284). *In ligno et cortice udo.*
Phyllactinia suffulta *Sacc.* (163). *In foliis viris.*
Pleomassaria siparia *Tul.* (268). *In ramis exsiccatis.*
Pseudovalsa lamiformis *Ces. et DNtrs.* (257). *In ramulis* (Mich. I p. 14).
Rosellinia Desmazieri *Sacc.* (192). *Ad basin truncorum.*
Uncinula adunca *Lév.* (163). *In foliis.*
Valsa Auerswaldi *Nits.* (178). *In ramis.*
Venturia ditricha *Karst.* (219). *In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 34).

Discomyceteæ.

Lecanidion Bagnisianum *Sacc.* *In ligno denudato* (Mich. I p. 58).

Sphæropsideæ.

Discosia Artocreas *Fr.* (445). (Mich. I p 201).
Phyllosticta betulina *Sacc.* (374). *In foliis* (Mich. I p. 154).
Prosthemium betulinum *Kunze.* (421). *In ramis emortuis.*
Sphæronema polymorphum *Sacc.* (388). *In ramis corticatis.*
Septoria Betulæ *West.* (426). *In foliis* (Mich. I p. 177).

Melanconieæ.

Asterosporium Hoffmanni *Kunze.* (458). *In ramis corticatis.*
Cryptosporium Neesii *Corda.* v. betulinum (454). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 169-539).
Glœosporium Betulæ *Mont.* *In foliis languidis ad pag. superiorem* (Mich. II p. 540).
Melanconium betulinum *Schm. et Kze.* (455). *In ramis emortuis* (Mich. I p. 477).

Betula verrucosa *Ehrh.*

Pyrenomyceteæ.

Microsphæra Friesii *Lév.* (161). *In foliis.*

Cupuliferæ.

Carpinus Betulus *L.*

Hymenomycetæ.

Corticium polygonium *Pers.* (114). *In cortice.*
Hydnum hirtum *Desm.* (108). *In truncis emortuis* (Mich. I p. 4).
Hydnum pudorinum *Fr.* (108). *In truncis* (Mich. I p. 4).
Pholiota (*Agaricus*) squarrosa *Müll.* (69). *Ad radices* (M. S. p. 27).
Radulum orbiculare *Fr.* (103). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 164).

Hypogeæ.

Melanogaster variegatus *Tul.* (122). *Ad radices* (Mich. I p. 437).

Hypodermeæ.

Melampsora Carpini *Fuck.* (146). *In foliis* (M. S. p. 77).

Pyrenomyceteæ.

Anthostoma decipiens *Nke.* (197). *In trunco decorticato, annoso, putrescente* (M. S. p. 142).

Anthostoma gastrinum *Sacc.* (197). *In ramis* (M. S. p. 143).

Anthostomella nitidula *Sacc.* (194). *In ramulis tenuioribus* (F. V. IV p. 2).

Caelosphæria cupularis *Karst.* (172). *In ramis exsiccatis.*

Cucurbitaria Carpini *Sacc.* (275). *In ramis putrescentibus* (M. S. p. 119).

Cryptosporella aurea *Sacc.* (207). *In ramulis* (Mich. I p. 369).

Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183). (Mich. I p. 22).

Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183). (Mich. I p. 21).

Diaporthe Carpini *Fuck.* (222). *In ramis putrescentibus* (M. S. p. 137).

Diaporthe decipiens *Sacc.* (222). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 6).

Diaporthe Kunzeana *Sacc.* (222). *In ramulis* (F. V. V p. 180).

Diaporthe sordida *Nke.* (224). (F. V. IV p. 12).

Diatrype Stigma *Fr.* (184). *In ramis emortuis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 150).

Didymosphæria nitidula *Sacc.* (237). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 32).

Dimenosporium pulchrum *Sacc.* (166). *In foliis languentibus* (F. V. II p. 299).

Endothia gyrosa *Fuck. Ad cortices duriores et ad ligna denudata* (M. S. p. 146).

Eutypa flavo-virens *Tul.* (181). *In cortice atque in ligno.*

Eutypa (*Valsa*) heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis corticatis* (M. S. p. 129).

Eutypa lata *Tul.* (181). *In ligno et cortice.*

Eutypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I p. 15).

Eutypella Acharii *Tul.* (180). *In ramis decorticatis.*

Fenestella Princeps *Tul.* (276). *In ramis emortuis* (M. S. p. 127).

Gnomoniella (*Gnomonia*) fimbriata *Aversw.* (204). *In foliis* (M. S. p. 100).

Gnomoniella tubiformis *Sacc.* (203). *In foliis.*
Hypocrea hypomycella *Sacc.* (287). *In hymenio corticii polygonii.*
Hypoxylon cocineum *Fr.* (199). *In truncis et ramis* (M. Si p. 152).
Hypoxylon coccineum *Fr.* (199). *In truncis et ramis.* (M. S. p. 152).
Hypoxylon commutatum *Nke.* (199). *In ramis* (M. S. p. 211).
Hypoxylon fuscum *Fr.* (200). *In cortice.*
Hypoxylon luridum *Nke.* (200). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 22).
Hypoxylon rubiginosum *Fr.* (200). (F. V. IV p. 22).
Læstadia carpinea *Sacc.* (204). *In foliis.*
Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (*Sphæria fuscella Berk. et Br.*) (245). (M. S. p. 97).
Lasiosphæria strigosa *Sacc.* (264). *In lignis.*
Linospora Carpini *Schröt.* (278). *In foliis putrescentibus* (Mich. I
Massaria (*Melanconis*) macrospora *Tul.* (243). *In ramis* (M. S. p. 211).
Melanconiella spodiæa *Sacc.* (*Valsaria insitiva Ces. et DNtrs*). (239). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).
Melanconis chrysostroma *Tul.* (221). (F. V. IV p. 20).
Melanconis spodiæa *Tul.* (F. V, IV p. 20).
Melanomma Pulvis-pyrius *Sacc.* (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).
Melogramma vagans *DNtrs.* (258). *In cortice ramorum deiectorum* (M. S. p. 147).
Ohleria rugulosa *Fuck.* (253). *In ligno* (F. V. V p. 177).
Phyllactinia suffulta *Sacc.* (163). *In foliis vivis.*
Pleomassaria (*Massaria*) Carpini *Fuck.* (268). *In cortice ramulorum* (M. S. p. 110).
Pseudovalsa macrosperma *Sacc.* (258). (F. V. IV p. 20).
Quaternaria Personii *Tul.* (174). *In ramis corticatis.*
Rosellinia Aquila *DNtrs.* (191). *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. II p. 327).
Sphærella carpinea *Aversw.* *In foliis dejectis* (M. S. p. 93).
Sphærella maculiformis *Aversw.* (208). *In pag. inf. foliorum.*
Trematosphæria pertusa *Fuck.* (255). *In lignis exsiccatis.*
Ustulina vulgaris *Tul.* (199). *Ad basin truncorum.*
Valsa ambiens *Fr.* (177). *In cortice truncorum ramorumque languentium* (M. S. p. 131).
Valsa ceratophora *Tul.* (175). (Mich. I p 19).
Valsa decorticans *Fr.* (176). *In ramis exsiccatis.*
Valsa eutypa *Nke.* *In truncis emortuis decorticatis* (M. S. p. 129).
Zignoella (*Melanomma*) Pulviscula *Sacc.* (266). *In ligno denudato exarido* (M. S. p. 114).

Discomyceteæ.

Dinemasporium strigosum *Sacc.* (447). *In lignis* (Mich. II p. 281).
Karschia (*Patellaria*) Strickeri *Sacc.* (350). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 57).
Pezicula carpinea *Tul.* (333). *In cortice.*

Sphæropsideæ

Aposphæria rugulosa *Sacc.* (387). *In ligno.*
Ascochita carpinea *Sacc. In pag. sup. foliorum* (Mich. I p. 170).
Asteroma vagans *Desm.* (389). *In foliis languidis.*
Coniothyrium olivaceum *Bon.* (398). *In ramulis* (Mich. I p. 205).
Cytospora Acharii *Sacc.* (396). *In ramis majoribus decorticatis.*
Cytospora decipiens *Sacc.* (395). *In ramis.*
Cytospora decorticans *Sacc.* (396). *In ramis exsiccatis.*
Cytospora flavo-virens *Sacc.* (396). *In cortice et ligno.*
Cytospora leucosperma *Fr.* (395). *In ramis.*
Cytosporina cerviculata *Sacc.* (439). *In ramis.*
Dinemasporium decipiens *Sacc.* (446). *In ramis decorticatis.*
Diplodia Carpini *Sacc.* (407). *In ramis* (Mich. II p. 266).
Diplodia microsporella *Sacc.* (406). *In ramis decorticatis putrescentibus.*
Fusicoccum carpini *Sacc.* (394). *In ramis exsiccatis.*
Fusicoccum Kunzeanum *Sacc.* (394). *In ramis exsiccatis.*
Phoma sordida *Sacc.* (285). *In ramis.*
Phyllosticta carpinea *Sacc.* (376). *In foliis.* (Mich. I p. 158).

Hyphomyceteæ.

Chætopsis stachyobola *Corda.* (507). *In foliis.*
Corethropis pulchra *Sacc.* (471). *In foliis.*
Helminthosporium folliculatum *Corda.* (515). *In ramis.* (Mich. II p. 174).
Helminthosporium macrocarpum *Grev.* (514). *In ramis emortuis* (M. S. p. 180)
Sclerotium Pustula *Fr.* (544). *In foliis putrescentibus.*
Titæa callispora *Sacc. In foliis vivis* (F. V. V p. 193).
Verticillium capitatum *Ehrbg. Ad folia adhuc viva.* (F. V. V p. 194).

Melanconieæ.

Cryptosporium amygdalinum *Sacc.* (155). *In ramis corticatis.*

Gloeosporium Carpini *Desm.* (451). *In foliis languidis* (F. V. V p. 202).
Gloeosporium Robergei *Desm.* (451). *In maculis foliorum* (F. V. V p. 202).
Melanconium bicolor *Nesfs.* (455). *In ramulis.*
Næmaspora microspora *Desm.* (455). *In ramis corticatis.*
Pestalozzia breviseta *Sacc.* (459). *In pag. inf. foliorum.*
Thyridium botryosporum *Mont.* (456). *In ramis.*

Ostrya carpinifolia *Scop.*

Pyrenomyceteæ.

Aponectria inaurata *Sacc.* (285). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 464).
Chilonectria Cucurbitula *Sacc.* (281). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. I p. 442).
Gnomonia Veneta *Speg.* (217). *Ad folia dejecta* (Mich. I p. 457).
Melogramma vagans *De Not.* (258). *In cortice emortuo.*

Corylus Avellana *L.*

Hymenomyceteæ.

Anthina penicillata *Fr.* *In putamine* (Mich. I p. 540).
Leptonia euchroa *Fr.* (67). *Ad truncos putrescentes.*

Pyrenomyceteæ.

Chætosphæria fusca *Fuch.* (253). *In ramis corticatis decorticatisque* (F. V. IV p. 3).
Ceratostoma Venetum *Speg.* (187). *Ad putamina putrescentia* (Mich. I p. 455).
Chilonectria Cucurbitula *Sacc.* (281). *In ramis corticatis.*
Cryptospora corylina *Fuch.* (279). *In truncis ramisque corticatis emortuis* (M. S. p. 127).
Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183). (Mich. I p. 22).
Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183). (Mich. I p. 21)
Daldinia concentrica *Ces. et De Not.* (201). *In truncis.*
Diaporthe affinis *Sacc.* (224). *In ramulis.*
Diaporthe Berkeleyi *Nke.* (227). (F. V. IV p. 12).
Diaporthe conjuncta *Fuck.* (222). *In ramis emortuis* (M. S p. 137).

Diaporthe revellens *Nke.* (231). *In ramis putrescentibus* (M. S. p. 138).

Diaporthe sulphurea *Fuck.* (314). *In ramulis* (Mich. I p. 28).

Diaporthe Tessera *Fuck.* (224). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 180).

Diatrype stigma *Fr.* (184). *In ramis corticatis.*

Diatrypella favacea *DNtrs.* (185) *In ramis provectioribus emortuis* (M. S. p. 152).

Diatrypella verruciformis *Nke.* (184). *In ramis corticatis decorticatisque.* (M. S. p. 151).

Didymosphæria Epidermidis *Fuck.* (236). (F. V. II p. 323).

Endothia gyrosa *Fuck. Ad cortices duriores et ad ligna denudata* (M. S. p. 146).

Eutypa lata *Tul.* (181). *In ligno et cortice.*

Eutypa scabrosa *Fuck.* (181). *In ligno.*

Gnomonia setacea *De Not.* (217). *In pag. inf. foliorum.*

Gnomoniella (*Gnomonia*) Coryli *Auersw.* (204). *In foliis* (M. S. p. 100).

Gnomoniella (*Gnomonia*) vulgaris *Ces. et DNtrs.* (203). *Ad folia dejecta putrescentia* (Mich. I p. 457).

Hypoxylon fuscum *Fr.* (200). *In cortice.*

Hypoxylon luridum *Nits.* (200). *In ramis exsiccatis.*

Hypoxylon rubiginosum *Fr.* (200). (F. V. IV p. 22).

Hypoxylon serpens *Fr.* (201). *In ligno denudato rarius supra corticem* (M. S. p. 152).

Hypoxylon udum *Fr.* (201). *In lignis aridis.*

Hypoxylon unitum *Nits.* (201). *In ligno et cortice.*

Lasiosphæria crinita *Sacc.* (264). *In lignis putrescentibus.*

Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (245). (F. V. II p. 318).

Lophiotrema duplex *Sacc.* (298). *In lignis ramisque.*

Massarina (*Massaria*) eburnoides *Sacc.* (260). *In ramulis corticatis emortuis* (Mich. I p. 41).

Melanomma Pulvis—pyrius *Fuck.* (253). *In ligno denudato* (Mich. I p. 450).

Melogramma vagans *De Not.* (258). *In cortice em.*

Otthia corylina *Karst.* (*Cucurbitaria Coryli Sacc*). (249). *In ramis* (M. S. p. 118).

Phyllactinia suffulta *Sacc.* (163). *In foliis vivis.*

Rosellinia Aquila *DNtrs.* (191). *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. II p. 327).

Rosellinia thelena *Rabh.* (191). *In ramis corticatis putrescentibus.* (F. V. II p. 328).

Sillia (*Melogramma*) ferruginea *Ces. et DNtrs.* (279). *In truncis ramisque* (M. S. p. 147).

Sphærella Corylaria *Fuck.* (215). *In foliis languidis* (Mich. I p. 351).

Trichosphæria pilosa *Fuck.* (206). *In ramis corticatis* (F. V. II p. 326).
Valsa affinis *Nke.* (176). *In ramulis* (Mich. I p. 21).
Valsa ceratophora *Tul.* (175). (Mich. I p. 19).
Valsa Fuckelii *Nke.* (176). *In ramis exsiccatis* (M. S. p. 132).
Valsaria insitiva *Ces et DNtrs.* (239). (F. V. IV p. 20).

Discomyceteæ.

Cenangiella (*Cenangium*) dolosa *Sacc. et Speg.* (344). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 58).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Coryli *Sacc. et Speg.* (412). *In foliis* (Mich. I p. 162).
Cytospora Fuckelii *Sacc.* (395). *In ramis.*
Cytospora fugax *Fr.* (396). *In ramis.*
Diplodia Coryli *Fuck.* (407). *In ramis* (M. S. p. 201).
Diplodia microsporella *Sacc.* (406). *In ramulis decorticatis.*
Hendersona corylaria *Sacc.* (419). *In foliis languidis* (Mich. I p. 216).
Phoma cupulæ *Sacc.* (380). *In nucibus.*
Phoma glandicola *Desm. cupulæ* (380). *In putanime* (Mich. II p. 272).
Phyllosticta corylaria *Sacc.* (376). *In foliis* (Mich. I p. 158)
Phyllosticta Coryli *Sacc. et Speg.* (367). *In foliis* (Mich. I. p. 138).

Hyphomyceteæ.

Chalara brachyspora *Sacc.* (509). *In ligno putri.*
Closterosporium Sterpsiceras *Ces.* (499). *In ramis corticatis.*
Helminthosporium macrocarpum *Grev.* (514). *In ramis emortuis.*
Helminthosporium velutinum *Link.* (515). *In ramulis dejectis* (M. S. p. 180).
Myxosporium sulphureum *Sacc.* (453). *In ramis corticatis.*

Fagus sylvatica *L.*

Hymenomyceteæ.

Coniophora (*Corticium*) puteana *Fr.* (115). *In trunco putri* (Mich. I p. 5).
Corticium polygonium *Fr.* (114). *Ad corticem* (M. S. p. 64).
Cortinarius calochrous *Fr.* (71). *Ad basin truncorum.*

Fomes (*Polyporus*) applanatus *Fr.* (92). *Ad truncos.* (F. V. V p. 162).

Fomes (*Polyporus*) fomentarius *Fr.* (92). *Ad truncos.* (M. S. p. 52).

Hydnum mucidum *Pers.* (180). *Ad truncos putridos* (M. S. p. 59).

Odontia fimbriata *Fr.* (104). *In fragmentis, ligneis, foliis.* (F. V. V p. 164).

Panus conchatus *Fr.* (62).

Pleurotus insignior *Fr.* (50). (*Agaricus flabelliformis*) (M. S. p. 21).

Pleurotus (*Agaricus*) limpidus *Fr.* (50). *Ad truncos* (Mich. II p. 243).

Pleurotus (*Agaricus*) ostreatus *Jacq.* (50). *Ad caudices* (Mich. II p. 528).

Pleurotus (*Agaricus*) porrigens *Pers.* (50). *Ad truncos* (M. S. p. 22).

Polyporus brumalis *Fr.* (95). *Ad truncos emortuos.*

Polyporus fuligineus *Fr.* (95). *Ad caudices* (M. S. p. 48).

Polyporus leptocephalus *Fr.* (97). *Ad truncos putrescentes* (M. S. p. 48).

Polyporus lutescens *Fr.* (100). *Ad truncos siccos* (M. S. p. 53).

Polyporus reticulatus *Fr.* (99). *In ligno putri* (Mich. I p. 3).

Polyporus utriculatus *Fr*, (94). *In ligno putri.*

Solenia candida *Hoffm.* (86). *In ligno* (F. V. V p. 165).

Trogia crispa *Fr.* (63). *Ad truncos* (F. V. V p. 162).

Pyrenomyceteæ.

Acanthostigma minutum (*Lasiosphaeria Fuck*). (265). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 46).

Acanthostigma scleracanthum *Sacc.* (265). *In ligno putri.*

Anthostoma melanotes *Sacc.* (196). *In ramis decorticatis.*

Anthostoma turgidum *Nits.* (197). *In ramis corticatis.*

Bertia macrospora *Sacc.* (219). *In ligno decorticato putre* (Mich. I p. 452).

Bombardia fasciculata *Fr.* (194). *In ligno fracido* (M. S. p. 114).

Calosphaeria tumidula *Sacc.* (174). *In ramulis arcte corticatis* (F. V. IV p. 20).

Calosphaeria minima *Tul.* (174). *In ramis.*

Ceratostomella cirrhosa *Sacc.* *In ligno putri denigrato.* (Mich. I p. 370).

Ceratostomella (*Melanomma*) dubia *Sacc.* (203). *In ligno denudato putrescente* (Mich. I p. 449).

Ceratostomella leiocarpa *Sacc.* (203).

Ceratostomella (*Ceratostoma*) rostrata *Fuck.* (203). *In ligno putri* (Mich. I p. 371).

Ceratostomella vestita *Sacc.* (203). *In ligno putri denigrato* (Mich. I p. 370).

Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.* (183). (Mich. I p. 21).

Daldinia concentrica *Ces. et De Not.* (201). *In truncis.*

Diaporthe macrostoma *Nke.* (234). *In ramis corticatis emortuis* (Mich. II p. 250).

Diatrype Bérengeriana *DNtrs. Ad caudices* (M. S. p. 151).

Diatrype disciformis *Fuck.* (184). *In ramis emortuis.* (M. S. p. 150).

Diatrype Stigma *Fr.* (184). *In ramis emortuis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 150).

Diatrypella aspera *Nits.* (185). *In ramis.*

Dichæna faginea *Fr.* (307). *In cortice duriore.*

Didymella analepta *Sacc.* (316). *In ramulis corticatis.*

Eutypa crustata *Sacc.* (180). *In ramulis majoribus.*

Eutypa flavo-virens *Tul.* (181). *In cortice atque in ligno.*

Eutypa lata *Tul.* (181). *In ligno et cortice.*

Eutypa milliaria *Sacc.* (182). *In ligno duriore.*

Eutypa scabrosa *Fuck.* (181). *In ligno.*

Eutypella Acharii *Tul.* (180). *In ramis decorticatis.*

Eutypella spinosa *Tul.* (180). *In cortice duriore.*

Fenestella vestita *Sacc.* (276). *In ramis corticatis emortuis.*

Hypocrea rufa *Fr.* var. lateritia *Sacc.* (286). *In ramis decorticatis.*

Hypoxylon atropurpureum *Fr.* (200). *In lignis putridis.*

Hypoxylon Bagnisii *Sacc. In ramis corticatis* (Mich. I p. 24).

Hypoxylon coccineum *Bull.* (199). *In truncis* (M. S. p. 152).

Hypoxylon cohærens *Fr.* (200). *In ramis corticatis.* (F. V. IV p. 22).

Hypoxylon fuscum *Fr.* (200). *In cortice.*

Hypoxylon pulchellum *Sacc.* (199). *In ramis semidecorticatis putrescentibus* (F. V. IV p. 21).

Hypoxylon purpureum *Nke.* (200). *In truncis decorticatis* (F. V. IV p. 22)

Hypoxylon rubiginosum *Fr.* (200). *In ramis emortuis.*

Hypoxylon serpens *Fr.* (201). *In ligno denudato, rarius supra corticem* (M. S. p. 152).

Hypoxylon udum *Fr.* (201). *In ligno putri* (Mich. II p. 254).

Lasiosphæria ambigua *Sacc.* (264). *In ligno.*

Lasiosphæria hispida *Fuck.* (264). *In ligno* (Mich. I p. 46).

Lasiosphæria cruenta *Sacc.* (264). *In lignis putrescentibus.*

Linospora faginea *Sacc.* (278). *In foliis nondum emortuis.*

Linospora Magnagutiana *Sacc.* (278). *In foliis nondum emortuis* (Mich. I p. 405).

Massaria fœdans *Fr.* (242). *In ramulis* (Mich. I p. 40).
Massaria loricata *Tul.* (242). *In ramulis* (Mich. I p. 351).
Massaria macrospora *Sacc.* (242). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 247).
Massarina (*Massaria*) eburnea *Tul.* (260). *In ramis corticatis.* (Mich. II p. 253).
Melanomma Catillus *Sacc. In ligno corrupto molli* (M. S. p. 114).
Melanomma Pulvis-pyrius *Fuck.* (253). *In ligno denudato.* (Mich. I. p. 450).
Melogramma spiniferum *DNtrs. Ad radices putrescentes.* (M. S. p. 147).
Melogramma vagans *De Not.* (258). *In cortice.*
Nectria ditissima *Tul.* (283). *In cortice duriore* (Mich. I p. 410).
Nectria Peziza *Fr.* (285). *In ligno carioso.*
Niptera lilacina *Sacc. In ligno* (F. V. IV p. 31).
Numularia repandoides *Fuck.* (302). *In ramis* (M. S. p. 154).
Phyllactinia suffulta *Sacc.* (163). *In foliis vivis.*
Pseudographis elatina *Nyl.* (*Krempelhuberia Cadubriæ Muss.*) (308). (M. S. p. 156).
Quaternaria Persoonii *Tul.* (174). *In ramis corticatis.*
Rosellinia ligniaria *Nke.* (193). *In cortice duriore v. ligno denudato putre* (F. V. II p. 328).
Rosellinia pulveracea *Fuck.* (192). *In ligno.* (F. V. II p. 329).
Rosellinia sordaria *Rchm.* (193). *In ligno.*
Sphærella Fagi *Aversw.* (*S. Atomus Fuck.*). (309). *In pag. inf. foliorum languidorum* (Mich. I p. 378).
Sphærella punctiformis *Babh.* (208). *In pag. inf. foliorum.*
Sphærulina myriadea *Sacc.* (263). *In foliis deciduis.*
Ustulina vulgaris *Tul.* (199). *Ad truncos* (M. S. p. 153).
Valsa ambiens *Fr.* (177). *In cortice truncorum ramorumque languentium* (M. S. p. 131).
Valsa Auerswaldi *Nits.* (178). *In ramis.*
Valsa decorticans *Fr.* (176). *In ramis.*
Valsa pustulata *Aversw.* (177). (F, V. IV p. 17).
Xylaria corniformis *Fr.* (198) *In truncis emortuis prostratis.*
Xylaria fragilis *Sacc.* (199). *Sub cortice.*
Zignoella (*Melanomma*) Campi Silii *Sacc.* (267). *In ligno denudato duriore* (Mich. I p. 449).
Zignoella (*Melanomma*) macrospora *Sacc.* (267). *In ligno decorticato* (Mich. I p. 149).

Discomyceteæ.

Calloria chrysocoma *Fr.* (346). *In lignis putridis* (F. V. IV p. 31).
Calloria (*t*) miniata *Batsch.* (346). *In ligno putri* (Mich. I p. 63.)

Chlorosplenium æruginosum *DNtrs.* (334). *In ligno putrescente* (F. V. IV p. 36).

Coccomyces coronatus *DNtrs.* (358). *In foliis dejectis* (Mich. I. p. 59).

Cryptodiscus pallidus *Corda. In ramis decorticatis putrescentibus* (Mich. II p. 165).

Embolidium italicum *Sacc. et Speg. In ligno indurato* (Mich. I p. 418).

Helotium fructigenum *Fr. In vigultis, ramulis, fructibus* (M. S. p. 165).

Helotium lenticulare *Fr.* (331). *Ad ligna putrescentia* (M. S. p. 165).

Helotium pallidulum *Sacc.* (332). *In ramis decorticatis putrescentibus* (F. V. IV p. 36).

Helotium (*Peziza*) pertenue *Sacc.* (331). *In ramis decorticatis* (F. V. IV p. 34).

Helotium phyllophilum *Desm.* (333). *In foliis emortuis.* (Mich. I p. 442).

Helotium virgultorum *Fr.* (332). *In ramis.*

Humaria hemisphærica *Fuck. In trunco decorticato putrescente.* (F. V. IV p. 38).

Lachnea (*Humaria*) setosa *Fuck.* (324). *In lignis putridis* (F. V. IV p. 38).

Mollisia cinerella *Sacc.* (334). *In ligno denudato.*

Mollisia lilacina *Wulff.* (336). *In ligno.*

Ombrophila (*Coryne*) urnalis *Sacc.* (346). *In truncis muscosis* (F. V. IV p. 31).

Patinella hyalophœa *Sacc.* (349). *In ligno decorticato putrescente* (F. V. IV p. 29).

Xylographa parallela *Fr. In ligno pluviis diu exposito neque putre* (F. V. V p. 184).

Myxomyceteæ.

Brefeldia maxima *Rost.* (12). *Ad truncos* (F. V. IV p. 39).

Comatricha typhina *Rost.* (11). *Ad ligna decorticata putrescentia* (F. V. IV p. 39).

Hemitrichia clavata *Rost. Ad truncos* (F. IV p. 40).

Trichia Iackii *Rost.* (16). *In truncis* (F. V. IV p. 40).

Trichia nigripes *Pers.* (15). *Ad truncos fracidos muscosus* (M. S. p. 171).

Trichia varia *Pers.* (15). *Ad ligna putrida* (F. V. IV p. 40).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium ? abnorme *Sacc.* *In ligno putri intus sæpe* (Mich. II p. 281).
Cytospora Acharii *Sacc.* (396). *In ramis.*
Cytospora decipiens *Sacc.* (395). *In ramis siccis.*
Cytospora decorticans *Sacc.* (396). *In ramis siccis.*
Cytospora flavo-virens *Sacc.* (396). *In cortice et ligno.*
Cytospora leucosperma *Fr.* (395). *In ramis.*
Cytospora pustulata *Sacc.* (395). *In ramis siccis.*
Cytosporina (*Cytispora*) aspera *Wallr.* (439). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 264).
Cytosporina milliaria *Sacc.* (439). *In ligno duro.*
Depazea fagicola *Fr.* *In foliis* (M. S. p. 193).
Diplodia faginea *Fr.* (401). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 266).
Discosia Artocreas *Fr.* (444). (Mich. I p. 201).
Leptothyrium ? botryoides *Sacc.* *In foliis aridis* (Mich. II p. 168).
Psilospora faginea *Rabh.* (446). *In cortice vegeta* (M. S. p. 203).

Hyphomyceteæ.

Acrothecium (*Vacumisporium*) tenebrosum (*Pr.*). *Sacc.* (516). *In ligno denudato* (F. V. V p. 193).
Arthrosporium albicans *Sacc.* (527). *In ligno putrescente.*
Asterosporium Hoffmanni *Kze.* (158). *In cortice putrescente* (Mich. I p. 269).
Helminthosporium apiculatum *Corda* *In ligno putri* (Mich. II p. 173).
Sclerotium Pustula *Fr.* (514). *In foliis putrescentibus.*
Sporodesmium scutellare *B. et Br.* var. tumulosum *Sacc.* (501) *In ligno indurato* (Mich. II p. 289).
Trichosporium Berengerianum *Sacc.* (505). *In ramis supra Eutypam spinosam.*
Virticillium glaucum *Bon.* (481). *In ligno putrescente* (Mich. II p. 554).

Melanconieæ.

Gloeosporium Fagi *West.* (449). *In pag. inf. foliorum* (Mich. I p. 218).
Libertella faginea *Desm.* (451). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 283).

Marsonia angustata *Pers.* (157). *In ramis deiectis.*
Melanconium conglomeratum *Link.* (455). *In ramis.*
Melanconium sphæroideum *Link.* (156). *In ramis.*
Myxosporium carneum *Thüm. In ramis corticatis* (Mich. II p. 542).
Myxosporium croceum *Link. In ramulis dejectis* (Mich. I p. 434).
Næmaspora croceola *Sacc.* (455). *In ramis corticatis.*
Næmaspora microsora *Desm.* (455). *In ramis.*
Pestalozzia funerea *Desm In foliis emortuis* (Mich. II p. 284).
Pestalozzia truncatula *Fuck.* (460). *In ligno ramisque.*
Scolecosporium Fagi *Lib.* (458), *In cortice.*
Stilbospora microsperma *Pers.* (457). *In ramis* (M. S. p. 180).
Thyridium botryospororum *Mtgn.* (456). *In ramis* (F. V. V p. 193).

Castanea vesca *Gærtn.*

Hymenomyceteæ.

Collybia (*Agaricus*) longipes *Bull.* (43). *Ad radices* (M. S. p. 17).
Dædalea unicolor *Fr.* (101). *Ad truncos* (F. V. V 164).
Lenzites betulina *Fr.* (62). *In truncis.*
Lenzites variegata *Fr.* (62). *Ad trabes fracidas* (M. S. p. 45).
Polyporus medulla panis *Fr.* (93). *Ad truncos dejectos* (M. S. p. 53).
Polyporus vitreus *Fr.* (93). *Ad asseres madidos semiputridos* (M. S. p. 54).
Tremella moriformis *Berk.* (121). *In rimis corticum* (F. V. V p. 166).
Volvaria (*Agaricus*) bombicina *Schäff.* (63). *Ad truncos* (M. S. p. 22).

Hypodermeæ.

Urocystis italica (*Policistis* (?) *italica*) *Sacc. et Speg.* (130). *Intra semina* (Mich. I p. 454).

Pyrenomyceteæ.

Anthostoma gastricum *Sacc.* (197). *In cortice truncorum ramorumque.*
Anthostomella rostrispora *Sacc.* (195). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 25).
Calosphæria ciliatula *Kust.* (173). (*C. Wahlenbergii Nke*). *In ramulis* (F. V. IV. p. 21).
Chætosphæria parvula *Sacc.* (253). *In ramis decorticatis emortuis* (F. V. IV p. 3).
Clipeosphæria Notarisii *Fuck.* (253). *In ramulis corticatis* (Mich. I p. 39).

Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183). (Mich. I p. 22).
Diaporthe Castaneæ *Sacc.* (221). *In ramulis* (M. S. p. 136).
Diaporthe castaneti *Nke.* (234). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 249).
Diatrype Stigma *Fr.* (184). *In ramis emortuis corticatis decorticatisque* (M. S. p. 150).
Cucurbitaria Castanea *Sacc.* (271) *In ramulis* (M. S. p. 120).
Endothia gyrosa *Fuck.* (221). (Mich. I p. 31).
Entypa (*Valsa*) ludibunda *Sacc.* (180). (Mich. I. p. 15).
Gnomonia setacea *DNtrs.* (217). *In foliis* (M. S. p. 100).
Hypoxylon atropurpureum *Fr.* (200). *In lignis putridis*
Hypoxylon effusum *Nke.* (207). *In ramis corticatis* (F. V. V 183).
Hypoxylon fuscum *Fr.* (200). *In cortice.*
Hysterium pulicare *Pers.* (306). *In cortice duriore* (Mich. I p. 55).
Kalmusia dealbata *Sacc.* (258) *In ligno* (F. V. V p. 179).
Lophiostoma quadrinucleatum *Karst. In ligno nigrificato* (Mich. I p. 13).
Lophiostoma rhapaloides *Sacc.* (300). *In ligno nigrificato.*
Lophodermium petiolicola *Fuck.* (311). *In spinis capsularum putrescentibus* (Mich. I p. p. 56).
Melanconis Modonia *Tul.* (221). *Ad ramos dejectos* (Mich. II p. 250).
Melanomma Gibellianum *Sacc. In radiculis languidis v. emortuis* (Mich. II p. 531).
Micropera minutula *Sacc. In cortice* (F. V. V p. 198).
Quaternaria Personii *Tul.* (174). *In ramis emortuis* (M. S. p 149).
Roselinia Aquila *DNtrs.* (191). *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. II p. 327).
Sphærella maculiformis *Fuck.*. (208) *In foliis* (M. S. 95).
Sphærella punctiformis *Rabh.* (208). *In pag. inf. foliorum.*
Valsa ceratophora *Tul.* (175). *In cortice ramorum* (M. S. p. 133).
Xylaria filiformis *Fr.* (198). *In foliis putrescentibus* (F. V. V p. 181).

Discomyceteæ.

Ciboria (*Cyathicula*) echinophila *Sacc.* (345). *In capsulis* (M. S. p. 165).
Dimemasporium strigosum *Sacc.* (417). *In lignis* (Mich. II p. 281).
Embolus Clavus *Sacc. et Speg. In ligno putrescente decorticato* (Mich I p. 118).
Hyalopeziza ciliaris *Fuck. In foliis et in spinis capsularum* (Mich. I p. 67).
Lachnella Aranea *Sacc.* (328). *In capsulis putribus.*

Mollisia (*Niptera*) cinerea *Fuck.* (334). *In ramis decorticatis* (Mich. I p. 424).

Mollisia (*Pyrenopeziza*) castanea *Sacc.* (333). *In ligno decorticato putrescente* (Mich. I p. 422).

Mollisia (Niptera) melaleuca *Fuck* (335). *In spinis capsularum putrescentium* (Mich. I p. 424).

Helotium (*Phacidium*) coronatum *Fr.* (333). *In foliis* (M. S. p. 159).

Phacidium dentatum *Kze. et Schm. In foliis* (M. S. p. 159).

Myxomyceteæ.

Perichæna depressa *Rost.* (14). *In ramis corticatis* (F. V. IV p. 40).

Trinchia Serpula *Pers. In trunco carioso* (M. S. p. 171).

Spæropsideæ.

Diplodia Castaneæ *Sacc.* (407). *In ramis decorticatis* (Mich. I. p. 255).

Diplodia Castaneæ *Sacc. var. radicicola. In radicibus tenuioribus lauguentibus v. emortuis* (Mich. II p. 537).

Dinemasporiom hispidulum *Fr.* (446). *In ligno denudato.*

Dendrophoma Therryana *Sacc.* (388). *In trunco.*

Fusicoccum Castaneum *Sacc.* (393). *In ramis emortuis.*

Leptothyrium (*Leptostroma*) Castaneæ *Spr.* (443). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 261).

Phoma endogena *Speg.* (380). *In seminibus matnris cortice integro vestitis adhuc vegetis* (Mich. I p. 482).

Phyllosticta maculiformis *Sacc. In foliis languidis v. emortuis* (Mich. II. p. 538).

Septoria castanicola *Desm.* (425). *In foliis languidis* (Mich. I p. 175).

Hyphomyceteæ.

Torula exitiosa *de Seyn. In radicibus tenuioribus languentibus v. emortuis* (Mich. II p. 554).

Verticillium lateritium *Berk.* (482). *In seminibus putrescentibus.*

Melanconieæ.

Myxosporium minutulum *Sacc.* (453). *In cortice.*

Næmospora microspora *Desm.* (455). *In ramis corticatis.*

Pestalozzia Saccardiana *Voyl.* (*P. monochaeta Sacc.* (458). *In foliis exsiccatis.*

Quercus Robur *L.* (Q. pubescens *W.* Q. pedunculata *W.*) (Q. pseudo-rubra *Ber.* Q. sessiflora *Sab.*)

Hymenomyceteæ.

Corticium Michelianum *Fr.* (115). *Ad cortices* (F) V. V. p. 165).
Stereum rugosum *Pers. em.* (112). *In cortice* (F. V. V p. 165).

Hypodermeæ.

Uredo Quercus *Brom.* (150). *In pag. inf. foliorum viventium* (Mich. I p. 11).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphæria fallax *DNtrs.* (237). *In cortice duriore* (Mich. I p. 458).
Anthostoma tæniosporum *Sacc.* (197). *In cortice ramorum emortuorum* (M. S. p. 143).
Bizzozeria veneta *Sacc. et Bert.* (172). *In ramis decorticatis.*
Botryospæria Bérengeriana *Sacc.* (207). (F. V. IV p. 4).
Calosphæria affinis *Nke.* (174). *In ramulis* (F. V. IV. p. 21).
Calosphæria Dryina *Nke.* (173). *In ramulis* (F. V. IV p. 21).
Calosphæria laxior *Sacc. In ramulis* (Mich. II p. 532).
Cookella microscopica *Sacc.* (169). *In foliorum pag. inf. languidorum* (Mich. I p. 407).
Cryptovalsa Nitschkii *Fuck.* (183). (Mich. I p. 22).
Diaporthe insularis *Nke.* (231). (F. V. IV p. 12).
Diaporthe leiphæma *Sacc.* (222). *In ramis* (M. S. p. 135).
Diaporte sulfurea (*Melanconis umbonata Tul.*) (224). *In ramis corticatis* (M. S. p. 126).
Diaporthe talcola *Sacc.* (224). (F. V. IV p. 12).
Eutypa milliaria *Sacc.* (182). *In ligno duriore.*
Fenestella phæospora *Sacc.* (276). *In ramis emortuis* (F. V. IV p. 13).
Fenestella vestita (*Cucurbitaria vagans*) *Sacc.* (276). *In ramis emortuis putrescentibus* (M. S. p. 122).
Glonium microsporum *Sacc.* (306). *In disco truncorum* (F. V. IV p. 25).
Hypospila quercina *Fr.* (263). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 28).
Hypoxylon fuscum *Fr.* (200). *In truncis et ramis* (M. S. p. 152).
Læstadia Cookeana *Sacc.* (204). *In foliis* (F. V. V p. 175).
Leptosphæria dryadea *Sacc.* (247). *In foliis exaridis.*
Leptosphæria vagabunda *Sacc.* (245). (F. V. II p. 318).
Lophidium thyridioides *Sacc. et Speg* (303). *In ramis decorticatis* (Mich. I p. 412).

Lophiostoma macrosporum *Speg.* (302). *In cortice vetusto deiecto* (Mich. I p. 466).

Lophodermium maculare *DNtrs.* (310). *Ad folia dejecta* (Mich. I p. 468).

Otthia (*Cucurbitaria*) Quercus *Sacc.* (239). *Raro in ramis deiectis* (M. S. p. 118).

Pseudovalsa longipes *Sacc.* (258). *Ad ramulos dejectos* (Mich. p. 463).

Rosellinia sordaria *Rehm.* (193). *In ramis corticatis v. decorticatis* (F. V. II p. 329).

Sphærella melanophora *Speg.* (210). *In cortice ramulorum iuniorum* (Mich. II. p. 247).

Valsa accedens *Sacc.* (177). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 179).

Discomyceteæ.

Coccomyces dentatus *Sacc.* (358). *In foliis.*

Cenangium (*Dermatea*) stegioides *Speg.* (344). *Ad ramulos emortuos* (Mich. I p. 471).

Helotium epiphyllum *Fr.* (329). *In foliis putridis* (F. V. IV p. 37).

Helotium querceti *Sacc.* (330). *In foliorum pag. inf.* (Mich. I p. 68).

Helotium (*Peziza*) Galbula *Karst.* (331). *In ramis decorticatis putrescentibus* (F. V. IV p. 34).

Lachnella (*Dasyscypha*) bicolor *Fuck.* (326) *Ad ramulos emortuos* (Mich. I p. 473).

Mollisia (*Pyrenopeziza*) foliicola *Sacc.* (336). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 65).

Mollisia (*Pyrenopeziza*) ligni *Karst.* (337). *In ramis decorticatis putrescentibus* (F. V. IV p. 33).

Phacidium minutissimum *Anersw.* (355). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 537).

Sphæropsideæ.

Diplodia dryadea *Sacc.* (409). *In pag. inf. foliorum putrescentium* (Mich. II p. 267).

Discosia Artocreas *Fr.* (445). *In foliis* (Mich. I p. 201).

Dichomera (*Hendersonia*) Saubinetii *Mtgn.* (423). *In ramis corticatis.* (Mich. I p. 209).

Leptothyrium dryinum *Sacc.* (443). *In foliis nondum emortuis* (Mich. I p. 202).

Pestalozzia monochæta *Desm.* (419). *In foliis exsiccatis* (M. S. p. 198).

Septoria quercina *Desm.* (425). *In foliis* (Mich. I p. 174).

Hyphomyceteæ.

Ceratophorum helicosporum *Sacc.* (499). *In pag. inf. foliorum vivorum.*
Cladobotryum Thumenii *Sacc. In foliis* (Mich. I p. 272).
Helminthosporium hyalophæum *Sacc.* (515). *In cortice ramorum* (Mich. II p. 558).
Microstroma album *Sacc.* (479). *In foliis* (Mich. I p. 273).
Septoria quercicola *Desm.* (425). *In foliis.*
Trichosporum (*Sporotrichum*) torulosum *Bon.* (505). *In cortice* (F. V. V p. 192).
Stachylidium thelenum *Sacc.* (509). *In cortice duriore.*
Stigmella dryina *Lév.* (502). *In pag. inf.* (Mich. I p. 264).

Quercus coccifera *L.*

Hyphomyceteæ.

Sporodesmium polymorphum *Corda.* (501). *In ligni emortuo* (Mich. II p. 289).

Quercus Ilex *L.*

Pyrenomyceteæ.

Capnodium quercium *Berck.* (170). *In foliis emortuis* (Mich. II p. 252).
Hyponectria Buxi *Sacc.* (281). *In foliis* (Mich. I p. 250).
Traburtia quercina *Sacc. et R.* (206). *In pag. sup. fol.*

Discomyceteæ.

Peziza carpophila *Bizz.* (323). *In fructibus imm. putres.*

Sphæropsideæ.

Cryptostictis (*Pestalozzia*) ilicina *Sacc.* (421). *In foliis languidis* (F. V. V p. 198).
Discosia Artocreas *Fr.* (445). *In foliis* (Mich. I p. 201).
Leptothyrium ilicinum *Sacc.* (442). *In foliis dejectis.*
Phoma cupulæ *Sacc.* (380). *In cupulis*
Phoma cylindrospora *Sacc.* (379). *In foliis.*
Phoma glandicola *Desm.* (380). *In cupulis* (Mich. II p. 272).
Phyllosticta ilicina *Sacc.* (366). *In foliis languidis* (Mich. I p. 136).
Phyllosticta Quercus Ilicis *Sacc.* (375). *In foliis* (Mich. I p. 155).

Quercus

Hymenomyceteæ.

Calocera cornea *Fr.* (119). *Ad truncos* (M. S. p. 60).
Calocera palmata *Fr.* (119). *In truncis cariosis* (M. S. p. 60).
Calocera viscosa *Fr.* (199). *In truncis cariosis* (M. S, p. 60).
Claudopus (*Agaricus*) byssisedus *Fr.* (65). *Ad truncos* (M. S. p. 26).
Clitocybe aggregata *Schaff.* (41). *Ad basim truncorum vetustorum.*
Collybia longipes *Bull.* (43). *Ad basim truncorum*.
Collybia (*Agaricus*) fusipes *Bull.* (43). *Ad truncos* (M. S. p. 17).
Collybia (*Agaricus*) velutipes *Curt.* (44). *Ad truncos* (M. S. p. 18).
Corticium comedens *Nees.* (115). *Ad ramulos emortuos* (M. S. p. 64).
Corticium fuscum *Cd.* (115). *In ligno emarcido.*
Corticium (*Zigodesmus*) violaceo-fuscum *Sacc.* (115). *In ligno putri* (Mich. II p. 293).
Corticium quercinum *Fr.* (115). *In ramis* (M. S. p. 64).
Cortinarius calochorus Fr. (71). *Ad truncos.*
Dacrymyces deliquescens *Dub.* (121). *In ligno putrescente.*
Dædalea quercina *Pers.* (101). *In truncis ramisque.*
Dædalea cinerea *Fr.* (101). *In truncis vetustis.*
Dædalea unicolor *Fr.* (101). *Ad truncos emortuos.*
Exidia glandulosa *Fr.* (120). *Ad truncos* (M. S. p. 69).
Fomes (*Polyporus*) fomentarius *Fr.* (92). *Ad truncos* (M. S. p. 52).
Grandinia granulosa *Fr.* (103). *In ligno* (F. V. V p. 164).
Guepinia Buccina *Sacc.* (121). *Ad truncos decorticatos* (M. S. p. 60).
Hydnum Erinaceus *Bull.* (105). *Ad truncos.*
Irpex canescens *Fr.* (104). *Ad truncos putrscentes* (M. S. p. 59).
Irpex heterodon *Sacc.* (104). *Ad truncos annosos* (M. S. p. 59).
Irpex obliquus *Fr.* (105). *Ad truncos* (M. S. p. 59).
Lenzites betulina *Fr.* (62). *Ad truncos frequens* (M. S. p. 45).
Lentinus tigrinus *Fr.* (61). *Ad truncos* (M. S. p. 44).
Marasmius Oreades *Fr.* (60). *Ap pedes truncorum juniorum* (M. S. p. 43).
Merulius Corium *Fr.* (102). *Ad truncos ramosque emortuos.*
Mycena (*Agaricus*) inclinata *Fr.* (47). *Ad truncos* (M. S. p. 19).
Mycena (*Agaricus*) polygramma *Bull.* (47). *Ad truncos* (M. S. p. 19).
Naucoria (*Agaricus*) erinaceus *Fr.* (77). *Ad ramos dejectos raro* (M. S. p. 29).

Panus rudis *Fr.* (62). *Ad caudices* (Mich. II p. 244).
Phlebia radiata *Fr.* (104). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 164).
Pholiota (*Agaricus*) squarrosus *Müll.* (69). *Ad radices* (M. S. p. 27).
Pleurotus (*Agaricus*) applicatus *Batsch.* (51). *In ligno* (Mich. I p. 539).
Pleurotus (*Agaricus*) dryinus *Pers,* (49). *Ad truncos* (M. S. p. 21).
Pleurotus salignus *Pers.* (50). *In trunco dejecto* (Mich. I p. 435).
Polyporus brumalis *Fr.* (95). *Ad truncos et ramos emortuos.*
Polyporus dichrous *Fr.* (98). *Ad truncos* (M. S. p. 50).
Polyporus ferruginosns *Fr.* (94). *In ligno* (F. V. V p. 163).
Polyporus frondosus *Fr.* (96). *Ad truncos* (M. S. p. 49).
Polyporus micans *Fr.* (95). *In ligno putri* (Mich. II p. 154).
Polyporus sinuosus *Fr,* (93). *Ad ligna putrida* (Mich. I p. 3).
Polyporus zonatus *Nees.* (100). *Ad truncos* (M. S. p. 53).
Stereum disciforme *DC.* (112). *Ad caudices dejectos et ecorticatos* (M. S. p. 63).
Stereum rubiginosum *Fr.* (112). *Ad truncos* (M. S. p. 63).
Stereum spadicum *Fr.* (111). *Ad truncos et ramos* (M. S. p. 63).
Tremella foliacea *Pers.* (121). *Ad truncos.* (M. S. p. 68).
Tremella frondosa *Fr.* (121). *In truncis* (M. S. p. 68).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphæria umbrina *De Not.* (237). *In cortice crassiore.*
Anthostoma gastrinum *Sacc.* (197). *In cortice truncorum ramorumque.*
Anthostoma melanotes *Sacc.* (196). *In ramis decorticatis*)
Apiosporium stygium *Wallr.* (166). *In ligno putrescente* (F. V. V p. 173).
Botryosphæria advena *Ces et DNtrs.* (207). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 42).
Ceratostoma (?) piliferum *Prs.* (187). *In ligno recenter cæso* (F. V. V p. 174),
Ceratostomella rostrata *Sacc.* (203). *In ligno udo carioso.*
Colpoma quercinum *Wall.* (312). *In ramis.* (M. S, p. 157).
Clypeospheria Notarisii *Fuckl.* (253). *In ramis emortuis.*
Diatrype Stigma *Fr.* (184). *In ramis corticatis.* (M. S. p. 150).
Diatrype disciformis *Fr.* (184). *In ramis corticatis.*
Diatrypella quercina *Nke.* (185). *In ramis dejectis* (M. S. p. 151).
Diatrypella aspera *Nits.* (185). *In ramis.*
Dichæna quercina *Frs* (308). *In truncis ramisque levi-corticatis.* (Mich. II p. 257).
Enchnoa infernalis *Fuck.* (172). *In ramis* (M. S. p. 210).

Endothia girosa *Fuck.* (221). *Ad cortices duriores et ad ligna denudata* (Mich. I p. 31).

Eutypa flavo-virens *Tul.* (181). *In cortice atque in ligno.*

Eutypa lata *Tul.* (181). *In ligno et cortice.*

Eutypa scabrosa *Fuckl,* (181). *In ligno.*

Eutypa velutina *var. quercina Sacc.* (182). *In ligno.*

Fenestella princeps *Tul.* (276). *In ramis corticatis.*

Hypospila quercina (*Gnomonia bifrons*) *Karst.* (263). *In foliis emortuis* (Mich. I p. 542).

Gnomonia setacea *DNtrs.* (217)) *In foliis* (M. S. p. 100).

Glonium interruptum *Sacc.* (305). *In ligno denudato* (M. S. p. 159).

Glonium lineare *DNtrs.* (305). *In ramis decorticatis.* (Mich. I p. 54).

Hypoderma virgultorum *DC.* (310). *In fructibus putrescentibus.*

Massariella (*Massaria*) bufonia *Tul.* (237). *In ramis corticatis* (Mich. I p. 247).

Zignoella (*Melanomma*) fallax *Sacc.* (266). *In ligno denudato* (Mich. I p. 41).

Zignoella (*Melanomma*) pulviscula *Sacc.* (266). *In ligno denudato* (Mich. I p. 450).

Melanomma Pulvis-pyrius *Sacc.* (253). *In ligno* (Mich. I p. 450).

Hxpoxylon cohærens *Fr.* (200). *In ramis corticatis.*

Hypoxylon multiforme *Fr.* (200). *In ramis truncisque.*

Hypoxylon serpens *Fr.* (201). *In ligno putri.*

Hypoxylon udum *Fr.* (201). *In lignis aridis.*

Hypoxylon atro-purpureum *Fr.* (200). *In ligno putre.* (F. V. V p. 183).

Hypoxylon rubiginosum *Fr.* (200). (F. V. IV. p. 22).

Hysterographium hiascens *Rhem.* (309). *In cortice vetusto* (Mich, I p. 468).

Gloniopsis biformis (*Hysterium biforme*) *Fr.* (308). *In ligno denudato* (F. V. IV p. 26).

Hysterografium elongatum *Corda* (309). *In ligno nudo.*

Hysterium pulicare *Pers.* (306). *In cortice duriore* (F. V. IV p. 26).

Læstadia Cookeana *Sacc.* (204). *In foliis.*

Læstadia fusispora *Sacc. et Boum.* (204). *In foliis putrescentibus.*

Lasiosphæria ambigua *Sacc.* (264). *In ligno.*

Lasiosphæria hispida *Fuck.* (264). *In ligno* (Mich. I p. 46).

Acanthostigma (*Lasiosphaeria*) minutum *Fuck.* (265). *In ramis praecipue inter rimas corticis* (F. V. II p. 327).

Lophiosphæria pulveracea *Sacc.* (297). *In ligno putrescente.*

Lophidium (*Lophiostoma*) compressum *Ces. et. DNtrs.* (302) *In ligno* (M. S. p. 210).

Lophiostoma macrostomum *Ces. et DNtrs.* (301). *In ligno denudato* (M. S. p. 210).

Lophiostoma pseudomacrosporum *Sacc.* (300). *In ramis.*

Lophiostoma excipuliforme *Ces. et DNtrs.* (301). *In cortice duriore.*

Lophiotrema Nucula *Sacc.* (298). *In cortice.*

Schizostoma (*Lophiostoma*) Montellicum *Sacc.* (296). *In cortice duriore udo* (Mich. I p. 43).

Schiozostoma (*Lophiostoma*) vicinum *Sacc.* (296). *In cortice duriore* (Mich. I p. 43).

Lophodermium petiolicolum *Fuck.* (310). *In petiolis foliorum* (M. S. p. 157).

Phyllactinia suffulta *Sacc.* (163). *In foliis vivis.*

Pseudovalsa longipes *Sacc.* (358). (F. V. IV p. 20).

Pseudovalsa umbonata *Sccc.* (257). (F. V. IV p 20).

Rosellinia apiculata *Sacc.* (191). *In ligno putri* (Mich. I p. 26).

Rosellinia aquila *DNtrs.* (191). *In ramis corticatis et decorticatis* (F. V. IV p. 327).

Rosellinia Pseudo Bombarda *Sacc.* (191). *In ligno denudato fracido* (M. S p. 109).

Saccardoella Montellica *Speg.* (263). *Ad corticem vetustum* (Mich. I p. 461).

Sillia ferruginea *Karst.* (273). *In ramis corticatis emortuis.*

Lophiosphæra (*Schizostoma*) quercetí *Sacc. et Speg.* (296). *In cortice* (Mich. I p. 410).

Sphærulina (*Sphærella*) myriadea *Fuck.* (263). *In foliis* (M. S. p. 95).

Sphærella punctiformis *Fuck.* (208), *In hypophyllo* (M. S. p. 93).

Sphærella maculiformis *Auwersw.* (208). *In pag. inf. foliorum.*

Teichospora trabicola *Fuck.* (272). *In ligno* (M. S. p. 210).

Teichospora communulata (*T. seminuda*) *Sacc.* (272). *In cortice duriore* (Mich. I p. 47).

Teichospora Cervariensis *Sacc. et Berl.* (274). *In ramis fracidis.*

Tricosphæria pilosa *Fuck.* (206). *In ligno et cortice.*

Valsa ambiens *Fr.* (177). *In ramis corticatis.*

Valsa cœnobitica *Des. et DNtrs.* (175). *In ramis.*

Valsa ceratophora *Tul.* (175). *In cortice ramorum* (M. S. p. 133)

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In cortice truncorum, ramorumque* (M. S. p. 148).

Valsaria authostomoides *Sacc.* (240). *In ligno nudo.*

Valsaria rubricosa *Sacc.* (239). *In cortice.*

Venturia chlorospora *Karst.* (219). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p, 33).

Zignoella dolichospora *Sacc.* (266). *In ligno caeso putri* (Mich. I p. 401).

Xylaria fragilis *Sacc.* (199). *Sub cortice.*

Tuberaceæ.

Elaphomyces anthracinus *Vitt*, (361). *In terra calcareo-sabulosa detritis quercinis immixta subsuperficialis* (Mich. I p. 416).

Elaphomyces citrinus *Vitt*, (362). *In terra calcareo-sabulosa inter radices sub muscis* (Mich. I p. 469).

Elaphomyces decipiens *Vitt.* (362). *In terra sabuloso-calcarea nudula in sylvula quercina Com. Giustinian* (Mich. I p. 416).

Elaphomyces granulatus *Fr.* (361). *Inter radices* (Mich. I p. 470).

Elaphomyces mutabilis *Vitt. E. immutabilis Speg.* (362). *Ad radices sub humo non profunde delitescens* (Mich. I p. 469).

Elaphomyces Persoonii *Vitt.* (362). *In humo ad profund. 3-7 cent. inter radices* (Mich, I p. 417).

Elaphomyces variegatus *Vitt.* (362). *In terra sabuloso-calcarea nuda in sylvula quercina Com. Giustinian* (Mich. I p. 416).

Discomyceteæ.

Belonidium auratum *Sacc.* (339). *In lignis udis putrescentibus* (Mich. I p. 66).

Belonidium basitricum *Sacc.* (399). *In ligno putrescente udo* (F. V. IV p. 35).

Blitridium hiascens *Sacc.* (315). *In cortice duriore* (Mich. I p. 417).

Bulgaria inquinans *Fr.* (348). *In truncis, praesertim dejectis* (M. S. p. 162).

Calloria chrysocoma *Fr.* (346). *In lignis putridis* (F. V. IV p. 31).

Ciboria echinophila *Sacc.* (345). *In cupulis glandibusque* (Mich. I p. 67).

Ciboria firma *Fuck.* (345). *In ramulis emortuis* (Mich. I p. 472).

Dinemasporium strigosum *Sacc.* (446). *In lignis* (Mich. II p. 281).

Helminthosporium fusiforme *Corda* * *quercinum. In ligno putri.* (Mich. II p. 174).

Helotium lenticulare *Fr.* (331). *Ad ligna putrescentia* (M. S. p. 165).

Helotium punctatum *Fr.* (330). *In foliis dejectis et arescendo (ob mycelium ?) aurantiaco coloratis.* (Mich. I p. 426).

Helotium fructigenum *Fuck. In virgultis, ramulis, fructibus* (M. S. p. 165).

Helotium virgultorum *Fr.* (332). *In ramis fructibusque putresc.*

Lachnella (*Hyalopeziza*) ciliaris *Fuck.* (328). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 428).

Lachnella (*Hyalopeziza*) patula *Fuck.* (329). *In foliis putrescentibus* (Mich. I 66).

Lachnella brunneola *Sacc.* (326). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 66).

Lachnella corticalis *Fr.* (327). *Ad corticem vetustum* (Mich. I p. 472).

Lachnella virginea *Sacc.* (326). *In ligno putrescente.*

Mollisia cæsia *Sacc.* (338). *In ligno putrescente.*

Mollisia (*Niptera*) cinerea *Fuck.* (334).

* Niptera exsiliens *Speg.* (339). *In ramulis emortuis dejectis* (Mich. I p. 472).

Mollisia (*Niptera*) melaleuca *Fuck.* (335). *In ligno* (F. V. IV p. 31).

Lachnea (*Peziza*) trechispora *Cuvr.* (323). *In ligno putri* (Mich. I p. 70).

Helotium (*Placidium*) coronatum *Fr.* (333). *In foliis* (M. S. p. 159).

Phacidium dentanum *Kze et Schm. In foliis* (M. S. p. 159).

Phacidium minutissimum *Avvd.* (355). *In foliis* (M. S. p. 159).

Pocillum Cesatii *DNtrs*, (345). *In foliis dejectis* (Mich. I p. 47).

Lachnella (*Tricopeziza*) punctiformis *Fuck.* (327). *Ad folia dejecta* (M. S. p. 163).

Myxomyceteæ.

Arcyria nutans *Fr.* (14). *In truncis dejectis* (M. S. p. 172).

Clathroptychium cinnabarinum *Sacc.* (13). *In ligno putri* (Mich. I p. 545).

Lamproderma (*Comatricha*) physaroides *Sacc.* (12). *In lignis udis, putrescentibus* (Mich. I p. 72).

Hemitrichia clavata *Rost. Ad truncos* (F. V. IV p. 40).

Tilmadoche nutans *Rost.* (8). *In truncis dejectis.*

Trichia varia *Pers.* (15). *Ad ligna putrida* (F. V. IV p. 40).

Sphæropsideæ.

Aposphæria labens *Sacc.* (387). *In ligno et cortice.*

Ascochyta Quercus *Sacc. et Speg.* (411). *In foliis* (Mich. I p. 162).

Cytispora ceratophora *Sacc. In ramis corticatis* (Mich. II p. 265).

Cytospora cœnobitica *Sacc.* (395). *In ramis.*

Cytospora decipiens *Sacc.* (395). *In ramis.*

Cytospora ventricosa *Sacc.* (395). *In ramis.*

! Cytispora quercina *West. In cortice* (Mich. I p. 261).

Cytosporina milliaria *Sacc*, (439). *In ligno duro.*

Coniothyrium microscopicum *Sacc.* (400). *In pag. inf. fol.*

Dendrophoma pulvis-pyrius *Sacc.* (388). *In ligno et cortice.*

Dinemasporium decipiens *Sacc.* (446). *In ramis emortuis.*

Dinemasporium hispidulum *Fr.* (446). *In ramis emortuis.*

Diplodia microsporella *Sacc.* (406). *In ramulis decorticatis putrescentibus.*

Dothiorella advena *Sacc.* (392). *In ramis.*

Fusicoccum quercinum *Sacc.* (393). *In cortice.*

Hendersonia foliorum *Fuckl.* (419). *In foliis.*

Leptothyrium (*Hendersonia*) quercinum *Sacc.* (442). *In ligno putrescente* (Mich. I p. 213).

Leptostroma quercinum *Lasch. In foliis dejectis* (Mich. I p. 261).

Psilospora Quercus *Fuck.* (446). *In cortice vegeta laevigata* (M. S. p. 203).

Phyllosticta Quercus *Sacc. et Speg. In foliis languidis* (Mich. I p. 138).

Sclerotium Pustula *DC.* (543). *In foliis emortuis* (M. S. p. 204).

Phoma (*Sporonema*) glandicola *Desm.* (380). *In glandibus putridis* (F. V. V p. 202).

Hyphomyceteæ.

Arthrobotryum stilboideum *Ces.* (530). *In ligno putrescen.*

Bispora Monilioides *Cra.* (498). *In ligno putrescente* (F. V. V p. 191).

Bispora pusilla *Sacc.* (498). *In ligno putri.*

Botrytis phymatothricha *Sacc.* (477). *In ligno putrescenti.*

Chalara fusidioides *Cda.* (509). *In ligno putri* (F. V. V 191).

Chalara heterospora *Sacc.* (509). *In ligno putrescenti.*

Chætopsis stachyobola *Corda* (507). *In foliis ramulisque putrescentibus.*

Chætopsis Wanchii *Grev. In ligno putrescente* (F. V. V 192).

Cylindrium elongatum *Bon.* (468). *In foliis dejectis udis* (M. S. p. 177).

Cylindrium flavo-virens *Bon.* (469). *In foliis dejectis putrescentibus* (Mich. II p. 286).

Dactylaria purpurella *Sacc.* (490). *In ligno putresc.*

Dictyosporium elegans *Cda.* (501). *In ligno putrescente* (F. V. V p. 193).

Gonatobotryum fuscum *Sacc.* (504). *In ligno putrescenti.*

Chromosporium (*Gymosporium*) viride *Cda.* (466). *In ligno udo* (F. V. V p. 186).

Helicosporium lumbricoides *Sacc.* (522). *In ligno putrescente.*

Helicosporium pulvinatum *Sacc.* (522). *In ligno putri* (Mich. II p. 288).

Helminthosporium fusiforme *Corda.* (515). *In ligno putrescente.*

Helminthosporium teretiusculum *Sacc. et Bert.* (513). *In ligno putrescente.*

Helycomyces roseus *Linck.* (469). *In ramis lignisque* (Mich. II p. 287).

Hypoderma virgultorum *DC.* (310). *In glandibus* (Mich. I p. 57).

Illosporium flaveolum *Sacc.* (534). *In ligno putri* (Mich. II p. 297).

Menispora caesia *Pr.* (508). *In ligno udo* (F. V. V p. 192).

Menispora ciliata *Cda.* (508). *In ligno putrescente.* (Mich. I. p. 265).

Mesobotrys macroclada *Sacc.* (508). *In ligno putresc.*

Polyscytalum griseum *Sacc.* (483). *In ramis caesis humidis.*

Polyscytalum sericeum *Sacc.* (485). *In foliis exsiccatis.*

Psilobotrys minuta *Sacc.* (507).

Rhinotricum chrysospermum *Sacc.* (478). *In ligno putre* (F. V. V p. 196).

Septonema bisporoides *Sacc.* (498). *In ligno putri.* (Mich. II. p. 559).

Sirodesmium granulosum *DNtrs.* (500). *In ligno.*

Speira minor *Sacc.* (502). *In ligno putrescente* (Mich. II p. 559).

Sporodesmium cellulosum *Kl.* (500). (Mich. II p. 289).

Sporotricum chlorinum *LK.* (475). *In foliis putridis* (F. V. V p. 192).

Stachybotrys atra *Cda.* (503). *In ligno* (M. S. p. 211).

Stemphylium macrosporoideum *Sacc.* (523). *In ramis putrescentibus decorticatis* (Mich. II p. 290).

Torula glauca *Pr. In disco trunculi caesi* (F. V. V p. 190).

Trichosporium nigricans *Sacc.* (505). *In ligno putrescent.*

Triposporium elegans *Cda.* (522). *In ligno emarcido* (M. S. p. 181).

Triposporium Sarcinula *Sacc.* (522). *In ligno putri* (Mich. II p. 293).

Virgaria indivisa *Sacc. In ligno putri* (Mich. II p. 560).

Verticillium sphaeroideum *Sacc.* (481). *In glandibus* (Mich. II p. 554).

Verticillium sulfurellum *Sacc.* (482). *In ligno putri* (Mich. II p. 554).

Xylostoma Corium *Pers.* (545). *In truncis cavis.*

Melanconieæ.

Coryneum Kunzei *Corda.* (457). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 169).

Coryneum umbonatum *Neess.* (458). *In ramis.*

Melanconium sphaeroideum (*Stilbospora microsperma Pers.*) (456) *In ramis* (M. S. p. 180).

Melanconium conglomeratum *Link.* (455). *In ramis.*

Naemaspora croceola *Sacc.* (455). *In ramis corticatis.*

Naemaspora microspora *Desm.* (455). *In ramis corticatis.*

Pestalozzia Guepini *Desm.* (460). *In foliis languidis* (F. V. V p. 190).

Pestalozzia monochaeta *Sacc.* (458). *In foliis exsiccatis* (Mich. I p. 480).

Pestalozzia Montellica *Sacc.* (460). *In foliis.*
Pestalozzia truncatula *Fuckl.* (460). *In ligno ramisque.*

Aesculus Hippocastanum *L.*

Hymenomyceteæ.

Crepidotus (*Agaricus*) mollis *Schaff.* (68). *In truncis cavis cariosis* (M. S. p. 148).
Polyporus resinosus *Fr.* (99). *In truncis cavis* (M. S. p. 51).

Pyrenomyceteæ.

Botryosphaeria Berengeriana *Sacc.* (F. V. IV p. 4).
Diaporthe Coneglanensis *Sacc. et Speg.* (221). *In ramis* (Mich. I p. 29).
Endothia gyrosa *Fuck.* (220). *Ad cortices duriores et ad ligna denudata* (M. S. p. 146).
Fracchiaea heterogenea *Sacc.* (137). *In ramis corticatis decorticatisque exsiccatis* (M. S. p. 115).
Hysterium pulicare *Pers. In cortice duriore* (Mich. I p. 414).
Hysterium vulgare *De Not.* (306). *In cortice duriori.*
Massaria Aesculi *Tul.* (212). *In ramis* (Mich. I p. 40).
Eutypa (*Valsa*) lata *Nke.* (180). *In truncis ramisque decorticatis ramis in ipso cortice* (M. S. p. 128).
Nectria ditissima *Tul.* (283). *In cortice.*
Sphaerella maculiformis *Auersw* (208). *In pag. inf. fol.*
Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.* (239). *In cortice truncorum ramorumque* (M. S. p. 148).

Sphæropsideæ.

Aposphaeria agminalis *Sacc.* (387). *In ligno sicco.*
Diplodia Aesculi *Lév.* (401). *Ad ramulos emortuos* (Mich. I p. 486).
Dothiorella gregaria *Sacc.* (392). *In seminibus putrescentibus.*
Fusicoccum Aesculi *Corda.* (393). *In ramis.*
Phoma Coneglanensis *Sacc.* (384). *In ramulis petiolisque.*
Phyllosticta Aesculicola *Sacc.* (365). *In foliis petiolisque* (Mich. I p. 134).
Septoria Aesculi *West. In foliis* (Mich. I p. 176).

Hyphomyceteæ.

Verticillium laterinum *Bahk.* (482). *In capsulis dejectis* (M. S. p. 186).

Melanconieæ.

Steganosporium Aesculi *Sacc.* (461). *In ramis.*

Coniferæ

Pinus sylvestris *L.*

Hymenomyceteæ.

Hydnum Auriscalpium *L.* *Ad strobilos putrescentes* (F. V. V p. 164).

Hypodermeæ.

Coleosporium Senecionis *Fr.* (148). (*Peridermium Pini*). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Hypoderma conigenum *Cooke.* (310), *In squamis strobilorum putrescentibus.*
Lophodermium Pinastri *Chev.* (311). *In foliis deciduis.*
Valsa Curreyi *Nits.* (177). *In ramis.*
Valsa pini *Fr.* (174). *In cortice ramorum* (F. V. V p 179).

Discomyceteæ.

Cenangium ferrugineum *Fr.* (343). *In ramulis emortuis.*
Cenangium Pinastri *Fuck.* (344). *In cortice ramorum* (Mich. I p. 419).
Coccomyces Pini *Karst.* (358). *In cortice ramulorum* (Mich. I p. 59).
Propolis faginea *Karst.* *In squamis strobilorum* (Mich. I p. 421).
Mollisia (*Pirenopeziza*) acicola *Sacc. et Speg.* (336) *In foliis putridis* (Mich. I p. 424).
Lecanidion (*Tympanis*) amphibola *Karst.* (350). *Ad corticem* (Mich. I p. 418).

Myxomyceteæ.

Tubulina speciosa *Speg.* (12). *Ad ligna mucida* (Mich. II p. 262).

Sphæropsideæ.

Diplodia acicola *Sacc.* (401). *In foliis* (Mich. II p. 268).
Pestalozzia funerea *Desm.* (459). *In foliis dejectis* (M. S. p. 198).
Pestalozzia strobilicola *Speg.* (461). *Ad strobilos putridos* (Mich. I p. 479).
Phoma acicola *Sacc.* (379). *In foliis deciduis* (Mich. II p. 272).
Phoma strobiligena *Desm.* (380). *In strobilis* (M. S. p. 191).

Hyphomyceteæ.

Hypoderma conigenum *Cooke.* (310). *In squamis strobilorum putrescentibus* (Mich. I p. 56).

Pinus montana *Duroi.*

Discomyceteæ.

Naemacystis (*Stictis*) nivea *Pers.* (354). *In acubus languidis* (Mich. I p. 60).

Sphæropsideæ.

Diplodia pinea *Kx.* (409). *In acubus* (Mich. I p. 355).

Pinus Larix *L.* (Larix europaea *DC.*)

Hymenomycetæ.

Polyporus officinalis *Fr.* (99). *Ad truncos* (M. S. p. 51).

Pyrenomyceteæ.

Valsa curreyi *Nits.* (177). *In ramis.*

Discomyceteæ.

Cenangium laricinum *Fuck.* *In ramis languidis* (Mich. II p. 260).
Naemacyclus niveus *Fuck.* (354). *In foliis.*

Hypodermeæ.

Chrysomyxa Rhododendri *Wint.* (148). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe occulta *Nits.* (227). *In squamis putrescentibus strobilorum.*

Diaporthe pithya *Sacc. In ramulis putrescentibus* (F. V. IV p. 7).

Lophodermium pinastri *Chév.* (311). *In acubus languidis* (Mich. I p. 415).

Leptosphaeria vagabunda *Sacc.* (245). (F. V. II p. 318).

Mytilidion decipiens *Sacc.* (307). *In squamis strobilorum* (Mich. I p. 415).

Nectria cucurbitula *Fr.* (284). *In cortice* (Mich. I p. 409).

Valsaria rubricosa *Sacc.* (239). *In cortice* (F. V. V. 183).

Discomyceteæ.

Cenangium pinastri *Pers.* (344). *In ramis* (F. V. IV p. 29).

Helotium strobilinum *Fuck.* (331). *In squamis strobilorum* (F. V. V p. 185).

Phacidium abietinum *Kunze et Schm.* (355). *In foliis dejectis* (Mich. II p. 262).

Sphæropsideæ.

Diplodia sapinea *Fuck.* (407). *In cortice putri* (F. V. V p. 208).

Discosia Artocreas *Fr.* (445). (Mich. I p. 201).

Pinus Picea *L.* (abies pectinata *DC.*).

Pyrenomyceteæ.

Cytispora Pinastri *Fr.* (396). *In foliis* (Mich. II p. 264).

Pinus Strobus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Mytilidion aggregatum *Duby.* (307). *Ad truncos putres decorticatos* (Mich. I p. 415).

Lophodermium Pinastri *Chev.* (311). *In foliis deciduis.*

Discomyceteæ.

Tromera (*Peziculа*) Resinae *Fuck.* (338). *In resina subputrescente* (Mich. I p. 470).

Sphæropsideæ

Dothiorella pithya *Sacc.* (392). *In cortice ramorum.*

Pinus

Hymenomyceteæ.

Coniophora (*Corticium*) arida *Fr.* (115). *In corticibus* (Mich. I. p. 5).
Coniophora (*Corticium*) puteana *Fr.* (115), *Ad asseres fabrefactos* F. V. V p. 165).
Corticium amorphum *Fr.* (114). *In cortice* (F. V. IV p. 30).
Corticium calceum *Fr.* (115). *Ad ligna* (M. S. p. 64).
Dacrymyces deliquescens *Dub.* (121). *In ligno putrescente.*
Dacrymyces stillatus *Neess.* (121). *In ramis et asseribus.*
Hydnum Auriscalpium *Linn.* (107). *In strobilis putrescentibus.*
Lenzites abietina *Fr.* (61). *In trabe* (M. S. p. 45).
Lenzites sepiaria *Fr.* *Ad ligna putrescentia* (61). (Mich. I p. 539).
Lepiota (*Agaricus*) Carcharias *Pers.* (35). *Ad truncos.*
Marasmius perforans *Fr.* (60). *In foliis dejectis* (M. S. p. 44).
Naematelia encephala *Fr.* (121). *In ramis corticatis* (F. V. V p. 166).
Pleurotus (*Agaricus*) porrigens *Pers.* (50). *Ad truncos.* (M. S. p. 22).
Polyporus Abietinus *Fr.* (100). *In cortice* (F. V. V p. 163).
Polyporus destructor *Fr.* (98). *Ad trabes udas* (M. S. p. 50).
Polyporus obducens *Pers.* (93). *In trabibus in tecto tepidarii* (Mich. II p. 529).
Polyporus officinalis *Fr.* (99). *Ad truncos* (M. S. p. 51).
Polyporus pulchellus *Sacc.* (98). *Ad ramos acus interdum obvolvens* (M. S. p. 50).
Polyporis vulgaris *Fr.* (94). *In truncis dejectis* (M. S. p. 54).
Solenia anomala *Fuck.* (86). *In strobilis* (Mich. II p. 244).
Tremellodon auriculatum *Fr.* (103). *Ad truncos cariosos.*
Tremellodon (*Hydnum*) gelatinosum *Pers.* (103). *Ad truncos* (M. S. p. 58).
Tricholoma (*Agaricus*) rutilans *Schäff.* (37). *Ad caudices* (Mich. II p. 242).

Hypodermeæ.

Peridermium Pini *Wallr.* (148). *In foliis* (F. V. V p. 168).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphaeria fibricola *Sacc.* (238). *In ligno aeri diu exposito et indurato* (Mich. II p. 248).

Antennaria pithyophila *Nees.* (170). *In ramis foliisque* (F. V. V p. 177).

Apiosporium pinophilum *Fuck.* (166). *In foliis et ramis.*

Capnodium australe *Mont.* (169). *In ramis et foliis.*

Ceratostoma piliferum *Fuck.* (187). *In lignis.*

Chaetomium calvescens *Sacc.* (188). *In fragmento ligneo* (Mich. I p. 373).

Chilonectria Cucurbitula *Sacc.* (281). *In ramis corticatis emortuis.*

Lasiosphaeria strigosa *Sacc.* (264). *In lignis.*

Lophidium (*Lophiostoma*) gregarium *Fuck.* (303). *In ligno indurato.* (Mich, I p. 249).

Lophium mytilinum *Fr.* (311). *In ligno denudato* (F. V. IV p. 28).

Melanomma canescens *Speg.* (255). *Ad asseres putrescentes* (Mich. I p. 460).

Melanomma Sylvanum *Sacc. et Speg.* (254). *In trabe indurata.* (Mich. I p. 404).

Mytilidion decipiens *Sacc.* (307). *In squamis strobilorum.*

Phoma strobiligena *Desm.* (380). *In strobilis* (M. S. p. 191).

Phragmotrichum Chailletii *Kunze. In strobilis* (Mich. II p. 542).

Pseudographis elatina *Nyl.* (308). *In cortice.*

Teichospora obliqua *Karst. In ramis dejectis* (Mich. II p. 253).

Valsa Abietis *Fr.* (175). *In ramis corticatis.*

Valsa Curreyi *Nits.* (177). *In ramis.*

Valsaria cariei *Sacc.* (240). *In ligno fabrefacto carioso ubi perithecia tortuosas larvarum excavationes ordine sequuntur* (F. V. IV p. 19).

Xylaria alpina *Speg.* (198). *In trunco carioso putrescente* (Mich. II p. 253).

Xylaria filiformis *Fr.* (*Thamnomyces hippotrichoides Ehremb.*) (198). *In cortice et ligno putribus.* (Mich. I p. 24).

Discomyceteæ.

Helotium subcarneum *Sacc. In fragmentis ligneis et strobilis dejectis* (Mich. II p. 260).

Helotium subtile *Fr.* (329). *In acubus putrescentibus* (Mich. I p. 68).

Lachnea (*Humaria*) setosa *Fuck.* (324). *In lignis putridis* (F. V. IV p. 38).

Lachnella calycina *Sacc.* (326). *In truncis et ramis putrescentibus.*

Mollisia (*Peziza*) apiculata *Cooke.* (339). *In cortice dejecto putri* (Mich. I p. 71).

Mollisia (*Pyrenopeziza*) laricina *Rehm.* (337). *Ad ramulos dejectos emortuos* (Mich. II p. 259).

Peziza onotica *Pers.* (320). *Inter acus ad terram humosam* (Mich. I p. 431).

Tympanis (*Cenangium*) pithya *Fuck.* (344). *In ramulis corticatis emortuis* (Mich. I p. 419).

Xylographa parallela *Fr.* (352). *In ligno.*

Myxomyceteæ.

Lamproderma nigrescens *Sacc.* (12). *In foliis dejectis* (Mich. II p. 262).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium glomeratum *Sacc.* (406). *In squamis strobilorum*

Cytospora Abietis *Sacc.* (396). *In ramis corticatis.*

Cytospora Curreyi *Nits.* (396). *In ramis.*

Cytospora Pinastri *Fr.* (396). *In foliis.*

Dendrophoma pulvis-pyrius *Sacc.* (380). *In ligno et cortice.*

Diplodia pinea *Ky.* (409). (Mich. I p. 256).

Discosia Artocreas *Fr.* (445). *In strobilis* (Mich. I p. 201).

Leptothyrium Pini *Sacc.* (443). *In foliis.*

Pestalozzia lignicola *Cooke. In trabe putrescente.* (Mich. I. p. 480).

Phoma conorum *Sacc.* (385). *In squamis conorum.*

Phoma occulta *Sacc.* (385). *In squamis conorum.*

Rhabdospora (*Septoria*) pithyophila *Sacc.* (438). *In cortice ramorum* (Mich. I p. 175).

Hyphomyceteæ.

Chalara strobilina *Sacc.* (509). *In squamis putrescentibus strobilorum.*

Coniothecium punctiforme *Corda.* (502). *In ligno aëri diu exposito* (Mich. II p. 173).

Coniothecium toruloides *Corda.* (503). *In cortice.* (Mich. II. p. 173).

Rhizomorpha subcorticalis *Pers.* (545). *Infra corticem et lignum.*

Cupressus sempervirens *L.*

Sphæropsideæ.

Diaporthe occulta *Nits.* (227). *In squamis putrescentibus conorum.*

Melanconieæ.

Pestalozzia funerea *Desm.* var. typica. *In foliis vivis vel emortuis* (Mich. I p. 478).

Cryptomeria japonica *L.*

Pyrenomyceteæ.

Calonectria minuscula *Sacc. et Sp.* (288). *In foliis semiputridis.*

Juniperus communis *L.* (J nana *W*).

Hypodermeæ.

Gymnosporangium clavariaeforme *DC.* (146). *In ramis* (M. S. p. 87).
Gymnosporangium iuniperinum *Will.* (146). (*G. Iuniperi Lk.*) *In ramis.* (M. S. p. 88).

Pyrenomyceteæ.

Bertia italica *Sacc. et Speg.* (219). *In cortice* (Mich. I p. 404).
Lophodermium iuniperinum *DNtrs.* (311). *In foliis emortuis* (Mich. I p. 56).
Melanomma obtusum *Sacc.* (251). *In ramis decorticatis* (Mich. II p. 162).
Microthyrium (*Sphaerella*) Iuniperi *Sacc.* (295). *In foliis adhuc vivis.*
Mytilidion decipiens *Sacc.* (307). *In ramulis* (Mich. I p. 55).
Mytilidion Tatile *Sacc.* (307). *In cortice.* (F. V. IV p. 27).
Theicospora obducens *Fuck.* (273). *In lignis putridis* (Mich. I p. 351).

Discomyceteæ.

Tympanis (*Cenangium*) pithya *Fuck.* (341). *In cortice trunci.* (Mich. I p. 419).

Ciboria firma *Fuck.* (345). *In foliis galbulisque putrescentibus* (Mich. I p. 428).

Sphæropsideæ.

Diplodia Iuniperi *West.* (408). *In ramis corticatis.* (Mich. II. p. 267).

Juniperus Sabina *L.*

Dyscomiceteæ.

Pithya cupressina *Fuck.* (326). *In foliis ramulisque exsiccatis.*
Pseudopeziza (*Trochila*) prominula *Sacc. et Speg.* (356). *In foliis* (Mich. I p. 420).

Pyrenomyceteæ.

Lophodermium juniperinum *De Not.* (311). *In foliis emortuis.*

Juniperus virginiana *L.*

Discomyceteæ.

Pithya cupressina *Fuck.* (336). *In ramulis foliisque languidis* (Mich. I p. 69).

Taxus baccata *L.*

Pyrenomyceteæ.

Physalospora foliorum *Sacc.* (205). *In foliis dejectis* (Mich. II. p 255).
Physalospora gregaria *Sacc.* (205). *In foliis dejectis* (Mich. II p. 255).
Testudina terrestris *Bizz.* (168). *In foliis putrescentibus.*

Discomyceteæ.

Helotium indeprensum *Bizz.* (329). *In ramulis foliisque exsiccatis.*

Sphæropsideæ.

Diplodia Taxi *Fuck.* (409). *Ad folia emortua* (Mich. I p. 485).
Phoma hysterella *Sacc. In foliis emortuis* (Mich. II p. 275).

Phoma Taxi *Sacc.* (379). *In foliis emortuis.*
Sclerotium glauco-albidum *Desm.* (544). *In pag. inf. foliorum emortuorum* (Mich. I p. 275).

Hyphomyceteæ.

Micropera Taxi *Sacc.* (440). *In cortice* (Mich. II p. 539).

Thuja orientalis *L.*

Pyrenomyceteæ.

Glonium pygmaeum *Karst.* (305). *In ligno emortuo.* (Mich. I. p. 413).

Sphæropsideæ.

Diplodia Thujae *West.* (407). *In ramis corticatis* (Mich. II p. 268).
Pestalozzia funerea *Desm.* (459). var. *typica. In foliis vivis vel emortuis* (Mich. I p. 478).

Coniferæ Indeterminatæ.

Hymenomyceteæ.

Amanita (*Agaricus*) ovoidea *Bull.* (33). (Mich. II p. 528).
Amanita (*Agaricus*) praetoria *Fr.* (33). (Mich. II p. 242).
Fomes (*Polyporus*) ungulatus *Sacc.* (92). *In truncis.* (Mich. I. p. 539).

Lycoperdaceæ.

Tulostoma (*Geaster*) mammosum *Fr.* (123). *Inter acus putrescentes.* (Mich. I p. 453).

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe Martii *Lév.* (165). *In foliis.*
Nectria coccinea *Tul.* (283). *In cortice.*

Discomyceteæ.

Peziza Calix *Sacc.* (319). *In sylvis* (Mich. II p. 535).

Sphæropsideæ.

Diplodia conigena *Desm.* (409). *In squamis putrescentibus strobilorum* (M. S. p 202).

Lemnaceæ.

Lemna minor *L.*

Sphæropsideæ.

Ascochyta aquatica *Sp.* (416). *In foliis putrescentibus.*
Phyllosticta aquatica *Speg.* (373). *Ad folia putrida.* (Mich. I. p. 483).

Musaceæ.

Musa purpurea

Hyphomyceteæ.

Oospora rosco-flava *Sacc.* (467). *In foliis emortuis.* (Mich. II. p. 545).

Zingiberaceæ.

Hedychium coronarium

Pyrenomyceteæ.

Nectria congesta *Sacc.* (284). *In rhizomate emortuo* (Mich. II p. 256).

Orchidaceæ.

Epipactis

Sphæropsideæ.

Septoria Epipactidis *Sacc.* (436). *In foliis* (Mich. I p. 197).

Listera ovata *Br.*

Hypodermeæ.

Puccinia Moliniae *Tul.* (142). *In foliis.*

Orchis militaris *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Moliniae *Tul.* (142), *In foliis.*

Orchis Morio *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Orchidearum *West.* (136). *In vaginis foliorum* (Mich. I. p. 197).

Orchis

Sphæropsideæ.

Sclerotium vulgatum *Fr.* (543). *In caule putrescente* (Mich. II. p. 301).

Vanilla

Melanconieæ.

Glocosporium affine *Sacc.* (456). *In foliis.*

Iridaceæ.

Crocus Sativus *L.*

Mycelia sterilia.

Rhizoctonia violacea *Tul.* (544). *In bulbis.*

Iris germanica *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria heterospora *Niessl.* (250). *In rhizomatibus nondum emortuis* (Mich. I p. 393).

Hyphomyceteæ.

Heterosporium (*Helminthosporium*) echinulatum *Berk.* (516). *In foliis languidis* (F. V. V 191))

Melanconieæ.

Pestolozzia funerea *Desm.* (459). var. *multiseta. In foliis dejectsi* (Mich. I p. 479).

Iris

Hyphomyceteæ.

Epicoccum purpurascens *Ehrb.* (540). *In ramis decorticatis.*
Epicoccum versicolor *Rabh. In foliis.* (M. S. p. 190).

Xiphion foetidissimum *Parl.* (Iris foetidissima *L.*).

Hypodermeæ.

Puccinia Iridis *Wint.* (137). *In foliis* (Mich. II p. 530).

Xiphion Pseudo-Acorus *Parl.* (Iris Pseudoacorus *L.*).

Sphæropsideæ.

Astreroma venulosum *Fuck.* (390). *In foliis languidis* (Mich. I p. 261).

Galanthus nivalis *L.*

Hyphomyceteæ.

Septocylindrium Bonordenii *Sacc.* (469). *In foliis putrescentibus.*

Amaryllidaceæ.

Leucojum aestivum *L.*

Hypodermeæ.

Accidium Leucoji *Bergam. In foliis* (Mich. I p. 541).

Dioscoreaceæ.

Tamus communis *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe scandens *Sacc. et Speg.* (230). *In sarmentis putrescentibus* (Mich. I p. 389),

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Tami *Sacc.* (370). *In foliis* (Mich. I p. 142).

Dioscorea

Hyphomyceteæ.

Periconia pycnospora *Fr. In ramulis* (Mich. II p. 291).

Asparagaceæ.

Ruscus aculeatus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella limitata *Sacc.* (195). *In caulibus ramulisque tenuioribus* (F. V. IV p. 2).

Leptosphaeria (*Sphaeria*) Rusci *Wallr.* (251). *In cladodiis* (M. S. p. 96).

Sphæropsideæ.

Phoma Hippoglossi *Sacc.* (382). *In cladodis languidiis.* (Mich. I. p. 257).
Phyllosticta ruscicola *Desm.* (375). *In cladodiis* (Mich. I p. 157).

Hyphomyceteæ.

Fusarium roseum *Link.* (537). *In caule* (Mich. II p. 294).

Ruscus Hippoglossum *L.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta ruscicola *Desm.* (375). *In cladodiis* (Mich. I p, 157).

Asparagus officinalis *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Asparagi *DC. In caulibus, cladodisque* (*F.* V. V. p. 170).

Sphæropsideæ.

Phoma Asparagi *Sacc.* (380). *In caulibus putrescentibus* (Mich. I. p. 257).

Hyphomyceteæ.

Cercospora Asparagi *Sacc.* (520). *In ramis cladiodisque.*

Mycelia sterilia.

Rhizoctonia violacea *Tul.* (544). *In radicilius.*

Polygonatum officinale *All.*

Sphæropsideæ.

Phyllosticta cruenta *Sacc.* (373). (Mich. II p. 538).

Polygonatum multiflorum *All.* (Convallaria multiflora *L.*)

Pyrenomyceteæ.

Metasphaeria Bellynckii *(Leptosphaeria Convallariae) Sacc.* (262). *In caule putri* (Mich. I p. 38).
Sphaerella Asteroma *Karst.* (213). *In foliis* (F. V. V. p. 175).

Sphæropsideæ.

Leptostroma Polygonatum *Lasch.* (441). *In caulibus* (Mich. II. p. 282).
Phyllosticta cruenta *Kx.* (373). *In foliis* (Mich. I p. 142).

Convallaria majalis *L.*

Sphæropsideæ.

Asteroma reticulatum *Chev.* (390). *In foliis.*
Septoria brunneola *Niessl.* (436)) *In foliis* (Mich. I p. 197).

Majanthemum bifolium *Desf.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Asteroma *Karst.* (213). *In foliis emortuis.*

Hyphomyceteæ.

Cercospora Majanthemi *Fuck.* (521). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 171).

Smilax Alpini *Willd.*

Pyrenomyceteæ.

Eutypa (*Valsa*) heteracantha *Sacc.* (182). *In ramis* (Mich. I p. 19).
Eutypa (*Valsa*) leucostroma *Mtgn.* (182). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 18).
Myiocopron (*Microthyrium*) Smilacis *DNtrs.* (295). *In sarmentis emortuis* (Mich. I p. 245).

Sphæropsideæ.

Diplodia smilacina *Berk.* (410). *In sarmentis* (Mich. I p. 255).

Ophiopogon iaponicus

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria (*Sphaerella*) Ophiopogonis *Sacc.* (250). *In foliis dejectis* (M. S. p. 94).

Liliaceæ.

Erythronium Dens-Canis *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Erythronii *Nessl.* (133). *In foliis* (M, S. p. 87).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Erythronii *Sacc. et Speg.* (412). *In foliis.* (Mich. I. p. 163).
Septoria Erythronii *Sacc.* (436). *In foliis* (Mich. I p. 197).

Tulipa sylvestris *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Prostii *Mong.* (136). *In foliis sterilibus* (Mich. II p. 246).

Lilium candidum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Cinxia *Sacc.* (213). *In foliis putrescentibus* (F. V. II p. 303).
Sphaerella Maturna *Sacc.* (213). *In foliis putrescentibus* (F. V. II p. 303).

Sphæropsideæ.

Diplodia herbarum *Lév. In caulibus* (M. S. p. 202).
Hendersonia pura *Sacc.* (420). *In caule putrescente* (Mich. I. p. 211).
Phyllosticta liliicola *Sacc.* (374). *In foliis languidis.* (Mich. I. p. 152).
Vermicularia Liliacearum *West.* (391). *In caulibus.* (F. V. V. p. 198).

Lilium bulbiferum *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Erythronii *Wint.* (*U. Liliacearum Ung.*). 133). *In foliis iunioribus radicalibus* (Mich. I p. 364).

Ornithogalum umbellatum *L.*

Sphæropsideæ.

Septoria Ornithogali *Pass. In apicibus foliorum* (Mich. I p. 486).

Scilla bifolia *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Liliacearum *Duby.* (139). *In foliis* (Mich. I p. 541).

Muscari racemosum *Mill.*

Hypodermeæ.

Uromyces Scillarum *Wint.* (*U. Muscari Lév.*) (132). *In foliis* (Mich. I p. 541).

Muscari comosum *Mill.*

Hypodermeæ.

Puccinia Liliacearum *Duby.* (139). *In foliis.*

Allium ursinum *L.*

Hypodermeæ.

Aecidium Allii ursini *Pers.* (143). *In foliis.* (Mich. II. p. 246).
Puccinia sessilis *Schneid.* (143). *In foliis.*

Allium ochroleucum *W. et K.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Schoenoprasi *Auersw. In foliis* (Mich. II p. 247).

Allium Cepa *L.*

Pyrenomyceteæ.

Pleospora herbarum *Rabh.* (169). *In vaginis liisque* (Mich. I p. 48).

Sphæropsideæ.

Sclerotium cepivorum *Fr.* (543). *Inter tunicas bulborum quos corrumpit* (Mich. II p. 301).
Vermicalaria circinans *Berk.* (391). *In scapis foliisque putridis* (F. V. V p. 199).

Hyphomyceteæ.

Sterigmatocystis (*Aspergillus*) phaeocephala *Dur. et Mtgn.* (473). *In squamis bulborum* (F. V. V p. 194).

Allium

Hypodermeæ.

Puccinia Allii *Wint.* (137). (*P. Alliorum Corda*) *In foliis.* (M. S. p. 83).

Sphæropsideæ.

Vermicularia Dematium *Fr.* (391). *In caulibus emortuis.*

Hyphomyceteæ.

Fusarium atro-virens *Berk.* (539). *In foliis caulibusque.*

Allia culta

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Schoenoprasi *Auersw. In foliis* (Mich. II p. 247).

Asphodelus albus *Mill.*

Sphæropsideæ.

Steganospora (*Hendersonia*) Asphodeli *Sacc.* (421). *In foliis* (Mich. II p. 280).

Hemerocallis fulva *L.*

Pyrenomyceteæ

Lophiostoma insidiosum *Ces. et DNtrs.* (302). (Mich. I p. 447).
Sphaerella Pales *Sacc.* (213). *In caulibus exsiccatis.*

Sphæropsideæ

Diplodia herbarum *Lév.* (*Sphaeropsis caulincola Fuck*) (410). *In caulibus* (M. S. p. 203).
Vermicularia Liliacearum *West.* (391). *In caulibus.* (F. V. V. p. 198).

Aloe vulgaris *Lam.*

Hyphomyceteæ.

Acremonium alternatum *Lk.* (476). *In foliis putridis* (Mich. I p. 269).
Septosporium bulbotrichum *Corda. In caule et foliis emortuis* (M. S. p. 180).

Agraphis nutans *Lk.*

Sphæropsideæ.

Asteroma subradians *Fr. In caulibus emortuis* (Mich. I p. 261).

Agave americana *L.*

Pyrenomyceteæ.

Pleospora phragmospora *Ces.* (270). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 48).

Yucca filamentosa *L.*

Sphæropsideæ.

Coniothyrium concentricum (400). *In foliis.* (Mich. I p. 204).

Yucca gloriosa *L.*

Pyrenomyceteæ.

Diaporthe gloriosa *Sacc. et Speg.* (229). *In foliis languidis* (Mich. I p. 390).
Pleospora Yuccae *Ces.* (270). *In foliis putrescentibus.* (Mich. I. p. 48))

Sphæropsideæ.

Coniothyrium concentricum *Sacc.* (400). *In foliis languidis* (Mich. I p. 204).
Diplodia Yuccae *West. In foliis putrescentibus* (M. S. p. 202).
Phoma gloriosa *Sacc.* (386). *In foliis putrescentibus.* (Mich. II p. 274).

Yucca Melilotus *L.*

Hyphomyceteæ.

Periconia pycnospora *Fr.* (503). *In ramulis* (Mich. II p. 291).

Yucca

Hyphomyceteæ.

Periconia chlorocephala *Fres.* (503). *In ramis caulibusque* (Mich. II p. 291).

Liliaceæ Indeterminatæ.

Hyphomyceteæ.

Penicillium candidum *Lk.* *In squamis bulborum.* (F. V. V p. 194)

Verticillium pyramidale *Bon.* (481). *In caulibus putrescentibus* (F. V. V p. 194).

Colchicaceæ.

Veratrum nigrum *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Veratri *Schröt.* (132). *In foliis* (F. V. V p. 171).

Pyrenomyceteæ.

Dothidea melanoplaca *Desm.* *In foliis languidis* (Mich. I p. 53).

Tofieldia calyculata *Whlnb.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Tassiana *De Not.* (214). *In foliis, raro in culmis.*

Alismaceæ.

Alisma Plantago *L.*

Phycomyceteæ.

Protomyces macularis *Fuck.* *In foliis* (Mich. I p. 13).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta Alismatis *Sacc. et Speg.* (370). *In foliis* (Mich. I p. 144).

Septoria Alismatella *Sacc.* (435). *In caule* (Mich. I p. 196).
Septoria hydrophila *Sacc. et Speg.* (435). *In caulibus* (Mich. I p. 196).

Sagittaria sagittaefolia *L.*

Hypodermeæ.

Entyloma Bizzozerianum *Sacc.* (129). *In foliis.* (M. I p. 14).

Juncaceæ.

Luzula Forsterii *DC.*

Hypodermeæ.

Ustilago Luzulae *Sacc.* (128). *In ovariis* (M. S. p. 73).

Discomyceteæ.

Stictis Luzulae *Lib.* (353). *Ad folia emortua* (Mich. II p. 261).

Luzula pilosa *W.*

Hypodermeæ.

Puccinia Luzulae *Lib.* (137). *In foliis* (Mich. I p. 9).
Hendersonia Luzulae *West.* (420). *In calamis vaginisque* (Mich. I p. 210).

Luzula campestris *DC.*

Hypodermeæ.

Puccinia obscura *Schröt.* (137). *In foliis calamisque* (Mich. II p. 157).

Luzula

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Tassiana *De Not.* (214). *In foliis, raro in culmis.*

Sphæropsideæ.

Leptothyrium subtectum *Sacc. In foliis* (Mich. II p. 539).
Staganospora Luzulae *West.* (421). *In calamis vaginisque.*

Juncus glaucus *Ehrh.*

Hypodermeæ.

Uromyces Junci *Tul.* (135). *In calamis* (F. V. V p. 171).

Juncus effusus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria hydrophila *Sacc.* (250). *In calamis.* (F. V. II. p. 320).
Leptosphaeria riparia *Sacc.* (251). *In calamis* (Mich. I p. 39).
Phyllacora Iunci *Fuck.* (292). *In calamis aridis.*

Sphæropsideæ.

Leptostromella (*Leptostroma*) juncina *Fr.* (445). *In calamis* (Mich. II p. 282).

Juncus lamprocarpus *Ehrh.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Najas *Sacc.* (214). *In glumis aridis* (F. V. II p. 304).

Juncus

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella Tomicum *Sacc.* (194). *In foliis putrescentibus.*

Leptosphaeria Michelii *Sacc.* (249). *In culmis emortuis.*
Sphaerella Tassiana *De Not.* (214). *In foliis, raro in culmis.*

Hyphomyceteæ.

Acremonium atrum *Cda.* (475). *In calamis et corollis* (Mich. I p. 270).
Chaetostroma atrum *Sacc.* (541). *In calamis* (Mich. II p. 174).
Periconia pycnospora *Fr.* (503). *In ramulis* (Mich. II p. 291).

Palmæ.

Phoenix dactilifera *L.*

Pyrenomyceteæ.

Graphiola Phoenicis *Poit. In foliis* (Mich. I p. 541).

Carludovica palmata *Ruiz et Pavon.*

Melanconieæ.

Gloeosporium intermedium *Sacc.* (450). *In foliis emortuis* (Mich. II p. 168).

Livistona chinensis *R. Br.* (Latania burbonica *Lam.*).

Pyrenomyceteæ.

Trichosphaeria erythrella *Fuck. Ad stipitem languentem* (M. S. p. 108).

Aroideæ.

Arum maculatum *L.*

Hypodermeæ.

Aecidium Ari *Desm.* (149). *In foliis.*

Typhaceæ.

Typha latifolia *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaerla Typhae *Karst.* (250). *In foliis* (F. V. II p. 321).
Leptosphaeria Typharum *Sacc.* (350). *In foliis putrescentibus* (M. S. p. 106).
Metasphaeria grandispora *Sacc.* (262). *In foliis putridis.*

Typha angustifolia *L.*

Hyphomyceteæ.

Cladosporium Typharum *Desm.* (511). *In foliis* (Mich. II p. 173).

Typha minima *DC.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Typhae *Fuck.* (214). *In foliis* (M. S. p. 209).

Typha

Hymenomyceteæ.

Typhula erythropus *Fr. In caule putri* (Mich. I p. 363).

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella Tomicum *Sacc.* (194). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 374).
Perisporium Typharum *Sacc.* (168). *Ad folia dejecta putrescentia* (M. S. p. 92).
Pleospora infectoria *Fuch.* (270). *Ad folia* (M. S. p. 103).
Sphaerella Tassiana *De Not.* (214). *In foliis, raro in culmis.*

Typeraceæ.

Cyperus esculentus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Rosellinia rhombispora *Sacc.* (192). *In tuberculis putrescentibus erraticis* (Mich. I. p. 372).

Eleocharis palustris *R. Br.* (Scirpus palustris *L.*).

Hypodermeæ.

Puccinia Scirpi *Lk.* (137). *In calamis* (M. S. p. 208).

Phycomyceteæ.

Protomyces Eleocharidis *Fuck.* *In calamis* (F. V. V p. 172).

Hyphomyceteæ.

Cladosporium fasciculatum *Cda.* (511). *In culmis* (M. S. p. 181).

Scirpus mucronatus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Thais *Sacc.* (214). *In calamis* (F. V. II 305).

Scirpus lacustris *L.*

Pyrenomyceteæ.

Hypoderma scirpinum *Duby.* (310). *In calamis* (Mich. I. 56).
Phomatospora Berkeley *Sacc.* (205). *In caulibus putrescentibus.*
Sphaerella Scirpi lacustris *Awd.* *In calamis putrescentibus* (F. V. p. 175).

Sphæropsideæ.

Septoria Scirpi *Sacc.* (436). *In calamis* (Mich. I. p. 196).

Scirpus triqueter *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Thais *Sacc.* (214). *In calamis* (F. V. II p. 305).

Scirpus Holoschœnus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Didymosphaeria anaxea *Sacc.* (236). *In calamis* (F. V. II p. 325).
Leptosphaeria Apogon *Sacc. et Speg.* (250). *In calamis putrescentibus* (Mich. I p. 398).
Leptosphaeria Micropogon *Sacc.* (250). *In calamis,* (F. V. II. p. 320).
Lophiotrema pusillum *Sacc. In calamis* (Mich. I p. 543).
Pleospora pyrenophoroides *Sacc.* (270). *In culmis.* (F. V. II. p. 309).
Physalospora Festucae *Sacc.* (205). *In vaginis foliisque.* (Mich. I p. 27).

Sphæropsideæ.

Septoria Holoschœni *Mtgn.* (436). *In calamis* (Mich. I p. 196).

Hyphomyceteæ.

Periconia chlorospora *Fres. f. minor. In calamis.*, (Mich. II. p. 291).

Scirpus

Pyrenomyceteæ.

Gibberella Saubinetii *Sacc.* (289). *In caulibus exsiccatis.*
Leptosphaeria littoralis *Sacc.* (252). *In calamis* (Mich. I p. 38).
Leptosphaeria Michotii *Sacc.* (249). *In culmis emortuis.*

Sphæropsideæ.

Phoma Berkeley *Sacc.* (381). *In caulibus putrescentibus.*

Melanconieæ.

Leptostroma scirpinum *Fr.* (444). *In calamis et foliis.*

Hyphomyceteæ.

Periconia chlorocephala *Fr.* (503). *In calamis.*

Eriophorum

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Tassiana *De Not.* (214). *In foliis, raro in culmis.*

Carex pauciflora *Leigth* (Carex patula *Scop.*).

Pyrenomyceteæ.

Lophiostoma collinum *Speg.* (301). *Ad basim foliorum* (Mich. I p. 467).

Carex curvula *All.*

Hypodermeæ.

Thecaphora aterrima *Tul. Intra glumas spicae masculae* (Mich. II p. 155).

Carex pilulifera *L.*

Pyrenomyceteæ.

Lophiostoma collinum *Speg.* (301). *Ad basim foliorum.* (Mich. I. p. 467).

Carex pendula *Huds.* (Carex maxima *Scop.*)

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella phaeosticta *Sacc.* (194). *In foliis putridis.*

Hyphomyceteæ.

Septocylindrium caricinum *Sacc.* *In foliis* (Mich. II p. 552).

Carex recurva *Huds.* (Carex glauca *Scop.*)

Pyrenomyceteæ.

Lophodermium caricinum *Desm.* (311). *In foliis* (Mich. I p. 252).

Discomyceteæ.

Mollisia (*Niptera*) cinerea *Fuck.* (334). *In foliis* (Mich. I p. 424).

Sphæropsideæ.

Septoria lineolata *Sacc. et Speg.* (436). *In foliis arescentibus.* (Mich. II p. 279).

Hyphomyceteæ.

Gonatosporium puccinioides *Link.* (505). *In foliis.* (Mich. II. p. 556).

Carex sempervirens *Vill.*

Pyrenomyceteæ.

Microthyrium alpestre *Sacc.* (295). *In foliis emortuis v. languidis* (Mich. II p. 160).

Carex sylvatica *Huds.*

Discomyceteæ.

Lachnella (*Hyalopeziza*) Caricis *Sacc.* (328). *In pag. inf. foliorum emortuorum* (F. V. IV p. 33).

Carex Pseudo-Cyperus *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Caricis *Wint.* (*P. caricina DC.*) (142). *In facie superiore foliorum* (M. S. p. 83).

Carex paludosa *Good.*

Hyphomyceteæ.

Arthrinium caricicolum *K. et S.* (505). *Ad folia emortua subputrescentia* (Mich. I p. 477).
Camptoum curvatum *Kunze. et Schum.* (504). *In fol. emortuis.*

Pyrenomyceteæ.

Metasphaeria (*Leptosphaeria*) puccinioides *Speg.* (262). *Ad folia dejecta* (Mich. I p. 459).

Discomyceteæ.

Belonidium Asteroma *Sacc.* (340). *In foliis dejectis* (M. S. p. 164).

Carex riparia *Curt.*

Pyrenomyceteæ.

Laestadia (*Sphaerella*) caricicola *Fuck. In foliis* (F. V. V p. 175).

Sphæropsideæ.

Septoria caricicola *Sacc.* (436). *In foliis.*
Staganospora (*Hendersonia*) paludosa. *Sacc. et Speg.* (421). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 353).

Carex japonica

Sphæropsideæ.

Diplodia caricina *Sacc.* (410). *In foliis emortuis* (Mich. I p. 256).

Carex

Hypodermeæ.

Arthrinium caricicolum *Sacc. et Speg.* (505). *In foliis languidis* (Mfch. II p. 555).

Schizomella melanogramma *Schröter* (130). *In foliis.*
Ustilago Caricis *Fuck.* (128). *In fructibus immaturis* (M. S. p. 73).

Pyrenomyceteæ.

Lophiosphaera (*Lophiostoma*) perpusilla *Sacc.* (297). *In foliis emortuis putrescentibus* (Mich. I p. 43).
Lophiostoma collinum *Speg.* (301). *Ad basim truncorum.*
Metasphaeria (*Leptosphaeria*) Cumana *Sacc. et Speg.* (262). *In foliis emortuis* (Mich. I p. 394).
Ophiobolus herpotricus *Sacc.* (278). *In culmis vaginisque.*
Sphaerella lineolata *De Not.* (214). *In foliis.*
Sphaerella Tassiana *De Not.* (214). *In foliis, raro in culmis.*

Discomyceteæ.

Pseudopeziza (*Trochila*) puccinioides *DNtrs.* (357). *In foliis emortuis* (M. S. p. 161).

Sphæropsideæ.

Dinemasporium gramineum *Lév.* (447). *In culmis.*
Neottiospora Caricum *Desm.* (390). *In foliis emortuis.*

Graminaceæ.

Phalaris arundinacea *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia sessilis *Schmid.* (143). *In foliis.*

Hierochloa australis *R. et S.*

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella phaeosticta *Sacc.* (194). *In foliis putridis.*

Discomyceteæ.

Mollisia (*Pyrenopeziza*) stictoidea *Sacc.* (336). *In foliis emortuis* (Mich. II. p. 259).

Alopecurus agrestris *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria microscopica *Karst.* (249). *In vaginis foliisque udis.*

Zea Mays *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Maydis *Sacc.* (137). *In foliis* (M. S. p. 208).
Ustilago Zeae-Maydis *Wint.* (*U. Maydis Tul.*) (129). *Ad flores et fructus immaturos nec non ad vaginas foliorum* (M. S. p. 74).

Pyrenomyceteæ.

Gibberella (*Botriosphaeria*) pulicaris *DNtrs.* (289). (F. V. IV p. 5).
Gibberella Saubinetii *Sacc.* (*Botriosphaeria dispersa DNtrs.*) (289). *In caulibus putrescentibus* (M. S p. 117).
Leptosphaeria luctuosa *Niessl.* (251). *In culmis putridis* (F. V. II p. 321).
Metasphaeria (*Leptosphaeria*) hyalospora *Sacc.* (262). *In culmis putridis* (F, V. II p. 323).
Sphaerella Maydis *Pass.* (213). *In foliis emortuis et putrescentibus* (Mich. I p. 245).

Discomyceteæ.

Calloria racheophila *Sacc. et Sp.* (347). *In rachidibus spicarum.*
Calloria succinella *Sacc. In rachide spicae putrescentis* (Mich. I p. 430).

Sphæropsideæ.

Ascochyta zeina *Sacc.* (414). *In pag. inf. foliorum* (Mich I p. 165).
Diplodia Maydis *Lév.* (411). *In culmis* (M. S. p. 203).
Hendersonia elegans *Berk.* (420). *In culmis* (M. S. p. 199).
Vermicularia relicina *Fr.* (391). *In caule putri* (Mich. I p. 270).

Hyphomyceteæ.

Dendrodochium roseum *Sacc.* (533). *In culmis* (Mich. II p. 298).

Epicoccum neglectum *Desm.* (540). *In foliis emortuis* (M. S. p. 190).

Epicoccum purpurascens *Ehrb.* (540). *In foliis putrescentibus, in pulte putrida* (polenta) *zeina* (Mich. I p. 246).

Fusarium heterosporum *Nees.* (539). *Ad caryopsides* (F. V. V p. 197).

Fusarium roseum *Link.* (537). *In culmo* (Mich. I p. 295).

Oospora (*Oidium*) Lactis *Fres.* (467). *In superficie aquae in qua caryopsides diu maceratae sunt* (Mich. I 265).

Oospora verticilloides *Sacc.* (467). *In caryopsidibus maceratis* (Mich. II p. 546).

Periconia chlorospora *Fres. In ramis caulibusque* (Mich. II p. 291).

Sterigmatocystis italica *Sacc.* (*Aspergillus sterigmatophorus Sacc.*) (473). *In caryopsidibus corruptis, udis* (M. S. p. 184).

Torula monilioides *Corda.* (496). *In foliis putrescentibus.*

Schizomycetes.

Bacterium Maydis *Cub. In caryopsidibus corruptis.*

Zea gigas

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Zeae *Sacc.* (213). *In foliis adhuc vivis* (Mich. I p. 377).

Setaria verticillata *P. B.*

Phycomyceteæ.

Protomyces graminicola *Sacc. In foliis junioribus adhuc convolutis* (F. V. V p. 172).

Sphæropsideæ.

Phyllosticta crastophila *Sacc.* (374). *In foliis* (Mich. I p. 153).

Setaria glauca *P. B.*

Pyrenomyceteæ.

Phillachora Setariae *Sacc.* (293). *In foliis vaginisque* (F. V. V p. 182).

Panicum miliaceum *L.*

Hypodermeæ.

Ustilago destruens *Schlechtd.* (128). *Intra glumas* (M. S. p. 74).

Digitaria sanguinalis *Scop.*

Hypodermeæ.

Ustilago destruens *Dub.* (128). *In spicis immaturis* (F. V. V p. 167).

Cynodon Dactylon *Pers.*

Hypodermeæ.

Puccinia Cynodontis *Desm.* (137). *In foliis* (M. S. p. 208).
Ustilago segetum *Bull.* (*U. Carbo DC.*) (128). *In glumis* (M. S. p. 74).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphaeria culmicola *Sacc.* (238). *Ad basim culmorum emortuorum* (M. S. p. 113).
Ophiobolus (*Rhaphidophora*) Graminis *Sacc.* (278). *In basi culmi putrescente* (F. V. II p. 307).
Phyllachora Cynodontis *Niessl.* (292). *In foliis* (Mich. I p. 252).

Sphæropsideæ.

Diplodina (*Diplodia*) graminea *Sacc.* (417). *In culmis* (Mich. II p. 267).
Hendersonia crastophila *Sacc.* (420). *In culmis* (Mich. I p. 211).

Hyphomyceteæ.

Fusarium corallinum *Sacc.* (536). *In spicis* (F. V. V p. 196).

Andropogon Ischaemum *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Cesatii *Schröter* (*P. Andropogonis Fuck.*) (137). *In foliis* (M. S. p. 208).
Ustilago Ischaemi *Fuck.* (128). *In spicis nondum evolutis* (F. V. V p. 167).

Pyrenomyceteæ.

Ceratostoma culmicolum *Fuck.* (187). *In culmis putrescentibus* (F. V. V p. 175).

Dothidella (*Phyllachora*) fallax *Sacc.* (293). *In foliis languidis* (F. V. V p. 181).

Leptosphaeria eustomoides *Sacc.* (249). *In culmis emortuis* (F. V. II p. 319).

Leptosphaeria herpotrichoides *DNtrs.* (252). *In culmis* (F. V. II p. 322).

Leptosphaeria Michotii (*L. trimera*) *Sacc.* (249). *In culmis emortuis* (F. V. II p. 319).

Discomyceteæ.

Stictis arundinacea *Pers.* (252). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 422).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Ischaemi *Sacc.* *In foliis culmisque* (Mich. I p. 164),

Diplodia ischaemi *Pass.* (413). *In culmis* (Mich. II p. 267).

Staganospora (*Hendersonia*) Ischaemi *Sacc.* (421). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 210).

Andropogon

Hymenomyceteæ.

Pleurotus (*Agaricus*) perpusillus *Fr.* (51). *Ad rhizomata emortua* (Mich. I p. 361).

Pyrenomyceteæ.

Apiospora Striola *Pass. et Sacc.* (255). *In culmis.*

Phomatospora Berkeley *Sacc.* (205) *In caulibus putridis.*

Physalospora Festucae *Sacc.* (205). *In vaginis foliisque* (Mich. I p. 27).

Pleospora pyrenophoroides *Sacc.* (270). *In culmis.* (F. V. II p. 309).

Discomyceteæ.

Dinemasporium graminum *Lév.* (447). *In culmis.*

Dinemasporium strigosum *Sacc.* (447). *In culmis* (Mich. II p. 281).

Crysopogon Gryllus *Trin.* (Andopogon Gryllus *L.*)

Pyrenomyceteæ.

Dothidella fallax *Sacc.* (293). *In foliis languidis.*

Sphæropsideæ.

Colletotrichum Lineola *Corda*. (454). *In foliis* (Mich I p. 271).
Septoria Grylli *Sacc.* (435). *In foliis* (Mich. I p. 195).

Hyphomyceteæ.

Spegazzinia ornata *Sacc.* (540). *In foliis culmisque* (Mich. II p. 172).

Sorghum vulgare *Pers.*

Hypodermeæ.

Ustilago Reiliana *Kühn.* (128). *In paniculis nondum evolutis* (F. V. V p. 168).

Sorghum vulgare *Pers.*

Pyrenomyceteæ.

Didymella (*Didymosphaeria*) culmigena *Sacc.* (217). *In culmis vaginisque* (Mich. I p. 377).
Gibberella Saubinetii (288). *In culmis siccis.*
Leptosphaeria amphibola *Sacc.* (251). *In culmis* (F. V. II p. 322).
Leptosphaeria eustoma *Sacc.* (249). *In pedicellis fructuum* (M. S. p. 210).
Sphaerella anarithma *Cooke.* (213). *In foliis exsiccatis.*
Sphaerella Ceres *Sacc.* (213). *In foliis languescentibus* (F. V. II p. 302).

Myxomyceteæ.

Physarum compressum *A. S.* (9). *In culmis putridis* (Mich. I p. 433).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Sorghi *Sacc.* (413). *In foliis* (Mich. I p. 164).
Ascochyta sorghina *Sacc.* (414). *In foliis* (Mich. I p. 167).
Hendersonia eustoma *Sacc.* (420). *Promiscue in culmo et pedunculis* (F. V. V 207).
Phyllosticta sorghina *Sacc.* (370). *In foliis* (Mich. I p. 140).

Hyphomyceteæ.

Aspergillus carneolus *Sacc.* (472). *In culmis.*
Botrytis fulva *Lk.* (477). *In culmis putridis humi stratis* (F. V. V p. 195).
Helminthosporium turcicum *Pass.* *In foliis languentibus* (Mich. I p. 270).

Melanconieæ.

Didymosporium culmigenum *Sacc.* (456). *In culmis* (Mich. II p. 539).

Saccharum strictum.

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella italica *Sacc. et Sp.* (195). *In foliis putrescentibus.*

Arundo Donax *L.*

Hymenomyceteæ.

Panus Flabellulum *Sacc. et Speg.* (63). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 361).

Pyrenomyceteæ.

Amphisphaeria culmicola *Sacc.* (238). *In radicibus et culmis* (Mich. I p. 455).
Anthostomella minima *Sacc.* (194). *In culmis.*
Anthostomella phaeosticta *Sacc.* (194). *In foliis putridis* (Mich. I p. 374).
Cryptovalsa arundinacea *Sacc.* (184). *In culmis* (F. V. IV p. 17).
Diatrypella Spegazziniana *Sacc.* (184). *In culmis putridis.*
Diatrypella verruciformis *Nits.* (184). *In culmo putri* (Mich. I p. 23).
Didymosphaeria arundicola *Bizz.* (236). *Ad culmos.*
Eutypa arundinacea *Sacc.* (181). *In culmis* (F. V. IV p. 15).
Gloniella microtheca (*Hysterium microthecium*) *Sacc. et Speg.* (308). *In culmis induratis* (Mich. I p. 415).
Leptosphaeria donacina *Sacc.* (250). *In culmis emortuis putrescentibus* (M. S. p. 107).
Leptosphaeria rhodophaea *Bizz* (251). *In culmis vetustis.*

Lophidium (*Lophiostoma*) hygrophilum *Sacc.* (303). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 448).

Lophiotrema culmifragum *Speg.* (298). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 466).

Melanomma ceratophorum *Sacc. et Speg. In culmis* (Mich. I p. 403).

Melanospora vervecina *Fuck.* (282). *In culmo udo* (Mich. I p. 27).

Nectria hirtella *Sacc. et Speg.* (285). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 543).

Nectriella jucundula *Sacc. et Speg.* (280). *In culmis putrescentibus*

Physalospora Festucae *Sacc.* (205). *In foliis.*

Sordaria lanuginosa *Sacc.* (189 *In culmis putridis* (Mich. I p. 373).

Valsaria donacina *Ces. et DNtrs.* (240). *In culmis dejectis putrescentibus* (M. S. p. 148).

Discomyceteæ.

Helotium arundinellum *Sacc. et Speg.* (330). *In vaginis putrescentibus* (Mich. I p. 426).

Mollisia (*Niptera*) cinerea *Fuck.* (334). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 424).

Sphæropsideæ.

Chaetomella atra *Fuck.* (400). *In culmis putrescentibus.*

Coniothyrium arundinaceum *Sacc.* (409). *In culmis* (Mich. I p. 203).

Cytoplea arundinicola *Bizz. et Sacc.*(401). *In culmis putrescentibus.*

Dinemasporium graminum *Lév.* (447). *In culmis.*

Dinemasporium strigosum *Sacc.* (447). *In culmis.*

Diplodia arundinacea *Dur.* (!) (411). *In culmis* (M. S. p. 202).

Diplodia myriospora *Sacc.* (419). *In culmo putri intus et extus* (Mich. II p. 269).

Hendersonia Donacis *Sacc.* (420). *In culmis emortuis* (Mich I p. 211).

Phoma arundinacea *Sacc.* (382). *In culmis putrescentibus.*

Phoma arundinella *Sacc.* (382). *In culmis.*

Septoria donacina *Sacc. In culmis praesertim in eorum interiore pariete* (Mich. I p. 195).

Hyphomyceteæ.

Coniosporium Arundinis *Fr. In culmis dejectis, utis* (M. S. p. 179).

Cosmariospora Bizzozeriana *Sacc.* (535). *In culmis interioribus* (Mich. II p. 172).

Dendrodochium microsorum *Sacc.* (534). *In culmis udis* (Mich. II. p. 298).

Speira punctulata *C. et S. var* latebrosa *Bizz.* (502) *In parte culmorum interiore.*

Sporotrichum olivaceum *Link.* (475). *In culmis putrescentibus* (M. S. p. 183).

Torula protea *Sacc.* (496). *In superficie culmorum udorum* (Mich. II p. 292).

Trichosporium olivatrum *Sacc.* (505). *In culmis* (Mich. II p. 294).

Phragmites communis *Trin.*

Hypodermeæ.

Puccinia Phragmitis (*P. arundinacea*) *Hedw.* (137). *In vaginis foliisque* (M. S. p. 84).

Puccinia Magnusiana *Nke. In foliis vaginisque* (Mich. I p. 9).

Pyrenomyceteæ.

Apiospora Striola *Sacc.* (215). *In culmis* (F. V. II. 305).

Leptosphaeria arundinacea *Sacc.* (250). *In culmis dejectis* (M. S. p. 107).

Lophiotrema semiliberum *Sacc.* (298). *In culmis exsiccatis*

Physalospora Festucae *Sacc.* (205). *In vaginis foliisque* (Mich. I. p. 27).

Pleospora pyrenophoroides *Sacc.* (270). *In vaginis* (F. V. II. p. 309.

Scirrhia rimosa *Fuck.* (294). *In foliis languidis* (F. V. V p. 182).

Sphaerella lineolata *DNrs.* (214). *In foliis.* (M. S. p. 95).

Sphaerella Vaginae *Fuck. In vaginis foliorum* (M. S. p. 94).

Discomyceteæ.

Dinemasporium rodophaeum *Sp. In foliis emortuis* (Mich. I. p.

Sphæropsideæ.

Hendersonia arundinacea *Desm.* (420). *In culmis* (Mich. I p. 211).

Hendersonia crastophila *Sacc.* (Mich. I. p. 211).

Hendersonia graminicola *Lév.* (420). *In culmis* (M. S. p. 199).

Pirostoma circinans *Fr.* (444). *In culmis foliisque.*

Septoria arundinacea *Sacc.* (435). *In foliis* (Mich. I. p. 195).

Septoria littoralis *Speg.* (435). *In pagina interna vaginarum* (Mich. I. p. 487).
Septoria Phragmitis *Sacc.* (435). *In foliis* (Mich. I, p. 195).
Staganospora vexata *Sacc.* (422). *In culmis emortuis.*
Staganospora vexatula *Sacc.* (421). *In culmis emortuis.*
Vermicularia Dematium *Fr.* (391). *In caulibus* (M. S. p. 191).

Hyphomyceteæ.

Hadotrichum Phragmitis *Fuck.* (506). *In foliis languidis.*
Helminthosporium arundinaceum *Corda.* (515). *In foliis.*

Ammophila arundinacea *Host.*

Pyrenomyceteæ.

Claviceps purpurea *Tul.* (290). *In caryopsidibus.*
Pleospora infectoria *Fuck.* (270). *In culmis emortuis.*
Sphaerella lineolata *De Not.* (214). *In foliis emortuis.*

Bambusa arundinacea. *Willd.*

Pyrenomyceteæ.

Anthostomella italica *Sacc. et Speg.* (195). *In foliis putrescentibus.*
Apiospora Striola *Pass.* (215). *In culmis.*

Discomyceteæ.

Gymnosporium Bambusae *Thüm. et Bolle. In foliis emortuis* (Mich. I p. 352).

Psamma arenaria *R. et S.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria littoralis *Sacc.* 252). *In calamis* .

Agrostis.

Hypodermeæ.

Tilletia striaeformis *Niessl.* (129). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria microscopica *Karst.* (249). *In vaginis foliisque aridis.*

Sphærella ignobilis *Awd.* (214). *In foliis exsiccatis.* (F. V. V. p. 175).

Sphærella phyllachoroides *Succ.* (213). *In foliis.*

Milium effusum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria nigricans *Ces et De Not.* (251). *In vaginis.*

Deschampsia caespitosa *P. B.* (Aira caespitosa *L.*).

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria nigricans *Ces. et De Not.* (251), *In vaginis.*

Metasphaeria (*Leptosphaeria*) anarithma *Succ.* (261). *In foliis exsiccatis.* (Mich. I. p. 395).

Sphaerella anarithma *Succ.* (213). *In foliis exsiccatis* (F. V. V. p. 175).

Avena..

Hypodermeæ.

Ustilago segetum *Ditm.* (128). *Intra glumas* (M. S. p. 74).

Holcus lanatus *L.*

Hypodermeæ.

Tilletia striaeformis *Niessl*, (129). *In foliis* (Mich. I p. 8).

Sphæropsideæ.

Actinothyrium Graminis *K. et S.* (445). *In vaginis* (M. S, p. 203).

Glyceria aquatica *Wahlb.* (Glyceria spectabilis *M. et K.*).

Hypodermeæ.

Ustilago longissima *Tul.* (128). *In foliis* (F V. V p. 167),

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella ignobilis *Auersw.* (214). *In foliis.*

Glyceria.

Hypodermeæ

Puccinia coronata *Corda.* (142). *In foliis.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Tassiana *De Not,* (214). *In foliis, raro in culmis.*

Trisetum.

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria microscopica *Karst.* (194). *In vaginis foliisque aridis.*

Poa alpina *L.*

Pyrenomyceteæ.

Scirrhia Poæ *Fuck. In foliis* (M. S. p. 146).

Poa annua *L.*.

Hypodermeæ.

Eutyloma crastophilum *Sacc.* (130). *In foliis subvivis* (Mich. I p. 540).

Poa.

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria microscopica *Karst.* (249). *In vaginis foliisque aridis.*
Sphaerella Tassiana *De Not.* (214). *In foliis, raro in culmis.*

Dactylis glomerata *L.*

Hypodermeæ.

Uromyces Dactylis *Otth.* (185). *In foliis* (M. S. p. 208).

Pyrenomyceteae.

Apiospora Punctum *Sacc.* (215). *In foliis putrescentibus.*
Epichloe typhina *Tul.* (291). *In culmis* (Mich. II p. 531).
Erysiphe Graminis *DC.* (165). *In foliis* (F, V p. 173).
Leptosphaeria nigricans *Ces. et DNtrs.* (251). *In vaginis.*
Lophiotrema semiliberum *Sacc.* (298). *In culmis exsiccatis.*
Phyllachora Graminis *Fuck.* (292). *In foliis emortuis vel semiemortuis.*

Hyphomyceteæ.

Sphaeelia typhina *Sacc.* (533). *In vaginis* (Mich. II p. 297).

Koeleria cristata *Pers.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria herpotrichoides *De Not.* (252). *In culmis.*

Molinia cœrulea *Mnch.*

Hypodermeæ

Puccinia Moliniae *Tul.* (142). *In foliis* (M. S. p. 208)

Pyrenomyceteæ.

Apiospora Punctum *Sacc.* (215). *In foliis putrescentibus.*
Schizostoma bellunese *Speg.* (296). *Ad culmos dejectos putrescentes* (Mich. II p. 255).

Discomyceteæ.

Belonium Graminis *Sacc.* (*Pyrenoepsiza hysterina Sacc.*) (340). *In culmis vaginisque* (Mich. I p. 254).

Lachnella (*Hyalopeziza*) carneola *Sacc.* (328). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 253).

Pseudopeziza (*Trochila*) diminuens *Karst. var.* crastophila *Sacc.* (356). *In foliis languidis* (Mich. I. p. 420)

Sphæropsideæ.

Actinothyrium Graminis *Kunze.* (445). *In foliis siccis.*

Septoria Bellunensis *Speg.* (435). *Ad folia languida* (Mich. II p. 167).

Festuca duriuscula *L.*

Pyrenomyceteæ.

Phyllacora sylvatica *Sacc. et Speg. In foliis vivis* (Mich. I p. 410).

Festuca

Pyrenomyceteæ.

Acrospermum Graminum *Lib.* (312). *In foliis* (M. S p. 209).

Leptosphaeria (*Sphaerella*) crastophila *Sacc.* (249). *In foliis.* (M. S. p. 94).

Leptosphaeria eustomella *Sacc. In culmis majorum specierum* (Mich. II p. 251).

Phyllachora Graminis *Fuck.* (292). *In foliis emortuis vel semiemortuis.*

Physalospora Festucae *Sacc.* (205). *In foliis.*

Pleospora pyrenophoroides *Sacc.* (270). *In foliis putrescentibus* (F. V. II p. 309).

Sphaerella Tassiana *De Not.* (214). *In foliis, raro in culmis.*

Sphaeropsideæ.

Septoria Tritici *Desm.* (435). *In foliis* (Mich. I p. 194).

Bromus

Pyrenomyceteæ.

Claviceps purpurea *Tul.* (290). *In caryopsidibus.*

Lophiotrema semiliberum *Sacc.* (298). *In culmis exsiccatis.*

Pleospora pyrenophoroides *Sacc.* (270). *In foliis putrescentibus* (F. V. II p. 309).

Phyllacora Graminis *Fuck.* (292). *In foliis grainum* (M. S. p. 144).

Serrafalcus mollis *Parl.* (Bromus mollis *L.*)

Sphaeropsideæ.

Septoria Bromi *Sacc.* (435). *In foliis* (Mich. I p. 194).

Lolium perenne *L.*

Pyrenomyceteæ.

Claviceps purpurea *Tul* (290). *In fructibus* (M. S. p. 125).

Lolium.

Hypodermeæ.

Puccinia coronata *Corda.* (142). *In foliis.*

Puccinia Graminis *de Bary.* (142). *In foliis* (M. S. p. 84).

Pyrenomyceteæ.

Claviceps purpurea *Tul.* (290). *In caryopsidibus.*

Brachypodium pinnatum *P. B.*

Sphæropsideæ.

Septoria affinis *Sacc.* (435). *In foliis* (Mich. I p. 194).

Brachypodium sylvaticum *R. et S.* (B. gracile *P. B.*).

Hypodermeæ.

Puccinia linearis *Desm.* (*P. Brachypodii Fuck.*) (137). *In foliis vaginisque* (M. S. p. 84).

Uromyces Dactylis *Otth.* (135). *In foliis* (M. S. p. 208)

Brachypodium.

Pyrenomyceteæ.

Pleospora infectoria *Fuck.* (270). *In culmis emortuis.*

Sphæropsideæ.

Septoria Tritici *Desm.* (135). *In foliis* (Mich. I p. 194).

Hyphomyceteæ.

Scolecotrichum Graminis *Fuck.* (510). *In foliis* (Mich. II p. 555).

Agropyrum repens *P. B.*

Pyrenomyceteæ.

Claviceps purpurea *Tul.* (290). *In fructibus* (M. S. p. 125)

Agropyrum junceum *P. B.* (Triticum junceum *L.*)

Hyphomyceteæ.

Sphacelia typhina *Sacc.* (533). *In rachide* (Mich. II p. 297).

Agropyrum

Pyrenomyceteæ.

Ophiobolus (*Raphidophora*) Graminis *Sacc.* (278). *In basi culmi putrescente* (F. V. II p. 308).
Phyllachora Graminis *Fuck.* (292). *In foliis emortuis vel semiemortuis.*

Secale cereale *L.*

Hypodermeæ.

Puccinia Graminis *de Bary* (142). *In foliis* (M. S. p. 84).

Pyrenomyceteæ.

Claviceps purpurea *Tul.* (290). *In fructibus* (M. S. p. 125).

Gloniopsis culmifraga *Sacc.* (308). *In culmis vetustis vel emortuis.*

Lophiostoma graminum *Sacc.* (302). *In culmis putridis.*

Pleospora infectoria *Fuck.* (270). *In culmis emortuis.*

Hyphomyceteæ.

Sclerotium Clavus *D. C.* (514). *In caryopsidibus.*

Triticum vulgare *Vill.* (T. sativum *L.*).

Hypodermeæ.

Tilletia laevis *Kühn.* (129). *In ovariis* (F. V. V p. 168).

Pyrenomyceteæ.

Gibberella (*Botryosphaeria*) pulicaris *DNtrs.* (288). (F. V. IV p. 5).

Ophiobolus (*Raphidophora*) herpotrichus *C. DNtrs.* (278). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 463).

Pyrenophora relicina *Sacc.* (271). *In culmis.*

Triticum

Hypodermeæ.

Puccinia coronata *Corda.* (142). *In foliis.*

Puccinia Graminis *de Bary.* (142). *In foliis* (M. S. p. 84).

Tilletia Tritici *Wint.* (*T. Caries Tul.*) (139). *Ad caryopsides* (M. S. p. 74).

Ustilago segetum *Ditm.* (128). *Inter glumas* (M. S. p. 73).

Pyrenomyceteæ.

Acanthostigma (*Lasiosphaeria*) pygmaeum *Sacc. et Speg.* (265). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 406).

Claviceps purpurea *Tul.* (290). *In caryopsidibus.*

Didymella (*Didymosphaeria*) culmigena *Sacc.* (217). *In culmis vaginisque* (Mich. I p. 377).

Gloniella (*Hysterium*) Moliniae *DNtrs.* (308). *In culmis vaginisque* (Mich. I p. 252)

Lophiotrema (*Lophiostoma*) semiliberum *Ces. et DNtrs.* (298). *In culmis dejectis* (M. S. p. 111).

Phyllachora Graminis *Fuck.* (292). *In foliis* (M. S. p. 141).
Pleospora infectoria *Fuck.* (270). *In culmis putrescentibus* (M. S. p. 103).
Pleospora Straminis *Sacc. et Speg.* (270). *In vaginis putrescentibus nigrificatis* (Mich. I. p. 407).
Sphaerella Tassiana *De Not.* (214). *In foliis, raro in culmis.*

Discomyceteæ.

Mollisia (*Niptera*) cinerea *Fuck.* (334). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 424).

Hyphomyceteæ.

Sclerotium Clavus *D. C.* (544). *In caryopsidibus.*

Hordeum vulgare *L.*

Hypodermeæ.

Ustilago segetum *Ditm.* (128). *Intra glumas* (M. S. p. 74).

Hyphomyceteæ.

Helminthosporium teres *Sacc.* (514). *In foliis languidis* (Mich. II p. 558).

Hordeum

Pyrenomyceteæ.

Claviceps purpurea *Tul.* (290). *In caryopsidibus.*
Pleospora infectoria *Fuck.* (270). *In culmis emortuis.*

Hyphomyceteæ.

Saccharomyces (*Hormiscium*) Cerevisiae *Bl Meyen* (26). *In seminibus germinantibus in quibus fermentationem alcoholicam generat* (M. S. p. 176).

Elymus arenarius *L.*

Pyrenomyceteæ.

Phyllachora Bromi *Fuck* (292). *In foliis.*

Graminaceæ indeterminateæ.

Hymenomyceteæ.

Marasmius graminum *Berk.* (59). *In culmis putridis* (Mich. II p. 244).

Typhula incarnata *Lasch. In detritis emarcidis* (Mich. II p. 529).

Pyrenomyceteæ.

Acrospermum graminum *Lib.* (312). *In foliis putridis.*

Anthostomella Tomicum *Sacc.* (194). *In foliis putrescentibus.*

Chaetomium comatum *Sacc.* (188). *In foliis putrescentibus* (M. S, p. 91).

Epichloe typhina *Tul.* (291). *In vaginis foliorum* (M. S. p. 125).

Erysiphe Graminis *D. C.* (165). *In foliis.*

Lasiosphaeria hispidula *Sacc. et Speg.* (264). *In culmis* (Mich. I p. 406).

Leptosphaeria culmicula *Karst.* (251). *In culmis variis* (F. V. II p. 322).

Leptosphaeria culmifraga *Ces et DNtrs.* (251). *In culmis dejectis sp. maj.* (M. S. p. 107).

Leptosphaeria microscopica *Karst.* (249). *In foliis emortuis* (Mich. II p, 161).

Leptosphaeria rhodophaea *Bizz.* (251). *In culmis.*

Lophodermium arundinaceum *Chèv.* (311). *In vaginis foliisque* (M. S. p. 157).

Lophiostoma insidiosum *Ces. et DNtrs.* (302). (Mich. I p. 543).

Metasphaeria (*Leptosphaeria*) anarithmoides *Sacc. et Speg.* (262). *In foliis putrescentibus* (Mich. I p. 395).

Ophiobulus herpotrichus *Sacc.* (278). *In culmis vaginisque.*

Phyllachora Graminis *Fuck.* (292). *In foliis emortuis vel semi-emortuis.*

Sphaerella ignobilis (S. *perpusilla*) *Fuck.* (214). *In foliis* (M. S. p. 209).

Sphaerella phyllachoroides *Sacc.* (213). *In foliis aridis* (F. V. II p. 304).

Discomyceteæ.

Belonium Graminis *Sacc.* (340). *In culmis putridis.*

Helotium Scutula *Karst.* (232). var. epicalamium *In culmis vaginisque spec. major.* (Mich. I p. 427).

Lachnella carneola *Sacc.* var. rhodoleuca *Sacc.* (328). *In culmis.*
Mollisia (*Micropeziza*) rufula *Sacc.* (337). *In culmis putrescentibus* (Mich. I p. 64)
Mollisia stictoidea *Sacc.* (336). *In foliis emortuis.*

Myxomyceteæ.

Chondrioderma difforme *Rost.* (11). *In culmis putrescentibus dejectis* (Mich, II p. 166).

Sphæropsideæ.

Dinemasporium (*Polynema*) strigosum *Fr.* (447). *Ad culmos et folia exarida* (M. S. p. 189).
Hendersonia culmicola *Sacc.* (*H. subseriata Desm.*) (421). *In culmis sp. inf.* (F. V. V p. 207).
Septoria Graminum *Desm. In foliis* (M. S. p. 197).
Staganospora (*Hendersonia*) graminella *Sacc.* (421). *In culmis sp. inf.* (Mich. I p. 210).

Hyphomyceteæ.

Chaetostroma atrum *Sacc.* (541). *In culmis foliisque* (Mich. II p. 174).
Cladosporium graminum *Lk.* (512). *Ad folia et in glumis* (M. S. p. 181).
Oidium monilioides *Link.* (470). *In foliis.*
Scolecotrichum Graminis *Fuck.* (510). *In foliis.*
Sporadum conopleoides *Corda.* (506). *In culmis foliisque putrescentibus.*
Tetraploa aristata *B. et Br.* (501). *In culmis* (F. V. V p. 193).



CRYPTOGAMAE

Polypodiaceæ.

Polypodium vulgare *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Tyrolensis *Ard.* (214). *In maculis rufescentibus paginae superioris* (Mich. I p. 34).

Polypodium Phaegopteris *L.*

Hypodermeæ.

Caeoma filicinum *Niessl.* (150). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 157).

Polypodium Dryopteris *L.*

Hypodermeæ.

Caeoma filicinum *Niessl.* (*C. macrosporum Wallr.*) (150). *In pag. inf. foliorum* (Mich. II p. 158).
Caeoma Polypodii *Pers.* (150). *In foliis* (Mich. II p. 157).

Aspidium

Sphæropsideæ.

Leptostroma filicinum *Fr.* (444). *In stipitibus.*

Cystopteris fragilis *Bernh.*

Hypodermeæ.

Cacoma Polypodii *Pers.* (150). *In foliis* (Mich. II p. 157).

Scolopendrium vulgare *Sym.* (S. officinarum *Sm.*).

Hypodermeæ.

Cacoma Polipodii *Pers.* (150). *In foliis* (Mich. II p. 157).

Sphæropsideæ.

Septoria Scolopendrii *Sacc.* (436). *In fronde* (Mich. I p. 197).

Adiantum Capillus-Veneris *L.*

Hypodermeæ.

Cacoma Polypodii *Pers.* (*Cacoma filicum Lk.*) (150). *In hypophyllo* (Mich. II p. 157).

Pteris aquilina *L.*

Hymenomyceteæ.

Pistillaria quisquiliaris *Fr. Ad frondes emortuas* (Mich. II p. 244).

Pyrenomyceteæ.

Acrospermum compressum *Tode.* (312). *In caule* (Mich. II p. 257).
Didymella (*Didymosphaeria*) lophospora *Sacc. et Speg.* (217). *In pag. sup. frondis emortuae* (Mich. I p. 376).
Microthyrium litigiosum *Sacc.* (295). *In stipitibus.*
Phyllachora Pteridis *Fuck.* (293). *In pag. inf. foliorum adhuc viventium* (Mich. II p. 562).
Rhopographus filicinus *Nke.* (295). *In stipitibus dejectis* (M. S. p. 145).
Sphaerella Pteridis (*S. aquilina*). *Strss.* (214). *In frondibus dejectis* (M. S. p. 94).

Sphaerella prominula *Speg.* (214). *In folia emortua* (Mich. II p 456).

Sphaerella Pteridis *DNtrs.* (214). *In frondibus emortuis* (Mich. I p. 380).

Discomyceteæ.

Helotium chrysostigma *Karst.* (330). *In frondibus dejectis* (Mich. II p. 165).

Lachnella Pteridis *Sacc.* (328). *In petiolis.*

Stictis radiata *Pers.* (354). *In ramis dejectis et in caulibus putrescentibus* (M. S. p. 157).

Trichopeziza pulveracea *Fuck. In stipitibus dejectis* (M. S. p. 163).

Sphæropsideæ.

Discosia Artocreas *Fr.* (445). (Mich. I p. 201).

Leptostroma filicinum *Fr.* (444). *In stipitibus.*

Leptothyrium litigiosum *Sacc.* (443). *In stipitibus.*

Hyphomyceteæ.

Fusarium roseum *Link.* var. Filicis (538). *In stipitibus* (Mich. II p. 295).

Melanconieæ.

Pestalozzia funerea *Desm.* var. typica (459). *In foliis vivis vel emortuis* (Mich. I p. 478).

Pestalozzia macrospora *Ces.* var. macropoda *Speg.* (459). *In frondibus emortuis* (Mich. I p. 480).

Equisetaceæ.

Equisetum arvense *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria arvensis *Speg.* (252). *In caulibus emortuis putrescentibus* (Mich. I p. 459).

Equisetum Telmateja *Ehrh.*

Hymenomyceteæ.

Typhula candida f. Equiseti *Fr.* (119). *In caulibus emortuis* (Mich. I p. 437).

Equisetum sylvaticum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Equiseti *Fuck.* (215). *In caulibus.*

Equisetum palustre *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sphaerella Equiseti *Fuck.* (215). *In caulibus putrescentibus* (F, V. V p. 175).

Discomyceteæ.

Naevia laetissima *Fuck.* (358). *In caulibus ramisque emortuis* (Mich. I p. 421).

Stamnaria Persoonii *Fuck.* (348). *In caulibus ramisque* (Mich. I p. 67).

Equisetum hyemale *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria hyemalis *Sacc. et Speg.* (252). *In caulibus* (Mich. I. p. 396).

Venturia riparia *Sacc. In caulibus emortuis* (Mich. I p. 382).

Equisetum ramosissimum *Desf.* (E ramosum *Schl.*).

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria hiemalis *Sacc. et Speg* (252). *In caulibus putridis.*

Equisetum

Discomyceteæ.

Stictis Saccardoi *Rehm.* (354). *In caulibus* (Mfch. I p. 61).

Lycopodiaceæ.

Lycopodium annotinum *L.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria Campi-Silii *Speg.* (252). *In foliis emortuis.*

Selaginellaceæ.

Selaginella helvetica *Lk.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria helvetica *Sacc. et Speg.* (252). *In pag. sup. foliorum languidorum* (Mich. I p. 339).

Musci.

Sphagnum acutifolium *Ehrh.*

Hymenomyceteæ.

Hydnun diaphanum *Schräd.* (108). *In calidariis* (Mich I p. 5)

Discomyceteæ.

Helotium procerum *Karst. Ad folia emortua* (Mich. II p. 261).

Mnium undulatum *Hedw.*

Hymenomyceteæ.

Cyphella muscicola *Fr.* (110). *Ad folia* (Mich. I p. 136).

Myxomyceteæ.

Physarum sinuosum *Grev.* (9). *In foliis emortuis* (F. V. V p. 185).

Bartramia

Discomyceteæ.

Peziza Auricula *Cke.* (320). *Ad rupes udas in radicibus* (Mich. I p. 431).

Tortula tortuosa *Ehrb.*

Pyrenomyceteæ.

Leptosphaeria Bryophyla *Sacc.* (252). *In pedunculis* (F. V. II p. 319).

Orthotrichum diaphanum *Schräd.*

Myxomyceteæ.

Physarum virescens *Ditm.* (9). (F. V. IV p. 39).

Musci indeterminati

Corticium epiphyllum *Sacc. In muscis nondum emortuis* (Mich. I p. 6).
Polyporus cinnamomeus *Sacc.* (96). (Mich. I p. 362).

Lycoperdaceæ.

Cenococcum geophilum *Fr.* (362). *Inter radices* (Mich. I p. 417).

Tuberaceæ.

Elaphomyces citrinus *Vitt.* (362). *In terra calcareo-sabulosa inter radices quercuum* (Mich. I p. 469).

Discomyceteæ.

Peziza leucoloma *Hedw.* (*Leucoloma Hedwigii Fuck.*) (223). (M. S. p. 166).
Peziza Crouani *Cke.* (322). (Mich. I p. 429).

Myxomyceteæ.

Badhamia inaurata *Curr.* (8). *Ad salices* (Mich. I p. 545)
Didymium farinaceum *Schräd.* (10).
Fuligo varians *Sommf.* (8).
Physarum leucophaeum *Fr.* (9). (F. V. IV p. 39).
Physarum sinuosum *Rost.* (9).
Physarum virescens *Ditm.* (9). (F. V. IV p, 39).
Trichia fragilis var. Lorniseriana *Corda.* (15). (M. S. p. 171).

Hyphomyceteæ.

Dactylium dendroides *Fr.* (485). (F. V. V p. 196).
Monilia hesperidica *Sacc.* (480). *In muscis putrescentibus.*
Septocylindrium muscorum *Sacc.* (469). *In muscis emortuis udis in calidariis* (Mich. II p. 552).

Hepaticæ.

Preissia hemisphaerica *Nees.*

Discomyceteæ.

Helotium epiphyllum *Fr.* var. Marchantiae *Fr.* (329). *Ad frondes* (Mich. II p. 260).

Marchantia

Discomyceteæ.

Geoglossum glutinosum *Pers.* (316). *In locis udis* (Mich. I p. 444).

Sphæropsideæ.

Ascochyta Marchantiae *Sacc. et Speg.* (424). *In fronde emortua* (Mich. I p. 167).
Phyllosticta Marchantiae *Sacc.* (370). *In fronde* (Mich. I p. 144).

Algæ.

Scytonema

Schizomyceteæ.

Leptothrix parasitica *Kütz.* (21).

Conferva

Hyphomyceteæ.

Stereomema asperum *Menegh. Ad Confervas putrefactas diu servatas* (M. S. p. 176).
Stereoma lutescens *Ktz. Cum praecedente* (M. S. p. 176).

Algae indeterminatae

Schizomyceteæ.

Leptotrix parasitica *Kütz.* (21).

Lichenes.

Placodium albescens *Massal.*

Pyrenomyceteæ.

Epicymatia vulgaris *Fuck.* (218). *In apotheciis.*

Psoroma commune *Massal.*

Pyrenomyceteæ.

Orbicula (*Sphaeria*). Variolariae *Mass.* (167). *Ad thallum* (M. S. p. 99).

Psoroma crassum *Massal.*

Pyrenomyceteæ.

Epicymatia (*Sphaeria*) Psomarotis *Mass.* (218). *Ad thallum* (M. S. p. 99).

Lecanora rimosa var. grumosa. *Schaer.*

Pyrenomyceteæ.

Metasphaeria (*Sphaeria*) Lichenis sordidi *Mass.* (262). *In apotheciis* (M. S. p. 98).

Lecanora chalibea *Schaer.*

Pyrenomyceteæ.

Tichothecium erraticum *Mass. In thallo* (M. S. p. 100).

Lecanora

Pyrenomyceteæ.

Epicymatia vulgaris *Fuck.* (*Sphaeria Apotheciorum Mass.*) (218). *In apotheciis* (M. S. p. 98).

Parmelia caperata *Ach.*

Pyrenomyceteæ.

Epicymatia vulgaris *Fuck.* (*Sphaerella Epicymatia Wallr.* seu *Sphaeria Apotheciorum Mass.*). (218). *In thallo emortuo putrescente et in apotheciis* (M. S. p. 98 et Mich. I p. 456).

Discomyceteæ.

Abrothallus Buellianus *DNtrs. In thallo* (M. S. p. 156).
Abrothallus Smithii. *Tul. In thallo* (M. S. p. 156).
Nesolechia thallicola *Mass. In thallo* (M. S. p. 156).
Pyrenopeziza lichenicola *Speg. In thallo emortuo* (Mich. I p. 472).

Pachyospora viridescens *Massal.*

Pyrenomyceteæ.

Epicymatia (*Dothidea*) lichenicola *Mass.* (218). *In lamina proligera* (Mich. I p. 53).

Urceolaria calcarea *DC.*

Discomyceteæ.

Leciographa parasitica *Mass. In thallo* (M. S. p. 156).

Borrera

Hyphoymceteæ.

Illosporium roseum *Fr.* (534). (Mich. I p. 263).

Lichene indeterminati.

Hyphomyceteæ.

Tubercularia (?) lichenicola *Sacc.* (533). *In thallo* (Mich. II p. 561).

Fungi.

Agaricus

Phycomyceteæ.

Sporodinia dichotoma *Cda.* (159). *In agaricis putrescentibus* (M. S. p. 208).

Pyrenomyceteæ.

Eleutheromyces subulatus *Fuck. In agaricis putrescentibus* (Mich. I p. 50).
Hypomyces chrysospermus *Tul*, (283). *In agaricis*,
Hypomyces Linkii *Tul.* (M. S. p. 124).

Hyphomyceteæ.

Aspergillus glaucus *Link. var.* olivascens *Sacc.* (473). *In fungis praeprimis putrescentibus* (Mich. II p. 543).
Amblyosporium umbellatum *Harz.* (*Briarea aurea Fuck.* (473). *In agaricis putridis* (M. S. p. 184).
Dactylium dendroides *Fr.* (485). *In agaricis putridis* (F. V. V p. 196).
Isaria brachiata *Sch.* (527). *In agaricis putrescentibus.*
Monosporium spinosum *Bon.* (476). *In agaricis putribus* (F. V. V p. 195).
Mycogone rosea *Link.* (485). *In agaricis subputrescentibus.*

Nyctalis

Hyphomyceteæ.

Asterophora agaricicola *Corda.* (481). *In pileo.*

Coprinus digitalis *Batsch.*

Mycelia sterilia.

Sclerotium mycetophagum *Sacc.* (543). *In lamellis* (Mich. I p. 274).

Cortinarius

Hyphomyceteæ.

Myrothecium inundatum *Tode.* (540). *In Corticinariis putescentibus* (Mich. I p. 478).

Russula nigricans

Hymenomyceteæ.

Nyctalis asterophora *Fr.* (52). *Parasitica.*

Russula

Hyphomyceteæ.

Asterophora agaricicola *Corda.* (481). *In pileo.*

Monosporium spinosum *Bon.* (476). *In Russulis putribus* (F. V. V p. 195).

Boletus

Pyrenomyceteæ.

Hypomyces chrysospermus *Tul.* (283). *In Boletis putrescentibus* (M. S. p. 124).

Hyphomyceteæ.

Sepedonium chrysospermum *Link.* (480). *In Boletis putrescentibus.*

Fistulina hepatica *Fr.*

Hyphomyceteæ.

Cephalosporium stellatum *Harz.* (471). *In Fistulina hepatica putri* (F. V. V p. 194).
Spicaria elegans *Cda. In cortice putri* (F. V. V p. 194).
Sporothricum roseum *Link.* (475). *In Fistulina hepatica putrescente* (M. S. p. 183).
Trichosporium (*Sporothricum*) murinum *Bon.* (505). *In cortice putri* (F. V. V p. 192).

Polyporus Pes Caprae *L.*

Hyphomyceteæ.

Oospora (*Torula*) vinosella *Sacc.* (468). (Mich. I p. 265).

Polyporus squamosus *Huds.*

Discomyceteæ.

Calloria epipora *Speg.* (348). *Ad hymenium* (Mich. II p. 259).

Sphæropsideæ.

Coniothyrium epimyces *Sacc. et Speg.* (400). *In cute putri* (Mich I p. 206).

Polyporus fomentarius *L.*

Hyphomyceteæ.

Cephalosporium macrocarpum *Cda.* (471). *In Polyporo fomentario putrescente udo* (Mich. I p. 271).

Polyporus versicolor *L.*

Hyphomyceteæ.

Diplocladium minus *Bon. In Polyporo versicolori putri* (F. V. V p. 196).

Polyporus

Pyrenomyceteæ.

Hypomyces rosellus *Tul.* (283).

Hyphomyceteæ.

Fumago fungicola *Sacc.* (523). *In superficie Polypori emarcidi.*

Hydnum compactum *Inz.*

Hyphomyceteæ.

Chalara (*Cylindrium*) fungorum *Sacc.* (509). *In Hydno compacto marcescente* (M. S. p. 177).

Corticium polygonium *P.*

Pyrenomyceteæ.

Hypocrea hypomycella *Sacc.* (287). *In hymenio ad carpinos.*

Corticium comedens *Nees.*

Pyrenomyceteæ.

Hypomyces rosellus *Tul.* (283). (M. S. p. 121).

Cratellerus

Hyphomyceteæ.

Sepedonium chrysospermum *Link.* (480). *In Craterellis putrescentibus.*

Stereum

Pyrenomyceteæ.

Hypomyces rosellus *Tul.* (283).

Clavaria cristata *P.*

Pyrenomyceteæ

Helminthosphaeria Clavariarum *Fuck.* (188). *In Clavaria cristata languente* (M. S. p. 115).

Clavaria formosa *Krombh-*

Hyphomyceteæ.

Verticillium epimyces *B. et Br.* (482). (M. S. p. 86).

Scleroderma verrucosum *Pers,*

Hymenomyceteæ.

Boletus parasiticus *Bull.* (90).

Scleroderma

Pyrenomyceteæ.

Hypomyces chrysospermus *Tul.* (283).

Cyathus vernicosus *D. C.*

Myxomyceteæ.

Didymium squamulosum *Alb. et Schw.* (10). (F. V. IV p. 40).

Hyphomyceteæ.

Fusarium miniatum *Sacc.* (536). *In peridiis, praesertimque in sporangiis.*

Aecidium Euphorbiae *Gm.*

Hyphomyceteæ.

Cladosporium aecidiicola *Thüm.* (511). *Ad folia Euphorbiae palustris* (Mich I p. 476).

Uredo

Sphæropsideæ.

Darluca Filum *Cast.* (416). (M. S. p. 192).

Dimerosporium pulchrum *Sacc.*

Hyphomyceteæ.

Titaea callispora *Sacc.* (484). *Ad folia Carpini Betuli.*

Valsa Vitis *Fuck.*

Hyphomyceteæ.

Graphium cinerellum *Speg.* (529). *Parasitans ad ramulos emortuos Vitis viniferae.*

Eutypa spinosa *Tul.*

Hyphomyceteæ.

Trichosporium Bizzozerianum *Sacc.* (505). *Ad ramos fagineos.*

Eutypa lata *Tul.*

Pyrenomyceteæ.

Nectria episphaeria *Fr.* (284). *In peritheciis* (M. S. p. 123).

Eutypa leioplaca *Cooke.*

Hyphomyceteæ.

Cladosporium stromatum *Pr.* (511). *In stromate ad Acer campestre.*

Cryptovalsa Rabenhorstii *Sacc.*

Pyrenomyceteæ.

Nectria episphaeria *Fr.* (284). *In perithecis* (M. S. p. 123).

Diatrype

Pyrenomyceteæ.

Nectria episphaeria *Fr.* (284). *Parasitans.*

Diatrypella verruciformis *Nits.*

Pyrenomyceteæ.

Nectria episphaeria *Fr.* (284). *In peritheciis* (M. S. p. 123).

Discomyceteæ.

Stictis aecidiiformis *Speg.* (354). *Parasitica in stromatibus* (Mich. I p. 471).

Ustulina

Pyrenomyceteæ.

Nectria episphaeria *Fr.* (284). *Parasitans.*

Hypoxylon coccineum *Bull.*

Hyphomyceteæ.

Isaria umbrina *Pers.* (527). *Circa stromata iuniora in truncis Ulmi, Aceris etc.*

Hypoxylon purpureum *Nits.*

Hyphomyceteæ.

Botrytis geniculata *Corda.* (476). *In stromate* (Mich. II p. 285).
Cephalosporium Acremonium *Cda.* (471). *In Hypoxylon purpureo putrescente* (Mich. I p. 271).

Hxpoxylon

Pyrenomyceteæ.

Nectria episphaeria *Fr.* (284). *Parasitans.*

Rosellinia Aquila *DNtrs.*

Hyphomyceteæ.

Sepedonium byssicolum *Sacc.* (480). *In bysso humidula* (Mich. II p. 551).

Gnomonia fimbriata *Awersw.*

Hyphomyceteæ.

Verticillium capitatum *Ehrbg.* (481). *Parasitica* (F. V. V p. 194).

Diaporthe Mahoniae *Speg*

Discomyceteæ.

Stictis aecidiiformis *Speg* (354). *Parasitica in stromatibus* (Mich. I p. 471).

Fenestella vestita *Sacc.*

Pyrenomyceteæ.

Passerinula candida *Sacc.* (287). *In stromatibus* (F. V. IV p. 22).

Capnodium Footii *Berk. et Desm.*

Hyphomyceteæ.

Oospora (*Torula*) hyalinula *Sacc.* (467). *Parasitica in Capnodio Footii folia Oleae fragrantis invadente* (Mich. I p. 265).

Valsaria insitiva *Ces. et DNtrs.*

Pyrenomyceteæ.

Passerinula candida *Sacc.* (187). *In stromatibus* (F. V. IV p. 22).

Valsaria

Mycelia sterilia.

Ozonium (*t*) croceum *Pers.* (141). *In stromatibus ad ramos Robiniae Pseudo-Acaciae* (Mich. I p. 275).

Massaria inquinans *DNtrs.*

Pyrenomyceteæ.

Calonectria Massariae *Sacc.*. (288). *In ostiolis ad ramos Aceris campestris.*

Hyphomyceteæ.

Microcera Massariae (540). (Mich. I p. 263).

Cucurbitaria protracta *Fuck.*

Pyrenomyceteæ.

Nectria episphaeria *Fr*, (284). *In peritheciis* (M. S. p. 123).

Pyrenomycetes.

Pyrenomyceteæ.

Passerinula candida *Sacc.* (287). *In peritheciis Pyrenomycetum maiorum.*

Mycelia sterilia.

Ozonium (?) croceum *Pers.* (544). *In stromatibus ad ramos Robiniae Pseudo-Acaciae* (Mich. I p. 275).

Elaphomyces granulatus *Fr.*

Pyrenomyceteæ.

Cordyceps ophioglossoides *Link.* (290). *Parasitans.*

Elaphomyces muricatus *Fr.*

Pyrenomyceteæ.

Cordyceps ophioglossoides *Link.* (290). *Parasitans.*

Peziza.

Hyphomyceteæ.

Mycogone cervina *Ditm.* (*Hypomyces cervinus Tul.*) (485). *In Pezizis emarcidis* (M. S. p. 124).

Helvella crispa *Fr.*

Pyrenomyceteæ.

Mycogone cervina *Ditm.* (*Hypomices cervinus Tul.*) (485). (M. S. p. 124).

Oidium Tuckeri *Berk.*

Sphæropsideæ.

Cicinnobolus Cesatii *De Bary.* (390). *In mycelio.*

Alternaria tenuis *Nees.*

Hyphomyceteæ.

Cephalosporium Acremonium *Corda. var.* maius *Penzig.* (471). *In caespitulis ad folia Citri Aurantii.*

Stilbeae.

Hyphomyceteæ.

Echinobotryum atrum *Corda.* (497). *Parasitans in hyphis.*

Isaria.

Hyphomyceteæ.

Corethropsis pulchra *Sacc.* (471). *In speciebus in Insectis parasitantibus.*

Tubercularia vulgaris *Pers.*

Hyphomyceteæ.

Haplotricium glomerulosum *Harz*, (470). *Ad acervulos in ramis Robiniae.*

Tubercularia.

Hyphomyceteæ.

Torula Tubercularia *Nees.* (496). *Ad acervulos in ramis Mori nigrae* (M. S. p. 178).
Verticillium epimyces *B. et Br.* (582). (M. S. p. 186).

Fungi indeterminati.

Phycomyceteæ.

Mucor stolonifer *Ehrb.* (*Ascophora Mucedo Tod.*) (158). *In fungis lignosis putrescentibus* (M. S. p. 90).
Sporodinia dichotoma *Corda.* (*Mucor ramosus Bull.*) (150). *In fungis putridis* (M. S. p. 90).

Hyphomyceteæ.

Aspergillus candidus *Link.* (472). *In fungis putrescentibus* (M. S. p. 184).
Epochnium fungorum *Fr. In fungis variis putrescentibus* (M. S. p. 182).
Oospora (*Torula*) vinosella *Sacc.* (468). *In fungis udis* (Mich. I p. 265).
Penicillium candidum *Lk.* (473). *In fungis putrescentibus* (F. V. V p. 194).
Penicillium glaucum *Link.* (474). *In fungis* (M. S. p 183)
Spicaria elegans *Harz.* (483). *In fungis putrescentibus.*
Torula candida *Opiz. In fungis lignosis putrescentibus* (M. S. p. 177).
Trichoderma viride *Passs.* (471). *In fungis putrescentibus.*



Fungorum nutrices quae partes sunt vegatabilium incertarum specierum.

Caules, culmi etc. v. putrescentes, v. dejecti, v. exsiccati etc.

Hymenomyceteæ.

Ciphella (*Trichopeziza*) villosa *Karst.* (109). *Ad caules dejectos putrescentes* (M. S. p. 163).
Cortinarius castaneus *Fr.* (74).

Pyrenomyceteæ.

Hypoderma commune *Duby.* (310). (M. S. p. 158).
Lophiostoma caulium *Ces. et DNtrs.* (301). (M. S. p. 210).
Lophiotrema Cadubriae *Speg.* (249). (Mich. II, p. 163).
Lophiotrema (*Lophiostoma*) vagabundum *Sacc.* (299). (Mich. I, p. 447).
Pleospora herbarum *Rabh.* (269). (M S. p. 102).
Pyrenophora (*Leptosphaeria, Pleospora*) calvescens *Sacc.* (271). (F. V. II p. 315).

Discomyceteæ.

Calloria leucostigmoides *Sacc.* (247). (Mich. I, p. 63).
Ciboria bolaris *Fuck.* (345). (Mich. I, p. 67).
Cyathicula vulgaris *DNtrs.* (M. S. p. 164).
Helotidium nanum *Sacc.* (333).
Helotium (*Cyathicula*) coronatum *DNtrs.* (333). (M. S. p. 165).
Lachnella (*Trichopeziza*) Nidulus *Fuck.* (327). (M. S. p. 163).
Lachnella (*Trichopeziza*) punctiformis *Fuck.* (237). (Mich. I, p 66).
Pirottaea Bresadolae *Sacc.* (Mich. II, p. 536).
Stictis Saccardoi *Rehm.* (351). (F. V. V, p. 184).

Myxomyceteæ.

Comatricha pulchella *Rost* (12).
Didymium farinaceum *Schrad. var.* confluens *Pers.* (10). (F. V. IV, p. 40)

Didymium haemisphaericum *Fr.* (M. S. p. 173).
Didymium Serpula *Fr.* (Mich. I, p. 546).
Physarum Schumacheri *Spreng.* (*Ph. citrinum Schum.*) (9). (Mich. II, p. 166).

Sphæropsideæ.

Phoma Berkeleyi *Sacc.* (381). (F. V. V, p. 200).

Hyphomyceteæ.

Acremonium atrum *Cda.* (471). (Mich. I, p. 270).
Alternaria tenuis *Nees* (522).
Botrytis umbellata *DC.* (477). (M. S. p. 185).
Botrytis vulgaris (*Haplotrichum pullum*) *Bon.* (477). (M. S. p. 185).
Cephalosporium curtipes *Sacc.* (471). (Mich. II, p. 286).
Circinotrichum maculiforme *Nees.* (Mich. I, p. 272).
Cladotrichum strictum *Sacc.* (512). (Mich. I, p. 271).
Dendryphium nodulosum *Sacc.* (517).
Haplaria repens *Bon.* (Mich. II, p. 544).
Helminthosporium folliculatum *Corda* (515). (Mich. II, p. 174).
Helminthosporium rhopaloides *Fres.* (514). (Mich. II, p. 173).
Periconia pycnospora *Fres* (503). (F. V. V, p. 192).
Sporocybe byssoides *Fr.* (528). (M. S. p. 181).
Sporodesmium viticolum *Sacc.* (501). (Mich. II. p. 289).
Torula herbarum *Lk.* (496). (M. S. p. 178).

Rami, ramulique, virgulta etc., v. putrescentia v. humo dejecta etc.

Hymenomyceteæ.

Coprinus frustulorum *Sacc.* (84).
Crepidotus (*Agaricus*) Cesatii *Rabh.* (68). (Mich. I, p. 2).
Claudopus variabilis *Pers.* (64).
Marasmius candidus *Fr.* (61).
Marasmius epiphyllus *Fr.* (60).
Marasmius ramealis *Fr.* (61).
Mycena Acicula *Schæff.* (45).
Naucoria segestria *Fr.* (17).
Polyporus versicolor *Fr.* (100). (F. V. V, p. 163).

Pyrenomyceteæ.

Nectria cinnabarina *Fr.* (283). (M. S. p. 122).

Discomyceteæ.

Calloria coccinella *Fr.* (347). (F. V. IV, p. 30).
Helotium citrinum *Fr.* (331). (M. S. 165).
Helotium serotinum *Fr.* (332). (M. S. p. 165).
Lachnella (*Dasyscypha*) cerinea *Fuck.* (326). (M. S. p. 164).
Lachnella (*Trichopeziza*) nivea *Fuck.* (327). (M. S. p. 163).
Peziza (*Plectania*) coccinea *Fuck.* (320). (M. S. 166).

Myxomyceteæ.

Chondrioderma (*Carcerina*) spumarioides *Fr.* (11). (M. S. p. 173).
Craterium leucocephalum *Pers.* (10). (F. V. IV, p. 40).
Spumaria alba *DC.* (11). (M. S p. 173).

Sphæropsideæ.

Chaetomella lignicola *Sacc.* (101).

Hyphomyceteæ.

Alternaria tenuis *Nees.* (522).
Cephalosporium curtipes *Sacc.* (471) (Mich. II, p. 286).
Cladosporium herbarum *Link.* (511).
Sporocybe byssoides *Fr.* (528). (M. S. p. 181)
Stemphylium pyriforme *Bon.* (524). (Mich. II. 290).

Mycelia sterilia.

Rhizomorpha fragilis *Roth.* (M. S. 154).

Folia arborum, fruticum et plantarum variarum v. decidua, v. dejecta, v. putrescentia, v. coacervata, v. fermentescentia, v. uda, v. rejecta etc.

Hymenomyceteæ.

Clitocybe candicans *Pers.* (40).
Hypochnus effusus *Bon.* (Mich. II, p. 529).

Marasmius glabellus *Peck* (59). (Mich. I, p, 239).
Mycena Acicula *Schaeff.* (45).
Mycena capillaris *Schum.* (45).
Polyporus versicolor *Fr.* (100). (F. V. V, p. 163).
Tubaria furfuracea *Pers.* (76).

Pyrenomyceteæ.

Erysiphe communis *Lév.* (165). (M. S. p. 91).
Phyllactinia suffulta *(Ph. guttata) Fuck.* (163). (M S. p. 90).
Sphærotheca Castagnei *Lév.* (163). (M. S. p. 90).

Myxomyceteæ.

Chondrioderma *(Carcerina)* spumarioides *Fr.* (11). (M. S. p. 173).
Craterium minutum *Fr.* (10). (F. V. V, p. 185).
Diderma globosum *Pers.* (M. S. p. 173).
Didymium farinaceum *Schrad. var.* confluens *Pers.* (10). (F. V. IV, p. 40).
Didymium lobatum *Nees.* (M. S. p. 174).
Didymium squamulosum *Fr. var.* leucopus *Fr.* (10). (M. S. p. 174).
Fuligo varians *Sommf.* (8).
Physarum cinereum *Pers.* (9).
Physarum leucophaeum *Fr.* (9). (F. V. IV, p. 39).
Spumaria alba *DC.* (11). (M. S. p. 173).

Hyphomyceteæ.

Alternaria tenuis *Nees.* (522).
Botrytis umbellata *DC.* (477). (M. S. p. 185).
Cladosporium epiphyllum *Nees.* (511). (M. S. p. 181).
Cladosporium herbarum *Link.* (511).
Illosporium maculicola *Sacc.* (534.) (Mich. I, p. 263).
Macrosporium commune *Rabh.* (524). (M, S. p. 182).
Oospora *(Torula)* perpusilla *Sacc.* (467). (Mich. I, p. 265).
Speira toruloides *Corda.* (502). (M. S. p. 178).
Sporotrichum aureum *Fr.* (475). (M. S. p. 183).
Torula herbarum *Lk.* (496). (M. S. 178).

Fructus putrescentes.

Hyphomyceteæ.

Botrytis umbellata *DC.* (477). (M. S. p. 185).
Cladosporium herbarum *Link* (511).
Saccharomyces Mycoderma *Rees.* (*Hormiscium vini Kunze*) (27). (M. S. p. 176).

Penicillium glaucum *Link.* (M. S. p. 183).
Trichothecium roseum *Link.* (484).

Schizomyceteæ.

Bacterium Acidi lactici *Zopf.* (19).

Cortex truncorum ramorumque putrescentium v. emortuorum etc.

Hymenomyceteæ.

Anthina dichotoma *Roth.* (Mich. II, p. 155).
Crepidotus (*Agaricus*) Cesatii *Rabh.* (68). (Mich. I, p. 2).
Lenzites cinnamomea *Fr. var.* Cobelliana *Sacc.* (Mich. II, p. 529).
Mycena corticola *Schum.* (45).
Mycena hiemalis *Osbeck.* (45).

Pyrenomyceteæ.

Hypocrea rufa *Fr.* (2·6) (M. S. p. 124).
Myriococcum praecox *Fr.* (166). (Mich. I, p. 367).
Nectria Peziza *Fr.* (285). (M. S. p. 123).

Discomyceteæ.

Lachnella corticalis *Fr.* (327). (M. S. p. 161).
Mollisia atrata *Karst.* (336).

Myxomyceteæ.

Badhamia macrocarpa *Rost.* (8).
Didymium farinaceum *Schrad.* (10).
Hemiarcyria rubiformis *Rost.* (16).
Hemiarcyria serpula *Rost.* (16).
Physarum cinereum *Pers.* (11).
Physarum sinuosum *Rost.* (9).

Sphæropsideæ.

Hendersonia vagans *Fuck.* (418). (M. S. p. 199).

Hyphomyceteæ.

Diplosporium album *Bon.* (484). (Mich. II, p. 544).
Echinobotryum atrum *Cda.* (497). (F. V. V, p. 192).
Hypoderma roseum *Fr.* (M. S. p. 187).
Nematogonium aurantiacum *Desm.* (483). (M. S. p. 185).
Verticillium apicale *B. et Br.* (481). (M. S. 186).

Trunci, ligna, trabes, pali, asseres, fragmenta etc.

Hymenomyceteæ.

Anthina flammea *Fr.* (Mich. II, p. 154).
Armillaria (*Agaricus*) mellea *Vahl.* (36).
Ceriomyces terrestris *Schulz.* (87). (F. V. V, p. 167).
Collybia radicata *Relhan.* (43).
Coprinus frustulorum *Sacc.* (84).
Coprinus radians *Fr.* (83). (Mich. II, p. 243).
Crepidotus (*Agaricus*) Cesatii *Rabh.* (68). (Mich. I, p. 2).
Dacrymyces stillatus *Nees* (121). (F. V, V, p. 166).
Flammula flavida *Schaeff.* (69).
Hydnum aciculare *Sacc.* (105). (Mich. II, p. 154).
Hypholoma appendiculatum *Bull.* (80).
Hypholoma fasciculare *Huds.* (80).
Hypholoma hydrophilum *Bull.* (80).
Hypholoma lacrymabundum *Fr.* (79).
Hypholoma sublateritium *Fr.* (80).
Kneiffia setigera Fr. (104). (F. V. V, p. 165).
Lenzites sepiaria *Fr. var.* crocata *Sacc.* (61). (Mich I, p. 539).
Lepiota (*Agaricus*) excoriata *Schaff. var.* Vidoana *Sacc.* (34). (Mich. II, p. 241).
Marasmius foetidus *Fr.* (60).
Marasmius glabellus *Peck* (59). (Mich. I, p. 239).
Merulius lacrymans *Fr.* (101).
Mycena capillaris *Schum.* (45).
Mycena dilatata *Fr*, (44).
Mycena gypsea *Fr.* (46).
Naucoria pigmaea *Fr.* (76).
Omphalia chrysophylla *Fr.* (48).
Omphalia umbellifera *Linn.* (48).
Panus stipticus *Fr.* (63).
Pleurotus (*Agaricus*) atro-coeruleus *Fr. var.* Canovianus *Sacc.* (50). (Mich. I, p, 539).

Pluteus nanus *Pers.* (64).
Pluteus umbrosus *Pers.* (64).
Polyporus Braunii *Rabh.* (95).
Polyporus caesius *Fr.* (97). (Mich. I, p. 436).
Polyporus contiguus *Fr.* (94). (Mich. I, p. 3).
Polyporus Saccardoi *C. et Q.* (96).
Polyporus sericellus *Sacc.* (F. V. V, p. 163).
Polyporus versicolor *Fr.* (F. V. V, p. 163).
Polyporus Venetus *Sacc.* (100).
Psathyra gyroflexa *Fr.* (81).
Psathyra obtusata *Fr.* (81).
Psathyra spadiceo-grisea *Schaeff* (81).
Psilocybe spadicea (*Schaeff.* (81).
Schizophyllum commune *Fr.* (61).
Stereum Boltonii *Sacc.* (112). (Mich. I, p. 239)
Stropharia aeruginosa *Curt.* (79).
Trametes cinnabarina *Fr.* (91).
Trametes gibbosa Pers. (91).
Volvaria bombycina *Schaeff.* (63).

Pyrenomyceteæ.

Anixia spadicea *Fuck.* (Mich. II, p. 531).
Chaetomium Fieberi *Cda* (188). (Mich. I, p. 27).
Hypocrea gelatinosa *Tode* (286). (F. V. IV, p. 24).
Hypocrea rufa *Fr.* (286). (M. S. p. 124).
Lasiosphaeria hirsuta *Ces. et DNtrs.* (263). (M. S. p. 210).
Lasiosphaeria Montis-Caballi *Speg.* (265). (Mich. II, p. 254).
Lasiosphaeria (*Leptospora*) spermoides *Fuck.* (264). (M. S. p. 108).
Lasiosphaeria (*Leptospora*) strigosa *Fuck.* (264). (M. S. p. 210).
Lophiotrema crenatum *Sacc.* (298). (Mich. I, p. 411).
Melanomma hispidulum *Sacc.* (255). (Mich. I, p. 450).
Myriococcum praecox *Fr.* (116). (Mich. I, p. 367).
Nectria cinnabarina *Fr.* (283). (M. S. p. 122).
Nectria Peziza *Fr.* (285). (M. S. p. 1, 123).
Perisporium vulgare *Cda* (168). (Mich. I, p. 401).
Ustulina vulgaris *Tul.* (199). (M. S. p. 153).
Xylaria Arbuscula *Sacc.* (198). (Mich. I, p. 249).
Xylaria digitata *Grev.* (198). (M. S. p. 155).
Xylaria Hypoxylon *Grev.* (198). (M. S. p. 154).
Xylaria polymorpha *Grev.* (197). (M. S. p. 154).

Dyscomyceteæ.

Calloria coccinella *Fr.* (847). (Mich. I, p. 49, Mich. I, p. 429).
Calloria inflatula *Sacc.* (348). (Mich. I, p. 429).

Helotium citrinum *Fr.* (331). (M. S. p. 165).
Helotium ferrugineum *Fr.* (331). (M. S. p. 165).
Helotium subtile *Fr.* (329). (M. S. p. 165).
Helotium trabinellum *Karst.* (330). (Mich. I, p. 427).
Lachnea (*Peziza*) hirta *Schum.* (324). (Mich. I, p. 70).
Lachnea (*Humaria*) scutellata *Fuck.* (324). (M. S. p. 166).
Lachnella (*Dasyscypha*) calycina *Fuck.* (326). (M. S. p. 164).
Lachnella (*Pseudohelotium*) hyalina *Fr.* (329), (F. V. IV, 33).
Lachnella (*Trichopeziza*) nivea *Fuck.* (327). (M. S. 163).
Lachnella (*Trichopeziza*) punctiformis *Fuck.* (327). (Mich. I, p. 66).
Lachnella (*Dasyscypha*) virginea *Fuck.* (326). (Mich. I, p. 66).
Mollisia (*Niptera*) cinerea *Fuck.* (334). (Mich. I. p. 424).
Mollisia (*Tapesia*) fusca *Fuck.* (338). (Mich. I, p. 65).
Mollisia (*Niptera*) uda *Fuck.* (334). (M. S. 162).
Peziza exidiiformis *B. et Br* (322). (Mich. II, p. 257).
Peziza (*Plectania*) melastoma *Fuck.* (320). (Mich. I, p. 69).
Propolis faginea *Karst.* (*P. alba Fr.*) (352). (M. S. p. 157).

Myxomyceteæ.

Arcyria cinerea *Fr.* (14). (Mich. I, 71).
Arcyria punicea *Pers.* (14). (M. S. p. 172).
Badhamia hyalina *Berk.* (8).
Badhamia utricularis *Rost.* (8). (F. V. IV, 39).
Craterium minutum *Fr.* (10). (F. V. V, p. 185).
Cribraria tenella *Schrad.* (M. S. p. 172).
Cribraria vulgaris *Schrad.* (M. S. p. 172).
Didymium lobatum *Nees* (M. S. p. 174).
Didymium squamulosum *Fries var.* leucopus *Fr.* (11).
Fuligo varians *Sommf.* (*Aethalium septicum Fr.*) (11). (M. S. p. 173).
Hemiarcyria clavata *Rost.* (16).
Hemiarcyria rubiformis *Rost.* (16).
Hemiarcyria rubiformis *Rost. var.* tubulina *Rost.* (16).
Hemiarcyria serpula *Rost.*
Lycogala Epidendrum *L.* (15). (M. S. p. 170).
Lycogala flavo-fusca *Ehr.* (15). (Mich. I, p. 433).
Physarum (*Didymium*) cinereum *Pers.* (9). (M. S. p. 174).
Physarum leucophaeum *Fr.* (9). (F. V. IV, p. 39).
Reticularia Lycoperdon *Bull.* (13).
Reticularia umbrina *Fr.* (M. S. p. 171).
Stemonitis fusca *Roth.* (11). (M. S. p. 172).
Tilmadoche mutabilis *Rost.* (9).
Tilmadoche (*Physarum*) nutans *Pers.* (98). (M. S. p. 174).
Trichia chrysosperma *DC.* (16). (M. S. p. 171).

Trichia pyriformis *Hoff.* (F. V. IV, p. 40.
Trichia scabra *Rost.* (15). (F. V. IV, p. 40).

Sphæropsideæ.

Dendrophoma (*Phoma*) Pulvis-pyrius *Sacc.* (388). (F. V. V, p. 200).

Hyphomiceteæ.

Acladium conspersum *Lk.* (474). (F. V. V, p. 195).
Acrothecium bulbosum (*Graphium macrocarpum*) *Cda.* (516), (M. S. p. 187).
Bactrydium flavum *Sacc. et Speg.* (536). (M. S. 189).
Botrytis carnea *Schum.* (477). (Mich. II, p. 285).
Ceratium hydnoides *A. S.* (527). (Mich. II, p. 299).
Coniosporium aterrimum *Sacc.* (497). (Mich. II. p. 293).
Coniothecium atrum *Cda.* (M. S. 179).
Dematium Aluta *Lk.* (M, S. 204).
Gonytrichum cæsum *Nees.* (508). (Mich. II, 292).
Helicosporium pulvinatum *Ners.* (522). (M. S. p. 179).
Helicosporium (*Helicotrichum*) vegetum *Wallr.* (522). (Mich. I, p. 272).
Moniha candicans *Sacc.* (479). (F. V. V, p. 195).
Ozonium auricomum *Lk.* (544). (M. S. p. 204).
Physospora rubiginosa *Fr.* (474). (Mich. II, p. 287).
Sepedonium xylogenum *Sacc.* (480). (Mich. II, p. 552).
Septonema Hormiscium *Sacc. var.* angustius *Sacc.* (498). (Mich. II, p. 559).
Speira toruloides *Cda.* (502). (M. S. p. 178).
Sporocybe eumorpha *Sacc.* (528). (Mich. II, p. 560).
Sporotrichum geochroum *Desm.* (475). (Mich. II, p. 552).
Sporotrichum virescens *Link.* (575). (M. S. 183).
Stachybotrys elata *Sacc.* (503). (Mich. II, p. 560).
Stysanus Stemonitis *Cda.* (527). (M. S. p. 187).

Mycelia sterilia.

Rhizomorpha scandens *Pers.* (545). (M. S. p. 154).
Rhizomorpha subterranea *Pers.* (545). (M. S. p. 154).
Xylostroma Corium *Pers.* (544). (M. S. p. 204).

ANIMALIA

Mammalia.

Homo sapiens *L.*

Phycomyceteæ.

Hydrophora stercorea *Tode.* (158). *In stercore* (Mich. I. 12).
Mucor helicostylus *Sacc.* (159). *In fimo putri* (Mich. I p. 12).
Pilobolus Kleini *v. Thieg.* (158). *In stercore* (Mich. I p. 454).

Pyrenomyceteæ.

Hypocopra (*Sordaria*) humana *Awd.* (190). *In stercore putrescenti* (Mich. I p. 223).
Nectria charticola *Sacc. In charta putrescente stercorata in umbrosis* (Mich. I p. 464).
Nectria Pezicula *Speg* (285). *In charta stercorata* (Mich. I p. 232).
Pleospora melanospora *Speg.* (270). *In charta stercorata putri* (Mich. I p. 462).
Sphaerella Karsteniana *Speg.* (215). *In charta putre stercorata* (Mich. I p. 229).

Discomyceteæ.

Lachnea arachnoidea *Sacc.* (*Pyronema araneosum Speg.*) (323). *In stercore in umbrosis* (Mich. I p. 326).
Lachnea (*Peziza*) theleboloides *Sacc.* (324). *In fimo* (Mich. I p. 430).
Peziza (*Pyronema*) subhirsuta *Fuck.* (322). *In stercore putri in locis argillaceis umbrosis* (Mich. I p. 227).

Sphæropsideæ.

Camarasporium (*Hendersonia*) charticolum *Speg.* (423). *In charta stercorata putrescente in locis unbrosis* (Mich. I p. 483).

Hyphomyceteæ.

Achorion Schoenleinii *Robin.* (542). *In cute praesertimque in folliculis pilorum vel in stratis profundis epidermicis morbum* favo *vel* tigna *dictum determinans.*

Aspergillus stercoreus *Sacc.* (472). *In stercore putrescenti.*

Coprotrichum purpurascens *Bonord. var.* lutescens *Sacc.* (470). *In stercore.*

Fusarium rostratum *Speg.* (538). *In stercore putrescenti.*

Microsporon Audouini *Gruby* (542). *In superficie capillorum generans, secundum auctores aliquot, morbum dictum* Aream Celsi *vel* Porriginem decalvantem.

Microsporon Furfur *Robin.* (542). *In stratu corneo epidermidis maculas e punctiformi luteo-rubescentes vel luteo-brunneas confluentes efficiens quae* Pityriasim versicolorem *sistunt.*

Microsporon mentagrophites *Robin.* (542). *Prope bulbum capillorum* mentagram *forte generans.*

Microsporon tenuissimum *Burgharret et Bärenspr.* (542). *Praesertim in axillis et inguinibus morbum rubro-maculosum contagiosum generans.*

Saccharomyces albicans *Rees* (27). *In infantium ore lac sugentium.*

Saccharomyces coprogenus *Sacc.* (27). *In stercore fermentescente.* (Mich II, p. 287).

Saccharomyces guttulatus *Wint.* (27) *In fecibus diarrhoicis.*

Saccharomyces Psoriasis *Rivolta.* (27). *In corio capitis Psoriasi aegrotantium.*

Penicillium pruriosum *Salisb. In membrana mucosa vulvae muliebris et vesicae urinariae hominis.*

Sporodesmium echinulatum *Speg. In charta stercorata putrescente.* (Mich. I, 478).

Trichophyton tonsurans *Malmsten.* (542) *In folliculis pilorum nec non in unguibus morbum* erpete tonsurante *dictum determinans.*

Schizomyceteæ.

Actinomyces Bovis *Harz.* (25). *In osteosarcomatibus ulceratis.*

Bacillus Cholerae *Pac.* (25). *In intestino* Cholera *aegrotantium.*

Bacillus Leprae *Hansen.* (25). *In tumoribus leprosis.*

Bacillus Malariae *Klebs. In sanguine hominis febre dicta* di malaria *laborantis.*

Bacillus Pemphigi *Giben.* (25). *In lympha et urina* Pemphigio *aegrotantium.*

Bacillus puerperalis *Engel. In vulva puerperarum.*

Bacillus typhosus *Klebs* (25). *In intestino* typho *aegrotantium.*

Bacterium aeruginosum *Schröt. In suppurationibus.*

Bacterium decalvans *Thin. Ad radices capillorum in* Alopecia areata (Area Celsi) *cujus secundum auctorem causam sistit.*

Bacterium foetidum *Thin. In exsudationibus alcalinis pedum.*

Bacterium Maydis *Cub. In intestino hominis* Pellagra *laborantis.*

Bacterium Morbilli *Coze et Feltz. In urina, in sanguine nec non in squamis epidermidis* Morbillo *aegrotantium.*

Bacterium Pneumoniae-cruposae *Zopf. In pulmone Pneumonia cruposa aegrotantium.*

Bacterium Porri *Majocchi. In verruca* (porro) *cutis.*

Bacterium Rheumatarthritis *Marpmann. In sero ac pure articulari in Rheumatarthrite.*

Bacterium subtile *Zopf. In muco Epiphora laborantium.*

Bacterium Tuberculosis *Koch.* (19). *In pulmonibus Tuberculosi ægrotantium.*

Cladothrix Foersterii *Cohn.* (21). *In ductibus lacrymalibus ubi sordes luteo-nigricantes fragilesque efformat.*

Leptothrix buccalis *Kutz.* (21). *In dentibus sordidis et cariosis nec non in epithelio buccali.*

Micrococcus diphtericus *Cohn.* (24). *In spuriis membranis exsudatisque diphtericorum.*

Micrococcus Erysipelatis *Zopf.* (24). *In sanguine morbo Erysipela aegrotantium.*

Micrococcus Gonorrheae *Neisser. In fluxu Gonorrheae virulento.*

Micrococcus pyogenes aureus *Rosenbach. In medulla ossium majorum Osteomyelite aegrotantium.*

Micrococcus septicus *Cohn.* (24). *Ad plagas et ulcera gangrenosa in sanguine Pyohaemia et Septicohaemia aegrotantium.*

Micrococcus Ureae *Cohn. In urina cujus sistit fermentum.*

Micrococcus Vaccinae *Cohn.* (24). *In lympha recenti pustulae variolarum.*

Sarcina Urinae *Welcker. In Urinae vesica.*

Sarcina Ventriculi *Goodsir.* (22). *In stomacho, sanguine et pulmonibus.*

Spirillum Rugula *Wint. In dentium sorde.*

Spirochaete Cohnii *Wint. In dentium muco et in sputis.*

Spirochaete Obermeieri *Cohn.* (21). *In sanguine febre recurrente laborantium.*

Trichophyton tonsurans *Malmst.* (24). *In pilorum atque barbae folliculis nec non in unguibus morbum* Erpete tonsurante *dictum generans.*

Simia.

Schizomyceteæ.

Bacterium Tuberculosis *Koch.* (19). *In pulmonibus Simiarum Tuberculosi aegrotantium.*

Felis domestica *L.*

Phycomyceteæ.

Mucor helicostylus *Sacc.* (159). *In stercore putrescente.* (Mich. I, p. 13).

Canis familiaris *L.*

Phycomyceteæ.

Mucor caninus *Pers.* (158). *In fimo putri.* (M. S. p. 89).

Pyrenomyceteæ.

Chaetomium stercoreum *Speg.* (188). *In stercore* (Mich. I, p. 222).
Hypocopra *(Sordaria)* fimicola *Ces. et DNtrs.* (190). *In fimo putrescente* (Mich. I, p. 224).

Discomyceteæ.

Ascobolus stictoideus *Speg.* (342). *In fimo putrescente* (Mich. I, p. 474).
Lachnea *(Pyronema)* araneosa *Sacc.* (323). *In stercore in umbrosis* Mich. I, p. 237).
Riparobius saccoboloides *Speg.* (342). *In stercore putrescenti* (Mich. I, p. 474).

Hyphomyceteæ.

Sporotrichum vellereum *Sacc.* (475). *In vello putrescente* (Mich. II, p. 287).

Mus decumanus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Hypocopra macrospora *Sacc.* (190). *In fimo.*
Sordaria curvula *De Bary.* (189). *In fimo.*

Lepus timidus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Hypocopra (*Sordaria*) fimicola *Ces. et DNtrs.* (190). *In fimo* (Mich. I, p. 234).
Hypocopra macrospora *Sacc.* (190). *In fimo.*
Sordaria coprophila *Ces. et DNtrs.* (189). *In fimo.*
Sporormia ambigua *Niessl.* (256). *In fimo.*

Lepus Cuniculus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Coprolepa merdaria *Fuck.* (190). *In fimo.*
Delitschia Winteri *Plowr.* (339). *In fimo.*
Philocopra *(Sordaria)* curvicolla *Sacc.* (191). *In stercore* (Mich. I, p. 228).
Philocopra (*Sordaria*) pleiospora *Sacc.* (191). *In fimo* (Mich. I, p. 228).
Philocopra tarvisina *Sacc.* (191). (*Sordaria setosa Wint.*). *In stercore* (Mich. I, p. 228),
Sordaria anserina *Wint.* (190). *In fimo* (Mich. I, p. 226).
Sordaria decipiens *Wint.* (189). *In stercore.* (Mich. I, p. 226).
Sporormia intermedia *Auersw.* (256). *In fimo* (Mich. I, p. 230).

Discomyceteæ.

Ascophanus granuliformis *Boud.* (341). *In fimo.* (Mich. I, p. 235).
Saccobolus violascens *Boud.* (343). *In fimo.*

Hyphomyceteæ.

Stilbum erythrocephalum *Ditm.* (526). *In stercore.* (Mich. I, p. 274).

Bos Taurus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Chaetomium comatum *Fr. var.* helicotrichum *Sacc.* (188). *In fimo.*
Delitschia Winteri *Plowr.* (239). *In fimo.* (Mich. I, p. 229).
Hypocopra *(Sordaria)* fimicola *Ces. et DNtrs.* (190). *In fimo.* (Mich. I, p. 26. 224).
Hypocopra macrospora *Sacc.* (190). *In fimo.*
Hypocopra *(Sordaria)* minima *S. et S.* (190). *In fimo.* (Mich. I, p. 373).
Philocopra tarvisina *Sacc.* (*Sordaria setosa Wint.*) (191). *In fimo.* Mich. I, p. 228).
Philocopra (*Sordaria*) zygospora *Speg.* (191). *In fimo vetusto udo.* (Mich. I, p. 227).
Poronia Oedipus *Mont.* (199). *In fimo.*
Sordaria anserina *Wint.* (190). *In fimo.* (Mich. I, p. 226).
Sordaria coprophila *Ces. et DNtrs.* (189). *In stercore.* (Mich. I, p. 227).
Sordaria curvula *De Bary.* (189). *In fimo.* (Mich. I, p. 225).

Sordaria decipiens *Wint.* (189). *In fimo* (Mich. I p. 226).
Sordaria fimiseda *Ces. et De Not.* (189). *In fimo* (Mich. I p. 226).
Sporormia ambigua *Niessl.* (256). *In fimo* (Mich. I p. 459).
Sporormia fimetaria *De Not.* (257). *In fimo* (Mich. I p. 450).
Sporormia intermedia *Auersw.* (256). *In fimo* (Mich. I p. 230).
Sporormia Spegazzinii *Pir.* (227). *In fimo.*

Discomyceteæ.

Ascobolus furfurascens *Pers.* (342). *In fimo* (Mich. II p. 259).
Ascobolus immersus *Pers.* (342). *In fimo* (Mich. I p. 233).
Ascobolus macrosporus *Crouan. In fimo* (Mich. I p. 233).
Ascophanus Aurora *Bon. In fimo* (Mich. II p. 536).
Ascophanus carneus *Boud.* (340). *In stercore* (Mich. I p. 236).
Ascophanus cinereus *Boud.* (341). *In stercore* (Mich. I p. 236).
Ascophanus cinnabarinus *Speg.* (341). *In fimo* (Mich. II p. 258).
Ascophanus granulatus *Speg.* (431). *In stercore* (Mich. I p. 235).
Ascophanus granuliformis *Boud.* (331). *In fimo* (Mich, I p. 235).
Ascophanus Holmskjoldii *Hans.* (341). *In fimo* (Mich, I p. 432).
Ascophanus nitidus *Speg.* (431), *In stercore putrescenti* (Mich. I p. 235).
Lachnea (*Humaria*) pulcherrima *Sacc.* (324). *In fimo subputrescente in herbosis* (Mich. I p. 237).
Peziza carnea *Karst. In fimo* (Mich. I p. 70).
Peziza pulcherrima *Cooke. In fimo* (Mich. II p. 535).
Ryparobius (*Pezicula*) crustaceus *Boud.* (341). *In fimo* (Mich I p. 238).
Saccobolus Hansenianus *Speg.* (312). *In fimo* (Mich. I p. 234).
Saccobolus Kerverni *Boud.* (342), *In fimo* (Mich. I p. 234).

Hyphomyceteæ.

Myrothecium Verrucaria *Fr.* (541). *In fimo* (M. S. p. 187).
Oospora lactis *Sacc.* (467). *In superficie lactis acidi atque in fimo.*

Schyzomyceteæ.

Bacterium acidi lactici *Zopf.* (19). *In lacte fermentescente.*
Bacterium Anthracis *Zopf.* (19). *In sanguine praesertimque in liene individuorum anthrace ac pustula maligna aegrotantium.*
Bacterium cyanogenum *Zopf.* (19). *In lacte cyanescentes.*
Bacterium Porri *Maiocchi. In verruca-porrum cutis.*
Bacterium subtile *Zopf.* (19). *In stomacho et in fimo.*
Bacterium syncyanum *Ehrn. In lacte cyanescente.*

Bacterium synxanthum *Schröt. In lacte asservato et lutescente.*
Bacterium Tuberculosis *Koch.* (20). *In pulmonibus boum tuberculosi aegrotantium.*
Micrococcus Vaccinae *Cohn.* (24). *In limpha recenti pustulae variolarum.*

Capra Hircus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sporormia ambigua *Niessl.* (256). *In fimo.*
Sporormia intermedia *Awd.* (256), *In fimo.* (Mich. I p. 230).
Sporormia lageniformis *Fuck.* (256). *In fimo.*

Schyzomyceteæ.

Bacterium Anthracis *Zopf.* (19). *In sanguine et liene Anthrace ac pustula maligna aegrotantium.*
Bacterium subtile *Zopf.* (19). *In stomacho et in fimo.*

Ovis Aries *L.*

Pyrenomyceteæ.

Coprolepa (*Sordaria*) merdaria *Fuck.* (190). *In fimo exsiccato* (Mich. I p. 224).
Delitschia Winteri *Plowr.* (239). *In fimo* (Mich. I p. 229).
Hypocopra fimicola *Sacc.* (190). *In fimo.*
Hypocopra macrospora *Sacc.* (190). *In fimo.*
Perisporium vulgare *Cda.* (168). *In stercore* (Mich. I p. 401).
Rosellinia (*Sordaria*) Winteriana *Speg.* (193). *In fimo vetusto in pratis* (Mich. I p. 228).
Sordaria anserina *Wint.* (190). *In fimo* (Mich. I p. 225).
Sordaria fimiseda *Ces. et De Not.* (189), *In fimo.*
Sporormia gigantea *Hansen.* (256). *In fimo* (Mich. I p. 231).
Sporormia grandispora *Speg.* (257). *In fimo vetusto.*
Sporormia intermedia *Awd.* (257). *In fimo* (Mich. I p. 230).
Sporormia lageniformis *Fuck.* (256). *In fimo* (Mich. I p. 231).
Sporormia leptosphaerioides *Speg.* (257). *In fimo* (Mich. I p. 459).
Sporormia minima *Awd.* (257). *In fimo* (Mich. I p. 230).
Sporormia Spegazzinii *Pir.* (*S. gigaspora Speg.*) (257). *In fimo* Mich. I p. 321).

Sphæropsideæ.

Neottiospora coprophila *Speg.* (390). *In fimo vetusto* (Mich. I p. 281).

Schizomyceteæ.

Bacterium Anthracis *Zopf.* (19). *In sanguine et liene individuorum Anthrace ac pustula maligna aegrotantium.*
Bacterium subtile *Zopf.* (19). *In stomacho et in fimo.*

Hippopotamus amphibius *L.*

Pyrenomyceteæ.

Coprolepa merdaria *Fuck*, (190). *In stercore H. captivi in vivario per emporia circumducto.*

Sus europaeus (S. Scrofa *L.*).

Hyphomyceteæ.

Apergillus fimeti *Sacc.* (472). *In fimo* (Mich. II p. 543).
Isaria felina *Fr. var.* suina *Sacc.* (526). *In stercore* (Mich. II p. 561).

Schizomyceteæ.

Baccillus minimus *Klein. In sanguine et humoribus suis morbo ita dicto «typho vel pneumo- enteritis bacillaris» laborantis,*

Equus Caballus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Hypocopra (*Sordaria*) fimicola *Sacc.* (190). *In fimo* (Mich. II p. 632).
Philocopra (*Sordaria*) pleiospora *Wint.* (191). *In fimo* (Mich. I p. 228).
Phylocopra tarvisina *Sacc.* (*Sordaria setosa Wint.*) (191). *In fimo* (Mich. I p. 228).
Poronia Oepidus *Mont.* (199). *In fimo.*
Sordaria anserina *Wint.* (189). *In stercore* (F. V. V p. 178).
Sordaria curvula *de Bary.* (189). *In fimo* (Mich. I p. 225).
Sordaria decipiens *Wint.* (189). *In fimo.*
Sordaria fimiseda *Ces. et DNtrs.* (189). *In fimo* (Mich. I p. 226).
Sporormia ambigua *Niessl.* (256). *In fimo.*
Sporormia intermedia *Awd.* (256). *In fimo.* (Mich. I p. 230).
Sporormia minima *Awd.* (256). *In fimo* (Mich. I p. 230).

Discomyceteæ.

Ascobolus furfurascens *Pers.* (342). *In stercore* (Mich. I p. 233).
Ascobolus macrosporus *Crouan. In fimo* (Mich. I p. 233).
Ascobolus immersus *Pers.* (342). *In fimo* (Mich. I p. 233).
Ascophanus granuliformis *Boud.* (341). *In fimo* (Mich. I p. 235).
Ascophanus nitidus *Speg.* (341). *In fimo* (Mich. I p. 235).
Ryparobius (*Pezicula*) crustaceus *Boud.* (341). *In stercore* (Mich. I p. 238).
Ryparobius (*Pezicula*) Pelletieri *Boud.* (341). *In fimo putrescente in umbrosis* (Mich. I p. 228).
Saccobolus Hansenianus *Speg.* (342). *In fimo* (Mich. I p. p. 234).
Saccobolus Kerverni *Boud.* (342) *In stercore.* (Mich. I. 234).

Hyphomyceteæ.

Myrothecium Verrucaria *Tode.* (541). *In fimo.*

Schizomyceteæ.

Bacteriun Pneumoniae cruposae. *In pulmonibus.*

Equus Asinus *L.*

Pyrenomyceteæ.

Coprolepa merdaria *Fuck.* (190). *In fimo.*
Sordaria coprophila *Ces et DNtrs.* (189) *In fimo.*

Schizomyceteæ.

Bacterium Pneumoniae cruposae. *In pulmonibus individuorum Pneumonia cruposa aegrotantium.*

Equus Mulus *L.*

Schyzomyceteæ.

Bacterium Pneumoniae cruposae. *In pulmonibus individuorum Pnumonia cruposa aegrotantium.*

Mammiferæ indeterminatæ.

Hyphomyceteæ.

Geotrichum candidum *Link.* (468). *In ossibus putrescentibus* (Mich. I p. 476).

Oospora carneola *Sacc.* (468). *In ossibus putrescentibus* (Mich. II p. 545).

Saccharomyces guttulatus *Wint. In intestino*

Schyzomyceteæ.

Leptothrix buccalis *Robin.* (20). *In dentibus sordidis et cariosis nec non in epithelio buccali.*

Micrococcus Ureae *Cohn.* (23). *In urinae fermentatione ammoniacali*

Aves.

Aquila imperialis *Kais.*

Hyphomyceteæ.

Isaria Eleutheratorum *Nees.* (526). *In stercore supra alarum Coleopterorum reliquias haud digestas.*

Isaria felina *Fr. var.* aviaria *Sacc.* (526). *In stercore.*

Psittacus erithacus *L.*

Schyzomyceteæ.

Streptococcus perniciosus *Zopf. In intestino.*

Columba livia *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sporormia intermedia *Aod.* (256). *In stercore.*

Pavo cristatus *L.*

Hyphomyceteæ.

Isaria felina *Fr. var.* aviaria *Sacc.* (526). *In stercore.*

Gallus bankiva *Temm.* (G. domesticus *L.*).

Hyphomyceteæ.

Sapedonium osteophilum *Bon.* (480). *In ossibus putridis.*

Maleagris Gallopavo *L.*

Hyphomyceteæ.

Sapedonium osteophilum *Bon.* (480). *In pennis putridis.*

Gallinacei indeterminati.

Hyphomyceteæ.

Sapedonium osteophilum *Bon.* (480). *In ossibus pennisque putridis* (F. V. V p. 196).

Schyzomyceteæ.

Bacterium typhi gallinacei *Semmer. In typho Gallinaceorum vulgo dicto* Cholera o Peste dei Polli.
Bacterium Zopfii *Kurth.* (20). *In appendici vermiformi intestini Gallinaceorun typho aegrotantium.*

Anas Boschas *L.*

Pyrenomyceteæ.

Sporormia intermedia *Auersw.* (256). *In fimo.*

Anser cinereus *Meyer.*

Hyphomyceteæ.

Sordaria anserina *Wint.* (190). *In fimo* (Mich. I p. 226).
Sporrormia intermedia *Auersw.* (256). *In fimo* (Mich. I p. 230).

Hyphomyceteæ.

Aspergillus clavatus *Desm.* (472). *In stercore.* (Mich. II p. 543).
Isaria felina Fr. var. aviaria *Sacc* (526). *In stercore* (Mich. II p. 561)

Aves indeterminati.

Hyphomyceteæ.

Saccharomyces guttulatus *Wint. In intestino.*

Schyzomyceteæ.

Bacterium Ulna *Cohn.* (20). *Supra ova putrida.*
Micrococcus aurantiacus *Cohn.* (23) *Supra ova cocta.*
Micrococcus chlorinus *Cohn.* (23). *Supra ova cocta.*

Reptilia.

Hyphomyceteæ.

Saccharomyces guttulatus *Wint. In intestino.*

Pisces.

Hyphomyceteæ.

Oospora crustacea *Sacc.* (467). *In piscibus putrescentibus.* (Mich. II p. 545).

Schyzomyceteæ.

Bacterium Pflugeri *Ludwig. Ad corpora putrescentia quae in obscuritate phosphorescentia evadunt et in carne putri.*

Insecta.

Melolontha.

Hyphomyceteæ.

Botrytis Bassiana *Bals.* var. tenella *Sacc.* (476). *In larvis et chrysalidibus* (Mich. II p. 544).

Apion flavipes *Herbst.*

Hyphomyceteæ.

Isaria Eleutheratorum *Nees.* (526). (Mich. II p. 561).

Coleoptera indeterminata.

Hyphomyceteæ.

Isaria Eleutheratorum *Nees.* (526). (Mich. II p. 561).

Picris Brassicae *L.*

Phycomyceteæ.

Entomophthora sphaerosperma *Fres.* (157).

Bombyx Mori *L.*

Hyphomyceteæ.

Botrytis Bassiana *Bals.* (476). *In larvis* (M. S p. 185).

Schyzomyceteæ.

Micrococcus Bombycis *Cohn.* (24). *In stomacho atque intestino Bombycis morbo* flaccidezza *dicto laborantis.*

Micrococcus ovatus *Wint.* (24). *In Bombyce morbo* gattina *dicto laborante.*

Lepidoptera indeterminata.

Pyrenomyceteæ.

Cordyceps militaris *Link.* (290). *In larvis.*

Hyphomyceteæ.

Antromyces Copridis *Fres.* (528). *In chrysalidibus in terra humosa pingui in castanetis* (Mich. I p. 478).

Cladosporium penicillioides *Pr.* (512). *In chrysalidibus ad folia adhuc pendula Pruni domesticae* (F. V. V p. 191).

Isaria corallina *Fr.* (526). *In larvis putrescentibus* (M. S. p. 187).
Isaria farinosa *Tul.* (526). *Ad corpora emortua chrysalidum Lepidopterorum nocturnorum* (Mich. I p. 477).

Pentatoma.

Hyphomyceteæ.

Isaria stilbiformis *Speg.* (526). *Ad corpora putrescentia cuiusdam minutae speciei in carpineto* (Mich. I p. 476).

Apis mellifica *L.*

Schyzomyceteæ.

Bacillus melitophthorus *Cohn. In alvearibus in quibus infectionem vulgo* peste delle covate *dictam determinat.*

Vespa vulgaris *L.*

Sphæropsideæ.

Muricularia eurotioides *Sacc.* (390). *In nidis putrescentibus.*

Hyphomyceteæ.

Aspergillus virens *Link.* (473). *In nidis putrescentibus.*
Botrytis Bassiana *Bals.* var. tenella *Sacc.* (476). *In larvis et chrysalidibus* (Mich. II p. 544).
Oospora ruberrima *Sacc.* (467). *In larvis udis* (Mich. II p. 546).

Tenthredo.

Phycomyceteæ.

Entomophthora Tenthredinis *Fres.* (157).

Tipula.

Phycomyceteæ.

Entomophthora Tipulae *Fres.* (157).

Culex.

Phycomyceteæ.

Entomophthora Culicis *A. Br.* (157).

Musca domestica *L.*

Phycomyceteæ.

Entomophthora (*Empusa*) Muscae *Fres.* (157). (Mich. I p. 13).

Diptera indeterminata.

Hyphomyceteæ.

Botrytis Bassiana *Bals.* var. tenella *Sacc.* (476). *In larvis et chrysalidibus* (Mich. II p. 544).

Aphis.

Phycomyceteæ.

Entomophthora Aphidis *Hoff.* (157).

Gryllus.

Phycomyceteæ.

Entomophthora Grylli *Fres.* (157).

Cicada Orni *L.* (Tettigonia Orni *Fabr.*).

Sphæropsideæ.

Septoria pterophila *Sacc.* (436). *In alis putrescentibus.*

Blissus leucopterus.

Schyzomyceteæ.

Micrococcus insectorum *Burrill. In organis digestivis.*

Aulica.

Phycomyceteæ.

Entomophthora Aulicae *Reich.* (157).

Pentamorus.

Hyphomyceteæ.

Isaria stilbiformis *Speg.* (526). *Ad corpora putrescentia.*

Insecta indeterminata.

Phycomyceteæ.

Entomophthora megasperma *Cohn.* (157). *In larvis.*

Pyrenomyceteæ.

Cordyceps (*Torrubia*) militaris *Link.* (290). *In chrysalidibus putrescentibus* (M. S. p. 125).

Hyphomyceteæ.

Corethropsis pulchra *Sacc.* (471). *Ad corpora putrescentia.*
Sterigmatocystis candida *Sacc.* (473). *In larvis putrescentibus.*
Trinacrium subtile *Riess.* (469). *Supra ova ad folia Buxi* (Mich. II p. 543).

Aranina.

Epeira tubulosa *Latr.*

Hyphomyceteæ.

Isaria arachnophila *Ditm.* (526). *Ad corpora emortua.* (Mich. I, p. 477).

Epeira conica *Clerck.*

Hyphomyceteæ.

Isaria arachnophila *Ditm.* (526). *Ad corpora emortua.* (Mich. I, p. 477).

Drassus atrum *Deg.*

Hyphomyceteæ.

Isaria arachnophila *Ditm.* (526). *Ad corpora emortua.* (Mich. I, p. 177).

Crustacea.

Cancer pagurus *L.*

Hyphomyceteæ.

Oospora crustacea *Sacc.* (467). Mich. II, p. 545).



Stercora indeterminata.

Hymenomyceteæ.

Psilocybe coprophila *Bull.* (80).
Stropharia stercoraria *Fr.* (79).

Fimeta.

Hymenomyceteæ.

Coprinus cinereus *Schäeff.* (83).
Coprinus ephemerus *Fr.* (84).
Coprinus fimetarius *Fr.* (83).
Coprinus micaceus *Fr.* (83).
Panaeolus campanulatus *Fr.* (84).
Panaeolus fimiputris *Bull.* (84).
Panaeolus papilionaceus *Bull.* (85).

Discomyceteæ.

Humaria stercorea *Fuck.* (Mich. I, p. 237).

Substantiæ industria elaboratæ.

Areolae carbonariae.

Hymenomyceteæ.

Polyporus perennis *Fr.* (96).

Discomyceteæ.

Peziza carbonaria *A. et S.* (319). (Mich. I, 431).
Peziza (*Pyronema*) omphalodes *Fukl.* (322). (F. V. IV, 38).

Caseum.

Phycomyceteæ.

Mucor racemosus *Fres.* (158). *In caseo putri.* (Mich. I, 438).

Hyphomyceteæ.

Oospora crustacea *Sacc.* (467). *In caseo vetusto.* (Mich. II, 545).
Torula Sporendonema *B. et Br.* (M. S. 178).

Cellae vinariae.

Hymenomyceteæ.

Fomes (*Polyporus*) merismoides *Cda.* (92). (F. V. V, 162).
Polyporus Venetus *Sacc.* (100). *Ad trabes.*

Mycelia sterilia.

Ozonium parietinum *Link.* (545). *In parietibus* (Mich. II, 301)
Rhacodium (*Zasmidium*) cellare *Fr.* (144). (*M.* S. 92).

Cerevisia.

Hyphomyceteæ.

Saccharomyces (*Mycoderma*) Cerevisiae *Meyen.* (26). *In cerevisia fermenctorum* (M. S. 176).
Saccharomyces exiguus *Rees.* (26).
Saccharomyces Pastorianus *Rees.* (26).

Schyromycetæ.

Bacterium Aceti *Zopf.* (19). *In cerevisiae fermentatione acetica.*
Bacterium Pastorianum *Hansen.* (19). *In cerevisia fermentescente.*

Charta.

Pyrenomycetæ.

Anixia spadicea *Fuckl. In charta murali putrescente.* (Mich. II, 531).
Chaetomium chartarum *Ehrb* (189). *In charta putrescenti.*
Chaetomium Fieberi *Cda.* (188). *In charta putri uda.* (Mich. I, 401).
Perisporium vulgare *Corda.* (168). *In charta putri uda* (Mich. I p. 401).

Discomyceteæ.

Peziza Constellatio *Cooke.* (*Crouania humosa Fuckl.*) (323). *In charta bibula humi jacente* (M. S. p. 166).
Peziza (*Pyronema*) Franzoniana *DNtrs.* (322). *In charta bibula* (F V. IV p. 38), *et in charta solida zeina* (*cartone*) *putri* (Mich. II p. 432).

Hyphomyceteæ.

Arthrobotrys superba *Corda.* var oligospora *Coem* (485). *In charta putrida* (F. V. V p. 196).
Myxotrichum chartarum *Kunze.* (507). *In charta in locis humidis servata.*
Penicillium brevicaule *Sacc.* (474). *In charta putrescente* (Mich. II p. 547).
Periconia papyrogena *Sacc.* (404). *In charta bibula putrescenti* (Mich. I p. 273).
Sporotrichum roseum *Link.* (475). *In charta putri* (Mich. II p. 287).
Stachybotrys alternans *Bon.* (503). *In charta uda sub oliis* (F. V. V p. 193).
Stemphilium botryosum *Wallr.* (523). *In charta putrescenti.*
Torula asperula *Sacc.* (396). *In charta uda patri* (Mich. II p. 560).

Chorda.

Pyrenomyceteæ.

Rosellinia chordicola *Sacc.* (194). *In chorda putrescente dejecta* (Mich. I p. 372).

Hyphomyceteæ.

Oospora roseola *Sacc.* (*O. rosea Sacc.*) (467). *In chorda putrescenti* (Mich. II p. 546).

Corium.

Pyrenomyceteæ.

Eurotium coriorum *Wallr.* (166). *In corio putrescente* (Mich. I p. 15).

Discomyceteæ.

Peziza (*Pyronema*) aurantio-rubra *Fuckl.* (321). *In corio putrescente* (Mich. I p 69).

Dolia lignea.

Hyphomyceteæ.

Rhacodium cellare *Fr.* (544).

Farina frumentaria.

Hyphomyceteæ.

Epicoccum purpurascens *Ehrb.*. var. aleurophilum *Sacc.* (540). (Mich. I p. 264).

Saccharomyces (*Mycoderma*) glutinis farinae *Desm.* (27). *In glutine diu servato udo* (M. S. p. 176).

Foenum.

Schyzomyceteæ.

Bacterium subtile *Zopf.* (19). *In infusionibus.*

Lapides udi.

Melanconieæ.

Myxotrichum spelaeum *Sacc.* *In antro opacissimo* (Mich. II p. 544).

Ollae argillaceae.

Hymenomyceteæ.

Eccilia (*Agaricus*) Parkensis *Fr.* (66). *In vasis plantarum* (Mich. II p. 242).

Tuberaceæ.

Tuber Borchii *Vitt.* (360). (Mich. I p. 544)

Discomyceteæ.

Lachnea (*Peziza*) fissilis *Sacc.* (325). (Mich. II p. 257).
Peziza cerea *Sow* (320). (Mich. II p. 164).
Peziza domestica *Sow.* (321). (Mich. II p. 164).
Peziza tuberculosa *Sacc.* (319). (Mich. II p. 164).

Panis.

Hyphomyceteæ.

Micrococcus prodigiosus *Cohn* (16). *In pane diu in locis humidis asservato.*

Parietes calce illiniti udi.

Hyphomyceteæ.

Trichosporium (*Sporotrichum*) calcigenum *Link.* (505). (M. S. p. 182).

Discomyceteæ.

Peziza domestica *Sow.* (321). (Mich. II p. 164).

Pultis zeina (*Polenta*).

Phycomyceteæ.

Mucor Mucedo *De Bary.* (158). (M. S. p. 89).

Hyphomyceteæ.

Epicoccum purpurascens *Ehrb.* var. aleurophilum *Sacc.* (540).

Schyzomyceteæ.

Bacterium Maydis *Cub. In pulte et farina corrupta.*
Micrococcus prodigiosus *Cohn.* (23). *In pulte diu in locis humidis asservata*

Saccharum.

Schyzomyceteæ.

Clostridium polymyxa *Prazm.* (20). *In reiectamentis officinarum.*
Leuconostoc mesenterioides *Zopf.* (19). *In solutionibus atque in reiectamentis officinarum.*

Suber.

Hyphomyceteæ.

Penicillium glaucum var. citrinum (*Torula aurea*) *Corda* (474). *In subere udo* (M. S. p. 177).

Tela.

Pyrenomyceteæ.

Chaetomium Fieberi *Corda.* (188) *In tela putrida.*
Perisporium vulgare *Cda.* (168). *In tela uda* (Mich. I p. 401).

Discomyceteæ.

Peziza (*Pyronema*) Franzoniana *DNtrs.* (322). *In tela putrescente* (F. V. IV p. 38).

Sphæropsideæ.

Mycogala parietinum *Sacc.* (388). *In tela putrescente.*

Schyzomyceteæ.

Bacterium cyanogenum *Zopf.* (19). *In linteis mammis mulierum lactantium adpressis.*

Tuguria pastorum.

Pyrenomyceteæ.

Lasiosphaeria Montis Caballi *Speg.*. (265). *In ligno* (Mich. II p. 254).

Vinacea.

Discomyceteæ.

Lachnea Wimpfeniana *Bizz.* (325). *In vinaccis putrescentibus.*

Vinum.

Hyphomyceteæ.

Saccharomyces apiculatus. *Rees.* (26).
Saccharomyces conglomeratus *Rees.* (26).
Saccharomyces ellipsodeus *Rees.* (26).
Saccharomyces Mycoderma *Rees.* (27) (*Mycoderma Vini Vall.*) (M. S. p. 176).
Saccharomyces Pastorianus *Rees.* (26).
Stysanus medius *Sacc.* (528). *In vino subexsiccato* (Mich II p. 300).

Schyzomyceteæ.

Bacterium Aceti *Zopf.* (19). *In fermentatione acetica.*



INDEX MATRICUM

Abies . . Pag. 256
Acacia . . 62
Acer . . . 46
Achillea . . 126
Aconitum . . 6
Actaea . . . 7
Adenostyles . 120
Adianthum . . 303
Aecidium . . 117
Aegopodium . 101
Aesculus . . 253
Aethusa . . 102
Agaricus . . 313
Agave . . . 273
Agraphis . . 272
Agrimonia . . 80
Agropyrum . . 299
Agrostis . . . 293
Ailanthus . . 14
Aira . . . 294
Ajuga . . . 178
Albizzia . . 62
Alchemilla . . 80
Algae . . . 310
Alisma . . . 274
Alismaceae . . 274
Allium . . . 270
Alnus . . . 222
Aloe . . . 272
Alopecurus . . 285
Alsine . . . 24
Alternaria . . 322
Althaea . . 28
Alyssum . . 15
Amarantaceae . 184
Amarantus . 184
Amaryllidaceae 266
Amicophila . . 293
Amorpha . . 57
Ampelopsis . . 46
Amygdalus . . 67
Anacardiaceae . 36
Anas 343
Andropogon 287-288
Androsaemum . 25
Anemone . . 2
Angelica . . Pag. 102
ANIMALIA . 333
Anona . . . 8
Anonaceae . . 8
Anser . . . 343
Anthyllis . . 37
Antirrhinum . 167
Aphis . . . 347
Apion . . . 345
Apis . . . 346
Apium . . . 100
Apocynaceae . 151
Apocynum . . 152
Aquila . . . 342
Aquilegia . . 6
Arabis . . . 13
Araliaceae . . 105
Araneina . . 348
Arctium . . 129
Arctostaphilos . 143
Arenaria . . 23
Areolae carbonariae . . . 350
Aristolochia . 202
Aristolochiaceae 202
Armoracia . . 15
Arnica . . . 125
Aroideae . 277
Aronia . . . 86
Aronicum . . 125
Artemisia . . 126
Arum . . . 277
Arundo . . . 290
Asarum . . . 202
Asclepiadaceae . 152
Asparagaceae . 266
Asparagus . . 267
Asphodelus . . 272
Aspidium . . 304
Asseres . . . 329
Aster . . . 122
Astragalus . . 62
Athamanta . . 102
Atriplex . . 185
Aucuba . . . 109
Aulica . . . 348
Aurantiaceae . 31
Avena . . Pag. 294
Aves . . . 342

Ballota . . . 178
Bambusa . . 293
Barbarea . . 12
Bartramia . . 309
Bellis . . . 123
Berberideae . 9
Berberis . . 9
Beta . . . 185
Betonica . . 175
Betula . . . 226
Betulaceae . . 222
Bidens . . . 128
Bignonia . . 170
Bixaceae . . 17
Blissus . . 347
Bolctus . . . 314
Bombyx . . 345
Borraginaceae 157
Borrago . . 158
Borrera . . . 313
Bos 337
Brachypodium . 298
Brassica . . 14
Bromus . . 286-298
Broussonetia . 194
Brunella . . 175
Bumelia . . 150
Bunias . . . 15
Buphthalmum . 129
Bupleurum . . 100
Buxus . . . 206

Cactaceae . . 96
Calamintha . . 172
Calendula . . 129
Calluna . . . 143
Caltha . . . 5
Calycanthus . . 84
Camellia . . . 26
Campanula . . 138
Campanulaceae 138
Camphora . . 200
Cancer . . . 249

*

Canis. . Pag. 335
Cannabis . . 189
Capnodium . . 320
Capparideae . 16
Capparis . . 16
Capra . . . 339
Caprifoliaceae 111
Capsella . . 15
Carduus . . 132
Carex . . . 281
Carlina . . . 130
Carludovica . 277
Carpinus . . 227
Caryophylleae 18
Caseum . . 350
Cassine . . . 39
Castanea . . 239
Catalpa . . . 170
Caucalis . . 101
Caules . . . 324
Cellae vinariae . 350
Celtis . . . 192
Centaurea . . 131
Centranthus . 118
Cerastium . . 22
Ceratophylleae 207
Ceratophyllum . 207
Cercis . . . 67
Cerevisia . . 350
Chaerophyllum . 101
Charta . . 351
Cheiranthus . 12
Chelidonium . 11
Chenopodiaceae 185
Chenopodium . 186
Cherleria . . 24
Chimonanthus . 84
Chlora . . . 151
Chorda . . . 351
Chorium . . 351
Chrysanthemum 125
Chrysopogon . 288
Cicada . . . 347
Cichorium . . 131
Cinnamomum . 201
Circaea . . . 91
Cirsium . . 132-133
Cistineae . . 16
Citrus . . . 31
Clavaria . . 317
Clematis . 1
Cnicus . . . 132
Cocculus . . 11
Cochlearia . . 15
Coffea . . 111
Colchicaceae . 274
Coleoptera . 345
Columba . . 342
Compositae . . 120
Conferva . Pag. 311
Coniferae . . 254
Conium . . . 100
Convallaria . 267-268
Convolvulaceae . 156
Convolvulus . 156
Coprinus . . 314
Cornaceae . . 107
Cornus . . . 107
Coronilla . . 62
Cortex . . . 328
Corticium . . 316
Cortinarius . 314
Corydalis . . 12
Corylus . . . 231
Crassulaceae . 95
Crataegus . . 85
Craterellus . . 316
Crocus . . . 364
Cruciferae . . 12
Crustacea . . 346
CRYPTOGAMEAE 304
Cryptomeria . 260
Cryptovalsa . 318
Cucubalus . . 22
Cucumis . . 139
Cucurbita . . 140
Cucurbitaceae 139
Cucurbitaria . 321
Culex . . . 347
Culmi . . . 324
Cupressus . . 260
Cupuliferae . . 227
Cyathus . . 317
Cyclamen . . 181
Cydonia . . . 87
Cynanchum . . 152
Cynodon . . 287
Cynoglossum . 159
Cyperaceae . . 279
Cyperus . . . 279
Cystopteris . . 305
Cytisus . . . 52

Dactylis . . . 296
Dahlia . . 137
Daphnaceae . . 198
Daphne . . . 198
Datura . . . 159
Daucus . . . 104
Delphinium . . 6
Dentaria . . 13
Deschampsia . 291
Deutzia . . . 98
Dianthus . . 19
Diaporthe . . 320
Diatrype . . 319
Diatrypella . . 319
Dictamnus . Pag. 31
Digitalis . . 167
Digitaria . . 287
Dimerosporium . 318
Dioscorea . . 266
Dioscoreaceae 266
Diospiros . . 150
Dipsaceae . . 118
Dipsacus . . 118
Diptera . . . 347
Dolia lignea . . 352
Dolichos . . 67
Drassus . . . 319
Drosera . . . 18
Droseraceae . . 18
Dryas . . . 71

Ebenaceae . 150
Ecballion . . 141.
Echinocactus . 96
Echium . . . 157
Edgworthia . . 198
Elaeagnaceae . 201
Elaeagnus . . 201
Elaphomyces . 321
Eleocharis . . 279
Elymus . . . 301
Epeira . . . 348
Epilobium . . 93
Epimedium . , 9
Epipactis . . 263
Equisetaceae . . 306
Equisetum . . 306
Equus . . . 340
Eranthis . . 5
Ericaceae . . 141
Erigeron . . 122
Eriobothrya . . 87
Eriophorum . . 281
Erodium . . 29
Eryngium . . 99
Erysimum . . 14
Erythraea . . 155
Erythrina . . 63
Erythronium . 269
Eucalyptus . . 99
Eupatorium . . 120
Euphorbia . . 203
Euphorbiaceae . 203
Eutypa . . . 318
Evonymus . . 37

Facchinia . . 24
Fagus . . . 233
Farina frumentaria 352
Felis . . . 336
Fenestella . . 320

Ferula . . Pag. 103
Ferulago . . 103
Festuca . . . 297
Ficoideae . . 95
Ficus . . . 196
Fimeta . . . 319
Fistulina . . 315
Foeniculum . . 102
Foenum . . . 352
Folia . . . 326
Forsythia . . 150
Fragaria . . 76
Fragmenta lignea 329
Frankenia . . 18
Frankeniaceae 18
Fraxinus . . 148
Fructus . . . 327
Fumaria . . 12
Fungi . . . 313

Galanthus . . 265
Galega . . 98
Galeobdolon . 177
Galeopsis . . 176
Galium . . . 109
Gallinacei . . 313
Gallus . . . 343
Genista . . . 52
Gentiana . . 154
Gentianaceae . 154
Georgina . . 187
Geraniaceae . . 29
Geranium . . 29
Geum . . . 75
Glechoma . . 184
Gleditshcia . . 61
Globularia . . 180
Globulariaceae . 180
Glyceria . . 294
Gnoa . . . 320
Gomphrena . . 185
Gramineae . 284
Gratiola . . 167
Gryllus . . . 317
Gypsophila . . 18

Hedera . . . 105
Hedychium . . 263
Hedysarum . . 64
Helianthemum . 16
Helianthus . . 127
Helleborus . . 5
Helvella . . 322
Hemerocallis . 272
Hepatica . . . 3
Hepaticae . . 416
Heracleum . . 101
Hesperis . . Pag. 13
Hibiscus . . 28
Hieracium . . 136
Hierochloa . . 284
Hippophaë . . 201
Hippopotamus . 340
Holcus . . . 294
Homo 333
Homogyne . . 120
Hordeum . . 301
Hoya . . . 153
Humulus . . 189
Hydnum . . . 316
Hydrangea . . 97
Hypericineae . 25
Hypericum . . 25
Hypoxylon . . 319

Iberis . . . 15
Ilex . . . . 39.
Impatiens . . 30
Insecta . . . 344
Inula . . . 128
Iridaceae . . 264
Iris 265
Isaria . . . 322
Isopyrum . . 6

Jasminium . . 145
Juglandaceae . 208
Juglans . . . 208
Juncaceae . . 275
Juncus . . . 276
Juniperus . . 260

Kerria . . . 74
Kiggelaria . . 17
Koeleria . . 266

Labiatae . . . 171
Lactuca . . 135
Lagenaria . . 141
Lagerstroemia . 93
Lamium . . 176
Lapides udi . . 552
Lappa . . 129-130
Lapsana . . 134
Larix . . . 255
Laserpitium . . 104
Latania . . 277
Lathyrus . . 64
Lauraceae . . 299
Laurus . . . 199
Lecanora . . 311
Leguminosae . 51
Lemna . . Pag. 263
Lemnaceae . . 263
Leontodon . . 134
Lepidium . . 15
Lepidoptera . . 345
Lepus . . . 336
Leucantheimum . 125
Leucojum . . 266
Leycesteria . . 117
Lichenes . . . 311
Ligna . . . 329
Ligustrum . . 146
Liliaceae . . 269
Lilium . . . 269
Limonia . . 34
Linaria . . 167
Linum. . . . 30
Liriodendron . 8
Listera . . . 264
Lithospermum . 157
Livistona . . 277
Lolium . . . 298
Lonicera . . 115
Lotus . . . 57
Lunaria . . 14
Lupinus . . 51
Luzula . . . 575
Lychnis . . . 22
Lycium . . . 160
Lycopersicum . 160
Lycopodiaceae . 308
Lycopodium . . 308
Lycopsis . . 158
Lysimachia . . 101
Lythraceae . . 62
Lythrum . . 92

Maclura . . . 197
Magnolia . 8
Magnoliaceae . 8
Mahonia . . 10
Majanthemum . 268
Malva . . . 28
Malvaceae . . 28
Mammalia . . 333
Mammillaria . 96
Marchantia . . 310
Marsdenia . . 154
Massaria . . 321
Matrices incertarum speciernm vegetabilium . 324
Medicago . . 55
Melampyrum . 169
Meleagris . . 343
Melia . . . 34
Meliaceae . . 34
Melilotus . . 56

Melittis . Pag. 175
Melolontha . 344
Menispermaceae . 11
Menispermum . 11
Mentha . . . 171
Mercurialis . . 205
Mesembryanthemum . . . 95
Mespilus . . 87
Micromeria . . 172
Milium . . . 294
Mnium . . . 308
Molinia . . . 296
Momordica . . 141
Morus . . . 183
Mus 336
Musa . . . 263
Musaceae . . 263
Musca . . . 347
Muscari . . . 270
Musci . . . 308
Myosotis . . 158
Myricaria . . 25
Myrrhis . . . 101
Myrtaceae . . 98

Negundo . . . 51
Nelumbium . . 10
Nepeta . . . 174
Nerium . . . 151
Nicotiana . . 160
Nyctalis . . 314
Nymphaea . . 10
Nymphaeaceae . 10

Oenothera . . 94
Oidium . . . 322
Olea . . . 145
Oleaceae . . . 145
Ollae argillaceae . 353
Omphalodes . . 159
Onagrarieae . . 93
Onobrychis . . 61
Ononis . . . 54
Onosma . . . 157
Ophiopogon . . 268
Opuntia . . . 96
Orchidaceae . . 268
Orchis . . . 264
Oreodaphne . . 200
Ornithogalum . 270
Orobus . . . 61
Ortotrichum . 309
Ostrya . . . 231
Ovis . . . 339
Oxalis . . . 20
Oxycoccos . . 143

Pachyospora Pag. 312
Paeonia . . . 7
Pali 329
Paliurus . . 43
Palmae . . . 277
Panicum . . 286
Panis 353
Papaver . . 11
Papaveraceae . 11
Parietaria . . 188
Parietes calce illiniti udi . . 353
Parmelia . . 312
Passerina . . 199
Pastinaca . . 103
Paulownia . . 171
Pavo . . . 343
Pentamorus . . 318
Pentatoma . . 346
Persica . . . 67
Petasites . . 121
Petroselinum . 100
Petunia . . . 163
Peucedanum . 103
Peziza . . . 322
Phalaris . . . 284
PHANEROGAMAE . . 1
Pharbitis . . 157
Phaseolus . . 66
Philadelphus . 98
Phlox . . . 155
Phoenix . . . 277
Photinia . . 86
Phragmites . . 262
Phyllirea . . 146
Physalis . . 163
Phyteuma . . 138
Phytolacca . . 185
Phytolaccaceae . 185
Picris . . . 135
Pieris . . . 345
Pimpinella . . 101
Pinus . . . 254
Pisces . . . 344
Pistacia . . . 36
Pisum . . 64
Pittosporaceae . 37
Pittosporum . 37
Placodium . . 311
Plantagineae . 163
Plantago . . 163
Platanaceae . 197
Platanus . . 197
Plumbagineae . 181
Poa 295
Polemoniaceae . 155
Polygonaceae . 182
Polygonatum . 267
Polygonum . Pag. 182
Polypodiaceae . 304
Polypodium . . 304
Polyporus . . 305
Populus . . . 216
Portulaca . . 24
Portulaceae . . 24
Potentilla . . 75
Poterium . . 81
Preissia . . . 310
Prenanthes . . 136
Primula . . . 180
Primulaceae . . 180
Prunus . . . 67
Psamma . . 293
Psittacus . . 342
Psoroma . . 311
Pteris . . . 305
Pulicaria . . 129
Pulmonaria . . 157
Pultis zeina (*Polenta*) . . . 353
Punica . . . 93
Pyrenomycetes . 321
Pyrethrum . . 125
Pyrola . . . 141
Pyrus . . . 87

Quercus . . 242

Ramenta lignea . 329
Rami . . . 325
Ramuli . . . 325
Ranunculaceae . 1
Ranunculus . . 3
Reptilia . . . 344
Reseda . . . 16
Resedaceae . . 16
Rhamnaceae . . 37
Rhamnus . . 40
Rhinanthus . . 168
Rhododendron . 142
Rhus . . . 36
Ribes . . . 97
Ricinus . . . 206
Robinia . . . 58
Rosa . . . 81
Rosaceae . . . 67
Rosellinia . . 321
Rosmarinus . . 171
Rubiaceae . . 109
Rubus . . . 77
Rumex . . . 181
Ruscus . . . 266
Russula . . . 314
Rutaceae . . . 13

Saccharum Pag. 290-354
Sagittaria . . 275
Salicaceae . . 209
Salix . . . 209
Salsola . . . 186
Salvia . . . 173
Sambucus . . 111
Santalaceae . . 201
Sapindaceae . . 46
Saponaria . . 19
Sapotaceae . . 150
Sarothamnus . 51
Satureia . . 172
Saxifraga . . 96
Saxifragaceae . . . 96
Scabiosa . . 118
Schoeberia . . 187
Scilla . . . 270
Scirpus . . . 279
Scleroderma . 317
Scolopendrium . 365
Scorzonera . . 125
Scrofularia . . 166
Scrofulariaceae . 165
Scytonema . . 310
Secale . . 299
Sedum . . . 95
Selaginella . . 308
Selaginellaceae . 308
Senecio . . . 123
Serrafalcus . . 298
Serratula . . 131
Setaria . . . 286
Silene . . . 20
Silybum . . . 133
Simarubeae . 34
Simia . . . 335
Sisymbrium . 13
Sium . . . 101
Smilax . . . 268
Solanaceae . . 159
Solanum . . 160
Soldanella . . 180
Solidago . . 122
Sonchus . . . 136
Sophora . . 63
Sorbus . . . 92
Sorghum . . . 299
Spartium . . 51
Specularia . . 138
Sphagnum . . 808
Spiraea . . . 73
Stachys . . 175
Statice . . Pag. 101
Stellaria . . 23
Stenactis . . 123
Stercora . . . 349
Sterculia . . 27
Sterculiaceae . 27
Stereum . . 316
Stilbae . . . 322
Suber. . . . 354
SUBSTANTIAE INDUSTRIA E-LABORATAE . 350
Suber 354
Sus 340
Symphoricarpus . 144
Symphytum . . 158
Syringa . . . 147

Tagetes . . . 122
Tamariscineae . 24
Tamarix . . 24
Tamus . . 266
Tanacetum . . 126
Taraxacum . . 136
Taxus . . . 261
Tecoma . . . 170
Tela . . . 354
Tenthredo . . 346
Ternstroemiaceae 26
Tettigonia . . 347
Teucrium . . 178
Thalictrum . . 2
Thesium . . 201
Thlaspi . . 15
Thuja . . . 262
Tilia . . . 26
Tiliaceae . . . 26
Tipula . . 341
Tofieldia . . 274
Tormentilla . . 75
Tortula . . 309
Torylis . . . 104
Trabes . . 329
Tragopogon . . 135
Trifolium . . 56
Trisetum . . 95
Triticum . 299-3200
Tropaeolum . . 30
Trunci . . . 329
Tubercularia . 322
Tuguria pastorum 355
Tulipa . . . 269
Tunica . . . 18
Tussilago . Pag. 121
Typha . . . 279
Typhaceae . . 278

Ulex . . . 51
Ulmus . . . 190
Umbelliferae . . 99
Urceolaria . . 312
Uredo . . . 318
Urtica . . . 187
Urticaceae . . 187
Ustulina . . 319

Vaccinium . . 143
Valeriana . . 117
Valerianaceae . 117
Valsa . . . 318
Valsaria . . 320
Vanilla . . . 264
Veratrum . . 274
Verbascum . . 155
Verbena . . 179
Verbenaceae . 179
Veronica . . 167
Vespa . . . 346
Viburnum . . 113
Vicia . . . 65
Vinacea . . . 355
Vinca . . . 151
Vinum . . . 355
Viola . . . 17
Violaceae . . 17
Vitis . . . 43
Virgulta . . 325
Volkameria . . 145

Weigelia . . 117
Wistaria . . 63

Xanthium . . 128
Xiphion . . 265

Yucca . . . 273

Zea 285
Zingiberaceae . 263
Zizyphus . . 42

New York Botanical Garden Library
QK608.I8 C81 gen
Cuboni, Giuseppe/Synopsis mycologiae Ven
3 5185 00116 7988